

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO,
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS



We create chemistry

BELLIS® 38 WG

FUNGICIDA – CARBOXAMIDA, ESTROBILURINA
BOSCALID, PYRACLOSTROBIN

Composición química:

	% m/m
2-chloro-N-(4'-chlorobiphenyl)-2-yl) nicotinamide.....	25,20
Methyl {2-[1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-yloxymethyl]phenyl}(methoxy)carbamate.....	12,80
Ingredientes inertes.....	62,00

Contiene: 380 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.

Contenido neto:

☐ 18 g ☐ 50 g ☐ 200 g

ATENCIÓN

EN CASO DE INTOXICACIÓN TRASLADAR AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MAS CERCANO
Y ENTREGUE LA ETIQUETA Y EL PANFLETO.

ANTÍDOTO: NO TIENE

FORMULADOR:

BASF Corporation, 26 Davis Drive, Research Triangle Park, NC 27709, USA. Teléfono: +1 973 245-6000 correo:
global.info@basf.com

PAÍS Y NÚMERO DE REGISTRO:

Costa Rica	5224
Belice	0346-1
El Salvador	AG.2005050740
Guatemala	78-115
	78-115A
Honduras	354-182-II
Nicaragua	BA-193C-1-2007
Panamá	1716
República Dominicana	2502

NÚMERO DE LOTE:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

® Marca Registrada de BASF

UNIDAD DE REGISTRO DE AGROQUÍMICOS Y EQUIPOS DE APLICACIÓN

Servicio Fitosanitario del Estado
SAN JOSÉ - COSTA RICA

APROBADO

* 15 MAY. 2023 *

Lic. José A. Arce Campos

FIRMA: _____





We create chemistry

BELLIS® 38 WG

**FUNGICIDA – CARBOXAMIDA, ESTROBILURINA
BOSCALID, PYRACLOSTROBIN**

Composición química:

Composición química:	% min.
2-chloro-N-(4'-chlorobiphenyl)-2-yl) nicotinamide.....	25,20
Methyl {2-[1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-yloxymethyl]phenyl}(methoxy)carbamate.....	12,80
Ingredientes inertes.....	62,00

Contiene 380 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.

Contenido neto:

18 g

50 g

200 g

1 Kg

ATENCIÓN

EN CASO DE INTOXICACIÓN TRASLADÉ EL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA Y EL PANFLETO.

ANTÍDOTO: NO TIENE

FORMULADOR:

BASF Corporation, 26 Davis Drive, Research Triangle Park, NC 27709, USA. Teléfono: +1 973 245-6000 correo: global.info@basf.com

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL. ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Por inhalación y contacto puede irritar ojos y la piel. Es nocivo por ingestión.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: no induzca al vómito. Lleve de inmediato al paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato al paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato al paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

UNIDAD DE REGISTRO DE AGROQUÍMICOS
Y EQUIPOS DE APLICACIÓN

APROBADO

15 MAY. 2023

Lic. José A. Arce Campos

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS

CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN LA ETIQUETA Y EL PANFLETO. PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS.

PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS

MANEJO DE ENVASES



NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.

AVISO DE GARANTÍA: BASF S.A. garantiza que la composición química y la concentración de este producto, corresponden a lo que indica BASF en la presente etiqueta. Las recomendaciones de uso se basan en rigurosos y amplios ensayos de campo en diferentes partes del mundo por lo que, al adquirir este producto, el usuario adquiere la responsabilidad de su correcto uso y manejo, por lo tanto, BASF no asume garantías y responsabilidades expresas o implícitas, por el uso de este producto de manera diferente o contrario a lo recomendado. Los períodos de carencia indicados en el panfleto son para las condiciones locales, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino.

PAÍS Y NÚMERO DE REGISTRO:

Costa Rica	5224
Belice	0346-1
El Salvador	AG.2005050740
Guatemala	78-115
	78-115A
Honduras	354-182-II
Nicaragua	BA-193C-1-2007
Panamá	1716
República Dominicana	2502

NÚMERO DE LOTE:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

® Marca Registrada de BASF

UNIDAD DE REGISTRO DE AGROQUÍMICOS Y EQUIPOS DE APLICACIÓN

Servicio Fitosanitario del Estado
MAG - COSTA RICA

APROBADO



15 MAY. 2023



Lic. José A. Arce Campos

FIRMA: _____

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



EN CASO DE INTOXICACIÓN TRASLADÉ EL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA Y EL PANFLETO

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Por inhalación y contacto puede irritar ojos y la piel. Es nocivo por ingestión.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: no induzca al vómito. Lleve de inmediato al paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico

BASF

We create chemistry

BELLIS® 38 WG

FUNGICIDA – CARBOXAMIDA, ESTROBILURINA
BOSCALID, PYRACLOSTROBIN

Composición química	% m/m
2-chloro-N-(4'-chlorobiphenyl)-2-yl) nicotinamide.....	25,20
Methyl{2-[1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-yloxy)methyl]phenyl}(methoxy)carbamate	12,80
Ingredientes inertes.....	62,00

Contiene: 380 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.

Contenido neto:

☐ 1 Kg ☐ 100 Kg

ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

FORMULADOR:

BASF Corporation, 26 Davis Drive, Research Triangle Park, NC 27709, USA.
Teléfono: +1 973 245-6000 correo: global.info@basf.com

® Marca Registrada de BASF

CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN LA ETIQUETA Y EL PANFLETO. PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS.

PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS

MANEJO DE ENVASES



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

AVISO DE GARANTÍA:

BASF S.A. garantiza que la composición química y la concentración de este producto, corresponden a lo que indica BASF en la presente etiqueta. Las recomendaciones de uso se basan en rigurosos y amplios ensayos de campo en diferentes partes del mundo por lo que, al adquirir este producto, el usuario adquiere la responsabilidad de su correcto uso y manejo, por lo tanto, BASF no asume garantías y responsabilidades expresas o implícitas, por el uso de este producto de manera diferente o contrario a lo recomendado. Los períodos de carencia indicados en el panfleto son para las condiciones locales, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino.

PAÍS Y NÚMERO DE REGISTRO:

Costa Rica	5224
Belice	0346-1
El Salvador	AG.2005050740
Guatemala	78-115 78-115A
Honduras	354-182-II
Nicaragua	BA-193C-1-2007
Panamá	1716
República Dominicana	2502

NÚMERO DE LOTE:

FECHA DE FORMULACIÓN: **FECHA DE VENCIMIENTO:**
AMPOLO DE REGISTRO DE AGROQUÍMICOS
Y EQUIPOS DE APLICACIÓN
Fito sanitario
del Estado
MAC - COSTA RICA

APROBADO

* 15 MAY. 2023 *

Lic. José A. Arce Campos

FIRMA:

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y PANFLETO ANTES USAR EL PRODUCTO,
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS



We create chemistry

BELLIS® 38 WG

FUNGICIDA – CARBOXAMIDA, ESTROBILURINA
BOSCALID, PYRACLOSTROBIN

UNIDAD DE REGISTRO DE AGROQUÍMICOS
Y EQUIPOS DE APLICACIÓN

APROBADO

ATENCIÓN 15 MAY. 2023

Lic. José A. Arce Campos

ANTÍDOTO: NO TIENE

FIRMA:

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE
HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD
MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO: BELLIS 38 WG es un fungicida de uso agrícola

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

BELLIS 38 WG es un fungicida sistémico con acción preventiva y curativa erradicante, que combina la acción del Pyraclostrobin y del Boscalid. Ambas sustancias afectan la producción de energía de las células del hongo, afectando sus funciones vitales. Preventivamente actúa inhibiendo los estados tempranos del desarrollo del hongo desde la germinación de la espora hasta la formación del apesorio.

La acción curativa y erradicante del Pyraclostrobin provoca la desintegración de las cadenas de esporas, inhibiendo consistentemente la esporulación. Al mismo tiempo dejan de funcionar los sistemas de bombeo de la membrana celular. Actúa a nivel molecular al inhibir respiración de la mitocondria por el bloqueo en la transferencia de electrones al complejo del citocromo bc1. El Boscalid inhibe la germinación de esporas impide la elongación del tubo germinativo, el crecimiento micelial y la esporulación. A nivel molecular inhibe la enzima succinato deshidrogenasa, la cual es parte importante en el Ciclo de Krebs, y por lo tanto afecta el flujo de carbono de los metabolitos como la cadena de ATP.

Los ingredientes activos de BELLIS 38 WG presentan sitios de acción diferentes, de esta manera se reduce el riesgo de resistencia cruzada.

BELLIS 38 WG se absorbe de manera translocar a través del tejido de la hoja y se transloca vía acrópeta hacia el ápice y márgenes de las hojas. De esta forma, con este tipo de translocación, áreas de la planta que no fueron tratadas reciben protección.

Pyraclostrobin se clasifica dentro del Grupo Química de los methoxy-carbamates en el código 11 según FRAC. Rotar con productos químicos diferentes al código 11. No seguir estas indicaciones incrementa el riesgo de resistencia de las plagas.

Boscalid se clasifica dentro del Grupo Químico de las Piridin-carboxamidas, en el código 7 según FRAC. Rotar con productos químicos diferentes al código 7. No seguir estas indicaciones incrementa el riesgo de resistencia de las plagas.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

La aplicación de Bellis 38 WG, puede realizarse con equipo manual de espalda, motorizado o con equipo terrestre. Antes de utilizar el equipo de aspersión, revise cuidadosamente que esté en buen estado de funcionamiento. Calibre el equipo antes de aplicar el producto. En aplicaciones use un volumen apropiado para lograr una buena cobertura. En aplicación terrestre se recomienda el uso de boquillas de abanico TJ 8003 o su equivalente, con una presión de 30 a 40 libras por pulgada cuadrada y una altura del aguilón o la boquilla de 50 cm sobre el nivel del suelo. Cuando maneje o aplique este producto debe usarse la ropa y el equipo de protección, guantes, sombrero, y pantalón largo. Lave la ropa usada durante la aplicación con abundante agua y jabón. Al lavar esta ropa no la mezcle con la de uso normal. Como con todos los productos químicos evite en lo posible el contacto con la solución. Calibre el equipo antes de usar el producto.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Antes de manipular y utilizar Bellis 38 WG póngase el equipo de protección personal. Como con todos los productos químicos evite en lo posible el contacto con el producto concentrado o diluido y con la niebla de aspersión. Verifique la calidad del agua para evitar el uso de aguas duras y así lograr la mayor eficacia del producto. Regule el pH de la solución de manera que se mantenga entre 5 – 6,5. Llene hasta la mitad el tanque con agua, prepare una premezcla al añadir la cantidad de BELLIS 38 WG recomendada a un poco de agua, vierta esta premezcla al tanque y termine de llenar mientras agita. Agite la mezcla durante todo el proceso de preparación. Después de la aplicación lave el equipo de aplicación con agua y detergente por dentro y por fuera, dele el mantenimiento recomendado (limpieza de boquillas y filtros, engrase, etc.) déjelo secar y guárdelo.



RECOMENDACIONES DE USO

USOS AUTORIZADOS EN COSTA RICA:

Cultivo	Plaga	Dosis	Observaciones
Melón <i>Cucumis melo</i>	Mildiu velloso <i>Pseudoperonospora cubensis</i>	0,8 kg/ha Utilizar un volumen de agua de 400 a 600 l/ha aproximado según ejercicio de calibración	Aplicar preventivamente con la aparición de los primeros síntomas. En el caso del melón y la sandía aplicar de 10 a 15 días luego del trasplante, sandía y tomate el intervalo de aplicación es cada 7 días, número máximo de aplicaciones es 4-6 por ciclo de cultivo.
Sandía <i>Citrullus lanatus</i>			
Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i>	Tizón temprano <i>Alternaria solani</i>		
Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i>	Mancha angular <i>Phaeoisariopsis griseola</i>	0,5 – 0,6 kg/ha (2,5g-3g de producto comercial por 1 L de agua) Utilizar un volumen de agua aproximado a 200 L según ejercicio de calibración.	En frijol aplicar dos veces el plaguicida, la primera en prefloración y la segunda aplicación en el llenado de las vainas ante la presencia de primeros síntomas del patógeno, con una cantidad de agua de 200 L/ha. Cultivo de frijol 2 aplicaciones por ciclo de cultivo
Papaya <i>Carica papaya</i>	Antracnosis <i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	1,0 kg/ha	Utilizar volumen aproximado de agua de 277 litros por hectárea según ejercicio de calibración. Cultivo de papaya: el intervalo de aplicación es cada 7 días con un número máximo de aplicaciones 3 por ciclo de cultivo.
Zanahoria <i>Daucus carota</i>	Alternaria <i>Alternaria dauci</i>	0,3-0,4 Kg/ha ó 0,75 - 1 g de producto comercial por 1 L de agua. Utilizar un volumen aproximado de aplicación de agua de 400 L/ha según ejercicio de calibración.	Aplicar preventivamente 45 días después de la germinación y repetir tres veces más cada 15 días de ser necesario, puede utilizarse como mínimo 400 L/ha de agua. Cultivo de zanahoria el intervalo de aplicación es cada 15 días con un máximo de 4 aplicaciones por ciclo de cultivo.

USOS AUTORIZADOS EN BELICE:

CULTIVO	PLAGAS A CONTROLAR	DOSIS RECOMENDADA	OBSERVACIONES
Papaya <i>Carica papaya</i>	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	1 kg de producto comercial por	
Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i>	<i>Alternaria solani</i> <i>Botrytis sp.</i> <i>Leveillula taurica</i>	0.8 kg/ha (0.56 kg/mz) ó 1g de producto comercial por 1L de agua	Aplicar preventivamente con la aparición de los primeros síntomas. En el

Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i>	Mustia hilachosa <i>Thanatephorus cucumeris</i> Mancha angular <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> Roya <i>Uromyces appendiculatus</i>	2g de producto comercial por 1 L de agua* ó 400 g en 200 L de agua	caso del melón y la sandía aplicar de 10 a 15 días luego del transplante. En frijol aplique a los 25 y 40 días después de la siembra con la aparición de los primeros síntomas.
-------------------------------------	--	---	---

Papaya <i>Carica papaya</i>	Antracnosis <i>Colletotrichum Gloeosporioides</i>	0.8 - 1.2 kg/ha (0.56 - 0.84 kg/mz) Utilizar un volumen de agua de 300 l/ha (210 l/mz)	de la mezcla en 285 L/Ha (199.5 L/mz) Aplicar preventivamente con la aparición de los primeros síntomas.
Aguate <i>Persea americana Mill</i>	Antracnosis <i>Colletotrichum Gloeosporioides</i>	0.8 a 1.0 kg/ha. (0.56 a 0.70 kg/mz) Utilizar un volumen de agua entre 440 a 1000 l/ha	Aplicar preventivamente con la aparición de los primeros síntomas.

USOS AUTORIZADOS EN HONDURAS:

Cultivo	Plaga	Dosis	Observaciones
Arveja <i>Pisum sativum</i>	Mildiu polvoso <i>Erysiphe heraclei</i> .	0.8 kg/ha (0.56 kg/mz) ó 1g de producto comercial por 1L de agua. Utilizar un volumen de agua de 400 a 600 l/ha (280 a 420 l/mz)	Aplicar preventivamente con la aparición de los primeros síntomas. En frijol aplique a los 25 y 40 días después de la siembra con la aparición de los primeros síntomas. Se recomienda un volumen de preparación en agua de la mezcla en 285 L/Ha (199.5 L/mz)
	Mildiu polvoso <i>Erysiphe pisi</i> <i>Erysiphe polygoni</i> <i>Oidium erysipthoides</i>		
	<i>Ascochyta pisi</i> <i>Rhizoctonia solani</i> .		
	<i>Uromyces phaseoli</i>		
Ejote Francés <i>Phaseolus vulgaris</i>	<i>Uromyces phaseoli</i>	0.8 kg/ha (0.56 kg/mz) ó 1g de producto comercial por 1L de agua. Utilizar un volumen de agua de 400 a 600 l/ha (280 a 420 l/mz)	Aplicar preventivamente con la aparición de los primeros síntomas. Se recomienda un volumen de preparación en agua de la mezcla en 400 L/Ha (280 l/mz)
Zanahoria <i>Daucus carota</i>	<i>Alternaria dauci</i>		
Brócoli <i>Brassica oleraceae</i>	<i>Phoma lingam</i> <i>Rhizoctonia solani</i>		
Cebolla <i>Allium cepa</i>	<i>Alternaria porri</i>		
Ajo <i>Allium sativa</i>	<i>Botrytis cinerea</i>	0.8 kg/ha (0.56 kg/mz) ó 1g de producto comercial por 1L de agua. Utilizar un volumen de agua de 400 a 600 l/ha (280 a 420 l/mz)	Aplicar preventivamente con la aparición de los primeros síntomas. En el caso del melón y la sandía aplicar de 10 a 15 días luego del trasplante. Se recomienda un volumen de preparación en agua de la mezcla en 400-600 L/Ha (280-420 L/mz)
Fresa <i>Fragaria vesca</i>	<i>Botrytis cinerea</i>		
Melón <i>Cucumis melo</i>	<i>Erysiphe cichoracearum</i>		
Sandía <i>Citrullus lanatus</i>	<i>Gomosis</i> <i>Didymella bryoniae</i>		
Pepino <i>Cucumis sativus</i>		0.8 - 1.0 kg/ha (0.56 - 0.70 kg/mz). Utilizar un volumen de agua de 400 a l/ha (280 l/mz)	Se recomienda realizar 4 aplicaciones del producto durante el ciclo del cultivo, con intervalos de 7 días entre aplicaciones. Iniciar aplicaciones de manera preventiva o con la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad.
Calabaza <i>Cucurbita moschata</i> , <i>Cucurbita pepo</i>			
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Tizón temprano <i>Alternaria solani</i>		
	Moho gris <i>Botrytis cinerea</i>		
Chile <i>Capsicum annuum L</i>	Mildiu polvoso <i>Leveillula taurica</i>	0.4 kg/ha (0.28 kg/mz) ó 2g de producto comercial por 1 L de agua* ó 400 g en 200 L de agua. Utilizar un volumen de agua de 200 a 250 l/ha (140 a 175 l/mz)	Aplicar preventivamente con la aparición de los primeros síntomas. En frijol aplique a los 25 y 40 días después de la siembra con la aparición de los primeros síntomas. Se recomienda un volumen de preparación en agua
Papa <i>Solanum tuberosum</i>			
Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i>	Mustia hilachosa <i>Thanatephorus cucumeris</i> Mancha angular <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> Roya <i>Uromyces appendiculatus</i>		

USOS AUTORIZADOS EN NICARAGUA:

Cultivo	Plaga	Dosis	Observaciones
Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i>	Mancha púrpura <i>Alternaria sp.</i> <i>Botrytis sp.</i>	0.4 - 0.8 kg/ha (0.28 - 0.56 kg/mz) Utilizar un volumen de agua de 400 a 600 l/ha (280 a 420 l/mz)	Aplicar preventivamente con la aparición de los primeros síntomas. Aplique a los 25 y 40 días después de la siembra con la aparición de los primeros síntomas. Se recomienda un volumen de preparación en agua de la mezcla en 200 L/Ha (140 L/mz)
Cebolla <i>Allium cepa</i>	Mancha purpura <i>Alternaria porri</i>		Aplicar preventivamente con la aparición de los primeros síntomas. Aplique a los 25 y 40 días después de la siembra con la aparición de los primeros síntomas. Se recomienda un volumen de preparación en agua de la mezcla en 250-350 L/Ha (175-245 L/mz)
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i>		Aplicar preventivamente con la aparición de los primeros síntomas. Aplique a los 25 y 40 días después de la siembra con la aparición de los primeros síntomas. Se recomienda un volumen de preparación en agua de la mezcla en 400-600 L/Ha (280-420 L/mz)
Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i>	Mancha angular <i>Phaeoisariopsis griseola</i>		Aplicar dos veces el plaguicida, la primera en prefloración y la segunda aplicación en el llenado de las vainas, con una cantidad de agua de 200 l/ha

USOS AUTORIZADOS EN EL SALVADOR:

Cultivo	Plaga	Dosis	Observaciones
Melón <i>Cucumis melo</i>	Cenicilla polvorienta <i>Erysiphe cichoracearum</i>	0.4 - 0.8 kg/ha (0.28 - 0.56 kg/mz) en 200 a 600 L/ha de agua (140 - 420 L/mz) ó 1g de producto comercial por 1L de agua Utilizar un volumen de agua de 400 a 600 l/ha (280 a 420 l/mz)	Aplicar preventivamente con la aparición de los primeros síntomas. En el caso del melón y la sandía aplicar de 10 a 15 días luego del trasplante. Se recomienda un volumen de preparación en agua de la mezcla en 400-600 L/Ha (280-420 L/mz)
Sandía <i>Citrullus lanatus</i>			
Pepino <i>Cucumis sativus</i>			
Calabaza <i>Cucurbita moschata</i> , <i>Cucurbita pepo</i>			
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Tizon temprano <i>Alternaria solani</i>	0.6 - 0.8 kg/ha (0.42 - 0.56 kg/mz) Utilizar un volumen de agua de 400 a 600 l/ha (280 a 420 l/mz)	Se recomienda realizar 4 aplicaciones del producto durante el
Chile <i>Capsicum annuum L.</i>	Moho gris <i>Botrytis sp.</i>		
Papa <i>Solanum Tuberosum</i>	Mildiu polvoso <i>Leveillula taurica</i>	0.8 - 1.0 kg/ha (0.56 - 0.70 kg/mz). Utilizar un volumen de	

		agua de 400 a l/ha (280 l/mz)	ciclo del cultivo, con intervalos de 7 días entre aplicaciones. Iniciar aplicaciones de manera preventiva o con la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad.	<i>Fragaria vesca</i> Melón <i>Cucumis melo</i> Sandía <i>Citrullus lanatus</i> Pepino <i>Cucumis sativus</i> Calabaza <i>Cucurbita moschata</i> , <i>Cucurbita pepo</i>	<i>Botrytis cinerea</i>		
Brasicas: Brócoli <i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i> Repollo <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> L. Coliflor <i>Brassica oleracea</i> var. <i>Botrytis</i>	Pobredumbre seca <i>Phoma lingam</i> Alternaria <i>Alternaria brassicae</i> Mildiu <i>Peronospora brassicae</i>	700 g. ml de producto final/ha – 900 g. ml de producto final/ha Utilizar un volumen de agua de 400 a (280 l/mz)	Aplicar preventivamente con la aparición de los primeros síntomas. Se recomienda un volumen de preparación en agua de la mezcla en 400 L/ha (280 L/mz)	Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Tizón temprano <i>Alternaria solani</i> Moho gris <i>Botrytis cinerea</i>	0.8 kg/ha (0.56 kg/mz) ó 1g de producto comercial por 1L de agua. Utilizar un volumen de agua de 400 a	Aplicar preventivamente con la aparición de los primeros síntomas. En el caso del melón y la sandía aplicar de 10 a 15 días luego del trasplante. Se recomienda un volumen de preparación en agua de la mezcla en 400-600 L/ha (280-420 L/mz)
Zanahoria <i>Daucus carota</i>	Tizón temprano <i>Alternaria sp</i>	0.3 - 0.6 kg/ha (0.21 - 0.42 kg/mz) Utilizar un volumen de agua de 400 l/ha (280 l/mz)		Chile <i>Capsicum annuum</i> L Papa <i>Solanum tuberosum</i> Fitosanitario del Estado	Cenicilla o Mildiu polvoso <i>Leveillula taurica</i>	0.8 - 1.0 kg/ha (0.56 - 0.70 kg/mz). Utilizar un volumen de agua de 400 a l/ha (280 l/mz)	Se recomienda realizar 4 aplicaciones del producto durante el ciclo del cultivo, con intervalos de 7 días entre aplicaciones. Iniciar aplicaciones de manera preventiva o con la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad.
Cebolla <i>Allium cepa</i> Ajo <i>Allium sativa</i>	Mancha purpura <i>Alternaria porri</i>	0.8 - 1.2kg/ha (0.56-0.84 kg/mz) Utilizar un volumen de agua de 400 a 600 l/ha (280 a 420 l/mz)					
Arveja <i>Pisum sativum</i>	Antracnosis <i>Collectotrichum indemuthianum</i>	0.4, 0.8 y 1.2 kg/ha (0.28, 0.56 y 0.84 kg/mz) Utilizar un volumen de agua de 400 a 600 l/ha (280 a 420 l/mz)					
Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i>	Mustia hilachosa <i>Thanatephorus cucumeris</i> Mancha angular <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> Roya <i>Uromyces appendiculatus</i>	2g de producto comercial por 1 L de agua* ó 400 g en 200 L de agua Utilizar un volumen de agua de 200 a 250 l/ha (140 a 175 l/mz)					

UNIDAD DE REGISTRO DE AGROQUÍMICOS
EQUIPOS DE APLICACIÓN
APROBADO
15 MAY 2023
Lic. Jose A. Arce Campos

USOS AUTORIZADOS EN GUATEMALA:

Cultivo	Plaga	Dosis	Observaciones
Arveja <i>Pisum sativum</i>	Mildiu polvoso <i>Erysiphe heraclei</i> , <i>Erysiphe pisi</i> <i>Erysiphe betae</i> <i>Podosphaera fuliginea</i> Mancha foliar u ojo de pescado <i>Ascochyta pisi</i> Pudrición radicular o amarillo <i>Rhizoctonia solani</i>	0.8 kg/ha (0.56 kg/mz) ó 1g de producto comercial por 1L de agua. Utilizar un volumen de agua de 400 a 600 l/ha (280 a 420 l/mz)	Aplicar preventivamente con la aparición de los primeros síntomas. En frijol aplique a los 25 y 40 días después de la siembra con la aparición de los primeros síntomas.
Ejote Francés <i>Phaseolus vulgaris</i>	Roya <i>Uromyces appendiculatus</i>		
Zanahoria <i>Daucus carota</i>	Tizón de la hoja <i>Alternaria dauci</i>		
Brócoli <i>Brassica oleracea</i>	Pata negra <i>Plenodomus lingam</i> Rizoctonia <i>Rhizoctonia solani</i>		
Cebolla <i>Allium cepa</i> Ajo <i>Allium sativum</i>	Mancha purpura <i>Alternaria porri</i>		
Fresa	Botrytis		

*Se recomienda utilizar Break Thru 100 SL como coadyuvante a una dosis de 0.3 mL/L.

USOS AUTORIZADOS EN PANAMÁ:

Cultivo	Plaga	Dosis	Observaciones
Melón <i>Cucumis melo</i>	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	0.8 kg/ha (0.56 kg/mz) ó 1g de producto comercial por 1L de agua. Utilizar un volumen de	Aplicar preventivamente con la aparición de los primeros síntomas. En el caso del melón y la sandía aplicar de 10 a 15 días luego del trasplante. Se recomienda un volumen de preparación en agua de la mezcla en 400-600 L/ha (280-420 L/mz)

Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	<i>Leveillula taurica</i>	agua de 400 a 600 l/ha (280 a 420 l/mz)	Aplicar preventivamente con la aparición de los primeros síntomas. Se recomienda un volumen de preparación en agua de la mezcla en 400 L/Ha (280 L/mz)	Tizón temprano <i>Alternaria solani</i>	0.8 kg/ha (0.56 kg/mz) ó 1g de producto comercial por 1L de agua ó 200 g / tanque de 200 L.	Aplicar preventivamente con la aparición de los primeros síntomas.
Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i>	Mustia hilachosa <i>Thanatephorus cucumeris</i> Mancha angular <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> Roya <i>Uromyces appendiculatus</i>	0,5 – 0.6 kg/ha (2g de producto comercial por 1 L de agua ó 400g en 200 L de agua. Utilizar un volumen de agua de 200 a 250 l/ha (140 a 294 l/mz)	Aplicar preventivamente con la aparición de los primeros síntomas. En frijol aplique a los 25 y 40 días después de la siembra con la aparición de los primeros síntomas. Se recomienda un volumen de preparación en agua de la mezcla en 200 L/Ha (140 L/mz)	Moho gris <i>Botrytis spp.</i> <i>Oidium spp.</i> Antracnosis <i>Colletotrichum spp.</i> Podrición blanca <i>Sclerotinia spp.</i>	Se recomienda un volumen de preparación en agua de la mezcla en 400-600 L/Ha (280-420 L/mz)	

USOS AUTORIZADOS EN REPÚBLICA DOMINICANA:

Cultivo	Plaga	Dosis	Observaciones
Melón <i>Cucumis melo</i>	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	0.8 kg/ha (0.56 kg/mz) ó 1g de producto comercial por 1L de agua ó 200 g / tanque de 200 L de agua. Se recomienda un volumen de preparación en agua de la mezcla en 400-600 L/Ha (280-420 L/mz)	Aplicar preventivamente con la aparición de los primeros síntomas. Aplicar de 10 a 15 días luego del trasplante.
	Mildió polvoso <i>Sphaerotheca fuliginea</i>	0.8-1.0 kg/Ha	Utilizar un volumen de agua de 250 a 300 L/ha.
	Gomosis del tallo <i>Didymella bryoniae</i>	0.8 kg/Ha	Realizar 1 aplicación dirigida a la base del tallo (Drench) a los 3 días de la remoción de la cubierta protectora usada.
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Moho gris <i>Botrytis spp.</i> Mildiu polvoso <i>Leveillula taurica</i> <i>Oidium spp.</i> Antracnosis <i>Colletotrichum spp.</i> Podrición blanca <i>Sclerotinia spp.</i>	0.8 kg/ha (0.56 kg/mz) ó 1g de producto comercial por 1L de agua ó 200 g / tanque de 200 L. Se recomienda un volumen de preparación en agua de la mezcla en 400-600 L/Ha (280-420 L/mz)	Aplicar preventivamente con la aparición de los primeros síntomas.
	Tizón temprano <i>Alternaria solani</i>	0.65-0.80 kg/Ha	Usar un volumen de agua de 400-500 L/Ha

Chile <i>Capsicum annuum</i>	Mildió polvoso <i>Leveillula taurica</i>	0.8-1.0 kg/Ha	Usar un volumen de agua de 400 L/Ha	Realizar un máximo de 4 aplicaciones foliares con un intervalo de 7 días, iniciando al momento de la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad.
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Moho gris <i>Botrytis spp.</i> Mildiu polvoso <i>Leveillula taurica</i> <i>Oidium spp.</i> Antracnosis <i>Colletotrichum spp.</i> Podrición blanca <i>Sclerotinia spp.</i>	0.8 kg/ha (0.56 kg/mz) ó 1g de producto comercial por 1L de agua ó 200 g / tanque de 200 L.		Aplicar preventivamente con la aparición de los primeros síntomas. Se recomienda un volumen de preparación en agua de la mezcla en 400-600 L/Ha (280-420 L/mz)
Zanahoria <i>Daucus carota</i> Cebolla <i>Allium cepa</i> Ajo <i>Allium sativum</i>	<i>Alternaria dauci</i> <i>Alternaria porri</i>	0.8 kg/ha (0.56 kg/mz) ó 1g de producto comercial por 1L de agua. Utilizar un volumen de agua de 400 a 600 l/ha (280 a 420 l/mz)		Aplicar preventivamente con la aparición de los primeros síntomas. Se recomienda un volumen de preparación en agua de la mezcla en 285 L/Ha (199.5 L/mz)
Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i>	Mustia hilachosa <i>Thanatephorus cucumeris</i> Mancha angular <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> Roya <i>Uromyces appendiculatus</i>	2g de producto comercial por 1 L de agua* ó 400 g en 200 L de agua. Utilizar un volumen de agua de 200 a 250 l/ha (140 a 175 l/mz)		Aplicar preventivamente con la aparición de los primeros síntomas. En frijol aplique a los 25 y 40 días después de la siembra con la aparición de los primeros síntomas. Se recomienda un volumen de preparación en agua de la mezcla en 285 L/Ha (199.5 L/mz)

INTERVALO DE APLICACIÓN: Se recomienda la aplicación cada 7 días. Hacer entre 4 a 6 aplicaciones como máximo durante el ciclo del cultivo. Para Ejote Francés, Frijol y Arveja se recomienda realizar 2 aplicaciones como máximo durante el ciclo de cultivo.

Papa, Chile, melón: 7 días

Tomate: 8-14 días

Para Costa Rica:

Cultivo de melón, sandía y tomate el intervalo de aplicación es cada 7 días, número máximo de aplicaciones es 4-6 por ciclo de cultivo

Cultivo de papaya: el intervalo de aplicación es cada 7 días con un número máximo de aplicaciones 3 por ciclo de cultivo

Cultivo de zanahoria el intervalo de aplicación es cada 15 días con un máximo de 4 aplicaciones por ciclo de cultivo.

Cultivo de frijol 2 aplicaciones por ciclo de cultivo.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

0 días (no existe restricción), con excepción del **Ejote Francés y Arveja** en los cuales se debe dejar un período de 7 días; en Frijol es de 14 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Una vez que el producto sobre la superficie tratada haya secado. En caso de que se necesite entrar antes de este período, utilice los equipos de protección individual recomendados. En Nicaragua por recomendación de la autoridad hasta 12 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y bajo las recomendaciones dados en este panfleto.

COMPATIBILIDAD: **BELLIS 38 WG** presenta incompatibilidad química en mezclas con pH menor a 5 y mayor a 6,5. No agregar a mezclas con caldo bordelés o fertilizantes cálcicos, o a mezclas que se les haya bajado el pH con ácido cítrico o ácido sulfónico. **BELLIS 38 WG** es compatible con la mayoría de los productos utilizados en los cultivos como dimethomorph, clorfenapir y piretroides que existen en el mercado.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No es inflamable ni corrosivo. No transporte ni almacene **BELLIS 38 WG**, junto con alimentos para humanos, ni animales, medicinas, ropa, artículos de uso doméstico o fertilizantes. Estable bajo condiciones normales. Almacenar el producto en su recipiente original en un lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos de las fuentes de ignición, el calor, las llamas o cargas electrostáticas, protegido de la luz solar y lejos del alcance de los niños o personas mentalmente incapacitadas. Se recomienda el uso de indumentaria de trabajo cerrada.

Manéjelo con cuidado para evitar la formación y deposición de polvo. Limpiar a fondo con agua y tensoactivos, los utensilios y el suelo contaminados, teniendo en cuenta las normas sobre la protección del medioambiente. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. Recolectar los residuos en contenedores adecuados, etiquetados y cerrados. Eliminar el material recogido de forma reglamentaria según la legislación nacional. El polvo puede formar una mezcla explosiva con el aire. Proteja de temperaturas superiores a los 40 °C. Puede almacenarse por un período de 24 meses.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Por inhalación y contacto puede irritar ojos y la piel. Es nocivo por ingestión.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: no induzca al vómito. Lleve de inmediato al paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

Para **Nicaragua** mantenga los párpados abiertos mientras lava los ojos con abundante agua limpia de 15 a 20 minutos.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONO
Centro de Información y asistencia Toxicológica (CIAT)	GUATEMALA	(502) 2251-3560/ 2232-0735
Hospital Nacional Rosales	EL SALVADOR	(503) 2231-9262
Hospital Escuela	HONDURAS	(504) 2232-2322 (505) 2289-4700 ext. 1294/ Mobile: 87550-983
Centro de Información, Vigilancia y Asesoramiento toxicológico	NICARAGUA	(506) 2223-1028
Centro Nacional de Control de Intoxicaciones	COSTA RICA	(507) 523-4948
Centro de investigación e información de Medicamentos y tóxicos (CIIMET)	PANAMÁ	(507) 523-4948
Hospital Dr. Luis Aybar	REPÚBLICA DOMINICANA	809-7828
Hospital Dr. Francisco Moscoso	PARAGUAY	595-1788

APROBADO

PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS

Lic. Jose A. Arce Campos



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

**BOSCALID: PERSISTENTE EN SUELO. NO PERSISTENTE EN AGUA.
PYRACLOSTROBIN: MODERADAMENTE PERSISTENTE EN SUELO. NO PERSISTENTE EN AGUA.**

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En caso de derrames o desechos de plaguicidas recogerlos con aserrín o con algún material absorbente, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o desear según la legislación nacional. Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, deseche las bolsas/envases vacíos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue ésta al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto. Los residuos del producto y su bolsa/envase deben eliminarse con todas las precauciones posibles, según manejo y desecho de residuos peligrosos. Para Nicaragua no transporte ni almacene este producto junto con alimento, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los insecticidas en contacto con otros agroquímicos, fertilizantes, semillas. Almacenar bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su empaque original, etiquetado, con su panfleto y cerrado herméticamente. Prohibido disponer los remanentes o empaques en vertederos, botaderos y/o relleno sanitario autorizados o ilegales. En Nicaragua estos sitios son para desechos sólidos domiciliarios no peligrosos.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA: BASF S.A. garantiza que la composición química y la concentración de este producto, corresponden a lo que indica BASF en la presente etiqueta. Las recomendaciones de uso se basan en rigurosos y amplios ensayos de campo en diferentes partes del mundo por lo que, al

adquirir este producto, el usuario adquiere la responsabilidad de su correcto uso y manejo, por lo tanto, BASF no asume garantías y responsabilidades expresas o implícitas, por el uso de este producto de manera diferente o contrario a lo recomendado. Los períodos de carencia indicados en el panfleto son para las condiciones locales, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino.

FORMULADO POR:

BASF Corporation, 26 Davis Drive, Research Triangle Park, NC 27709, USA. Teléfono: +1 973 245-6000 correo: global.info@basf.com

IMPORTADOR:

GUATEMALA: **BASF Guatemala**
Avenida Petapa 47-31, Zona 12, Ciudad Guatemala, Guatemala.
Tel.: 2445-7600, Fax: 2445-7698

COSTA RICA: **BASF Costa Rica S. A.**
EPIC Corporate Center, Escazú.
San José, Costa Rica
Tel.: 2201-1900, Fax: 2201-8221

EL SALVADOR: **DUWEST El Salvador S.A.** Calle Siemens No 56, zona industrial Santa Elena, calle Antiguo Cuscatlán, La Libertad, Tel: 2521-1217.
Distribuidores e Importadores Agrícolas (DIAGRI S.A DE CV). 6a Calle Ote. N° 24, Rosario la Paz Depto. La Paz, El Salvador C.A.
Técnica Universal Salvadoreña, S.A. de CV. Km 9 ½ Carretera al Puerto de la Libertad, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador.
EL SURCO SA DE CV. 4ª. Avenida sur y calle Daniel Hernández No. 2-9 B, Santa Tecla

REPÚBLICA DOMINICANA **BASF Dominicana S.A.** Gustavo Mejía Ricart No. 11 Edificio Rogama, 3er piso En sanche Naco, Santo Domingo. Tel: 3341026; 5320088, Fax: 3341027.

PAÍS Y NÚMERO DE REGISTRO:

Costa Rica	5224
El Salvador	0346-1
Guatemala	AG.2005050740
	78-115
	78-115A
Honduras	354-182-II
Nicaragua	BA-193C-1-2007
Panamá	1716
República Dominicana	2502

UNIDAD DE REGISTRO DE AGROQUÍMICOS Y EQUIPOS DE APLICACIÓN

Departamento
Fitosanitario
del Estado
SAN JOSÉ - COSTA RICA

APROBADO

* 15 MAY. 2023 *

Lic. Jose A. Arce Campos

FIRMA: _____