

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.



BOLERO 96 EC

HERBICIDA – TIOCARBAMATO
TIOBENCARB



DAÑINO
ANTÍDOTO: NO TIENE.

DENSIDAD: 1.135 g/ml A 20° C.
SOLVENTE: Keroseno.

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O INHALA
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,
ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



USO AGRONÓMICO.

MODO DE ACCIÓN.

Este es un herbicida sistémico, se absorbe por el follaje y raíces vía floema y xilema, interfiere con la síntesis de proteínas e inhibe la fotosíntesis. Este producto se usa para el control de gramíneas ciperáceas y hojas anchas en arroz. El Bolero es un herbicida de amplio uso en arroz oryza sativa tanto de secano como de inundación. Su acción de pre-emergencia tardía y de post-emergencia temprana se fundamenta en su capacidad de inhibir la germinación de las semillas e interferir en la fotosíntesis de las malezas.

EQUIPO DE APLICACIÓN.

Puede aplicarse con equipo terrestre de espalda o equipo acoplado a un tractor y vía aérea. Para equipo aéreo se utiliza entre 55-70 litros de caldo por ha. Para el equipo de espalda utilice boquilla de abanico. Antes de cargar el equipo de aplicación cerciórese de que el mismo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento, sin escapes de caldos y debidamente calibrado. Para la mezcla, aplicación y lavado del equipo use la ropa de protección completa. El filtro de la mascarilla debe cambiarse a menudo. Evite el contacto directo con el producto. Evite respirar la llovizna de aspersión.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA.

Llene el tanque hasta las tres cuartas partes de su capacidad, vierta la dosis correcta, agite y luego llene hasta su capacidad total. El equipo y los utensilios utilizados en mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua y jabón después de cada jornada de trabajo.

RECOMENDACIONES DE USO.

PAÍS: COSTA RICA.

MALAS HIERBAS A COMBATIR		
GRAMÍNEAS Zacate de Agua Pata de Gallina Plumilla Brachiaria Digitaria Cadiño Cola de Zorro	<i>Echinochloa</i> spp <i>Eleusine indica</i> <i>Leptochloa filiformis</i> <i>Brachiaria</i> spp <i>Digitaria sanguinalis</i> <i>Cenchrus brownii</i> <i>Setaria</i> sp	CIPERÁCEAS <i>Cyperus difformis</i> <i>Cyperus micrurus</i> <i>Cyperus iria</i> <i>Cyperus diffusus</i>

MODO DE CULTIVO	TIPO DE APLICACIÓN	OTRAS INDICACIONES
ARROZ <i>Oryza sativa</i> Sembrado en Seco	Pre-emergente tardía	Aplicarlo 3-5 días después de la siembra de arroz. Use 3 litros de Bolero por hectárea en 80 litros de agua para aplicaciones aéreas o 200 litros para aplicación terrestre. El suelo debe estar húmedo y sin terrones.
	Post-emergente	Se usa cuando las malezas están empezando a brotar del suelo y no tienen aún 2 o más hojas, 7-9 días después de la siembra de arroz. Use 3 litros de Bolero por hectárea en las mismas cantidades del caldo y condiciones del suelo.
ARROZ <i>Oryza sativa</i> De inundación	Aérea	Aplice en el lapso de 1-7 días antes de inundar a razón de 3-4 litros de Bolero en 80 litros de agua/ha. Si prefiere aplicar después de la inundación, hágalo a las mismas dosis pero en un lapso de 7-21 días después de la inundación.
	Terrestre	Aplicarlo en un lapso de 1-7 días antes de inundar el campo a razón de 3-8 litros de Bolero en 200-300 litros de caldo por hectárea.

FORMA ADECUADA DE APLICACIÓN.

El producto se debe aplicar al follaje de la maleza.

El Bolero se aplica al suelo, por lo que es importante:

- Una buena preparación del suelo.
- Usarlo después de que haya sido sellado por la lluvia o en todo caso, debe haber humedad.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA.

No existe intervalo entre la última aplicación y la cosecha ya que se aplica en las primeras etapas del ciclo y éste lo metaboliza muy rápidamente.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA.

48 horas después de aplicarlo. En caso necesario de hacerlo antes, deberá usarse el equipo de protección completo.

FITOTOXICIDAD.

No se use en pre-emergencia en arroz sembrado al voleo.

COMPATIBILIDAD.

Si se mezcla con Propanil, debe tenerse cuidado de no usar insecticidas de tipo fosforado o carbamato, porque se produce quemaduras en arroz. En estos casos consulte al técnico.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE.

Peligro Físico – Químicos:

Este producto no es inflamable, no es explosivo y no es corrosivo.

No transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios domésticos. No mantenga los herbicidas en contacto con otros agroquímicos.

Almacene bajo llave en un lugar seco y aireado, alejado del calor y del fuego. Conserve en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases o bolsas sin cerrar.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN.

Irritación gastrointestinal, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. Puede incluir además depresión, pérdida de coordinación muscular y dolor de cabeza.

PRIMEROS AUXILIOS.

Ingestión: No induzca el vómito ya que puede provocar aspiración pulmonar. Dé a beber agua para diluir el producto.

Inhalación: Retire a la persona afectada del área contaminada a una mayor ventilación y manténgala en reposo. Si es necesario administre respiración artificial.

Contacto con los ojos: Lávese inmediatamente con agua durante 15 minutos. Obtenga atención médica en todo caso.

Contacto con la piel: Quítese las prendas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO.

No tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN.

INSTITUCIÓN
Centro Nacional de Control de Intoxicaciones

PAÍS
Costa Rica

NÚMERO DE TELÉFONO
2223-1028

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

Tóxico para peces.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

Tóxico para abejas.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES.

Perfore y entierre los envases vacíos a una profundidad no menor de 40 centímetros del borde superior del mismo, lejos de fuentes de agua tanto superficiales como subterráneas y casas de habitación. Recoja los derrames del producto o remanentes no utilizables con aserrín, tierra o algún otro material absorbente y entiérrelo en forma similar a los envases desechados.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS,
PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

AVISO DE GARANTÍA.

Debido a que está fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento, manipuleo y uso de este producto, nos es imposible asumir responsabilidad por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Nuestra responsabilidad recae únicamente a la composición química del producto tal y como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el envase se encuentre debidamente sellado y el uso agronómico citado en este panfleto.

FABRICANTE:

KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
4-26, Ikenohata 1-Chome, Taitoh-Ku
Tokyo 110, Japan.
Tel.: (03) 3822-5065

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

DAC – DISTRIBUIDORA AGROCOMERCIAL S.A.
Tel: 2494-9800 • Fax: 2249-3733 • El Coyol, Alajuela, Costa Rica.
info@agrodac.com • www.agrodac.com

PAÍS
Costa Rica

NÚMERO DE REGISTRO
1760

FECHA DE REGISTRO
01-04-93

NÚMERO DE PERMISO DE REEMPAQUE
08