

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

CHESS® 50 WG

INSECTICIDA – PIRIDINE
PYMETROZINE

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O
SE INHALA. PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL
POR EXPOSICIÓN

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”
“MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS
MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS,
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

CHESS® 50 WG es un insecticida sistémico y de contacto, que afecta el sistema nervioso, inhibiendo el hábito alimenticio de los insectos.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

CHESS® 50 WG puede ser aplicado con equipo accionado por tractor, aspersora de mochila o por sistema de fertirrigación.

Calibre el equipo adecuadamente, previo a la aplicación y lávelo inmediatamente después de usarlo. Asegúrese que el equipo de aplicación esté en buenas condiciones. Recuerde obtener el equipo auxiliar adecuado (medidores de productos líquidos y sólidos, cubetas graduadas, paletas de agitación, cepillos, brochas, etc.)



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Agregue la cantidad recomendada de CHESS® 50 WG en un recipiente con agua para realizar una pre-mezcla. Esta mezcla agregarla al tanque que contiene el agua total a asperjar. Se recomienda una cantidad de 200-500 L de agua por hectárea (140 – 350 L de agua por manzana).

Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto, durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación: botas, mascarilla, anteojos, guantes, dosificador y equipo de aplicación en buen estado.



RECOMENDACIONES DE USO:

USOS AUTORIZADOS EN GUATEMALA Y HONDURAS			
Melón	<u>Cucumis melo</u>	Mosca	<u>Bemisia argentifolii</u>
Sandía	<u>Citrullus vulgaris</u>	blanca	<u>Bemisia tabaci</u>
Calabaza	<u>Cucurbita sp</u>	Mosca	<u>Bemisia argentifolii</u>
		blanca	<u>Bemisia tabaci</u>
Tomate	<u>Solanum</u>	Afidos	<u>Aphis sp</u>
	<u>lycopersicum</u>	Afidos	<u>Myzus sp</u>
		Afidos	<u>Brevicoryne sp</u>
		Paratrioza	<u>Bactericera cockerelli</u>

Calabaza, melón y sandía: 300 – 450 gramos/ha (210 – 315 gramos/mz), o de 0,9 a 1,75 gramos por litro de agua.

Tomate – Afidos: 250 - 350 gramos/ha (175 – 245 gramos/mz), o de 0,7 a 1,25 gramos por litro de agua.

Tomate – Paratrioza: 0.6 Kg/ha en aplicaciones foliares.

USOS AUTORIZADOS EN EL SALVADOR

Melón	<u>Cucumis melo</u>	Mosca	<u>Bemisia argentifolii</u>
Sandía	<u>Citrullus vulgaris</u>	blanca	<u>Bemisia tabaci</u>
Tomate	<u>Solanum</u>	Afidos	<u>Aphis sp</u>
	<u>lycopersicum</u>	Afidos	<u>Myzus sp</u>
		Afidos	<u>Brevicoryne sp</u>
		Paratrioza	<u>Bactericera cockerelli</u>

Melón y sandía: 300 – 450 gramos/ha (210 – 315 gramos/mz), o de 0,9 a 1,75 gramos por litro de agua.

Tomate – Afidos: 250 - 350 gramos/ha (175 – 245 gramos/mz), o de 0,7 a 1,25 gramos por litro de agua.

Tomate – Paratrioza: 0.6 Kg/ha en aplicaciones foliares.

USOS AUTORIZADOS EN PANAMÁ

Melón	<u>Cucumis melo</u>	Mosca	<u>Bemisia argentifolii</u>
Sandía	<u>Citrullus vulgaris</u>	blanca	<u>Bemisia tabaci</u>
Tomate	<u>Solanum</u>	Afidos	<u>Aphis sp</u>
	<u>lycopersicon</u>	Afidos	<u>Myzus sp</u>
		Afidos	<u>Brevicoryne sp</u>

DOSIS RECOMENDADAS:

Melón y sandía: 300 – 450 gramos/ha (210 – 315 gramos/mz), o de 0,9 a 1,75 gramos por litro de agua.

Tomate y chile: 250 - 350 gramos/ha (175 – 245 gramos/mz), o de 0,7 a 1,25 gramos por litro de agua.

Algodón: 375 gramos/ha (262 gramos/mz), en un volumen de 200 litros de mezcla por hectárea.

EPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar CHESS® 50 WG al inicio de la infestación, dentro de un programa preventivo, antes que las poblaciones lleguen a niveles de daño.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Dependiendo de la incidencia poblacional de insectos, se recomienda cada 7 a 14 días, en alternancia con otros compuestos.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Tres días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Un día después de haberse asperjado.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a los cultivos y en las dosis recomendadas. Debido al amplio número de materiales genéticos de cada cultivo, siempre se recomienda realizar una prueba a pequeña escala y observar si es fitocompatible.

COMPATIBILIDAD:

CHESS® 50 WG es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas, fertilizantes y micronutrientes líquidos. Sin embargo, siempre se recomienda realizar una prueba de compatibilidad a pequeña escala con los productos a utilizar. Ante la imposibilidad de conocer todos los productos del mercado, no asumimos ninguna responsabilidad por mezclas hechas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

CHESS® 50 WG no es inflamable, no es explosivo ni corrosivo. No almacene ni transporte junto con productos de consumo animal y humano. Transpórtelo en su envase original, bien cerrado y debidamente etiquetado con su correspondiente panfleto. Almacénelo en un lugar seco y bien ventilado, lejos del alcance de los niños o personas mentalmente incapacitadas.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO
Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA**



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

No se conocen casos de intoxicación en humanos.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Si la persona está consciente, dar a beber de cuatro a seis (4-6) cucharadas de carbón activado en un (1) vaso de agua. Contacte a un médico inmediatamente.

POR INHALACIÓN: Retire al paciente del área contaminada y llévelo a un lugar fresco y ventilado; protéjalo de la hipotermia.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Abra los párpados y lávelos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lave cuidadosamente las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón.

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A
PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto específico. Aplique terapia sintomática.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	TELÉFONO
GUATEMALA	Centro de Información y Asesoría Toxicológica	1-801-00-29832 2251-3560, 2232-0735
	Karl Heusner Memorial Hospital	231-548 y 231-639
BELICE	Dr. Hurrissa Hailu	622-460
EL SALVADOR	Hospital Nacional Rosales	2231-9262
HONDURAS	Hospital Escuela	232-2322 y 232-2415
NICARAGUA	Centro Nacional de Toxicología	2289-4700, ext. 1294, 87550983
COSTA RICA	Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones	2223-1028
PANAMÁ	Centro de Información e Investigación de Medicamentos y Tóxicos	523-4948, 523-4968
REPÚBLICA	Hospital Dr. Luis Aybar	684-3478 y 684-3672
DOMINICANA	Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello	681-2913 y 681-6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

No contamine con este producto o sus envases, desechos o derrames: ríos, lagos, charcas, zanjas, canales de drenaje, alcantarillas, etc. Evite los derrames del producto por la contaminación que puede provocar a las fuentes de agua. No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre del producto hacia otras áreas.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En el caso de derrames o desechos del producto, recogerlos con aserrín o con material absorbente, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos. A fin de evitar remanentes, se sugiere preparar la mezcla a utilizar en el día.

Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE
PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS,
PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

AVISO DE GARANTÍA:

El formulador garantiza el contenido de este envase, siendo apto el producto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso. El buen uso será responsabilidad exclusiva del comprador.

FORMULADOR:

Gowan Milling LLC
12300 E County 8th Street, Yuma, AZ 85365,
Estados Unidos
Tel: ++ 1 928 3441014 / Fax: ++ 1 928 3449445

IMPORTADO POR:

Guatemala:

Agro Insumos, S.A.

5ª Avenida 5-55 zona 14, Edificio Europlaza, Torre 3, 8º Nivel
Tel. 2312-7000 / Fax 2312-7005

El Salvador:

Tecunsa, S.A. de C.V.

Km 9.5 Carretera Puerto La Libertad, Antiguo Cuscatlán
La Libertad, El Salvador.
Tel. 503 2121-2000

Honduras:

Costa Rica:

Syngenta Crop Protection, S.A. – Sucursal Costa Rica

700 m este de la Intersección del Aeropuerto Juan Santamaría,
calle paralela, contiguo Zona Franca Saret, Plaza Aeropuerto, Oficina
D1, Alajuela, Costa Rica. Tel. (506) 2431-4707. Fax: 2431-4710

Panamá:

Syngenta, S.A.

R.U.C. 5306-2-329422 D.V.80, Clave 3987
Business Park, Costa del Este,
Ave. La Rotonda, Edificio Torre V, Piso 12 Ciudad de Panamá
República de Panamá.
Tel.: 270-8200 / Fax: 270-8288

República Dominicana:

Syngenta Crop Protection, S.A. – Sucursal República Dominicana

Porfirio Herrera No. 29, Torre Empresarial INICA, Local 4W
Ensanche Evaristo Morales, Santo Domingo
Tel.: 1-809 227-0414. Fax 1-809 540-9340

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS PANAMÁ	1580	14-01-2014