

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.



CLIPPER 68 WG

HERBICIDA - FOSFÓNICO

GLYPHOSATE

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTENERSE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO.

MODO DE ACCIÓN: CLIPPER 68 WG es un herbicida sistémico a base de glifosato, no selectivo. Absorbido por el follaje, con translocación rápida en la planta, actúa en varios procesos enzimáticos, interfiriendo con la formación de aminoácidos, se inactiva con el contacto con el suelo, controla malezas de hoja ancha y gramíneas.

EQUIPO DE APLICACIÓN: revise que el equipo de aplicación esté en buenas condiciones de uso y calibrado. Se puede aplicar por vía terrestre con bomba de espalda manual a un volumen de hasta 400 l/ha así como aplicación mecánica terrestre con un volumen de hasta 400 litros de agua por hectárea. Se debe utilizar boquillas de abanico plano. El producto no ejerce acción física ni química sobre el equipo de aplicación.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: para preparar el caldo final de aplicación llenar el tanque hasta la mitad con agua, agregue la dosis de CLIPPER 68 WG, poniendo el sistema de agitación o recirculación a funcionar, termine de llenar con agua limpia, mantenga siempre en agitación o recirculación de la mezcla.



RECOMENDACIONES DE USO: Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana.

CULTIVOS	DOSIS kg/ha
Café	<i>Coffea arabica</i>
Cítricos	<i>Citrus</i> sp.
Banano	<i>Musa</i> spp.
Palma africana	<i>Elaeis</i> sp.
Aguaate	<i>Persea americana</i>
Caña de azúcar	<i>Saccharum officinarum</i>
Macadamia	<i>Macadamia integrifolia</i>

CULTIVOS	DOSIS kg/ha
PRESEMBRA	
Arroz	<i>Oryza sativa</i>
Sorgo	<i>Sorghum bicolor</i>
Maíz	<i>Zea mays</i>
Piña	<i>Ananas comosus</i>
Frijol	<i>Phaseolus vulgaris</i>
Melón	<i>Cucumis melo</i>
Sandia	<i>Citrullus lanatus</i>
Otros usos: En canales de riego, bordes de los campos y orillas de caminos.	

MALEZAS QUE CONTROLA:

Mozote *Bidens pilosa*, Pincelillo *Emilia sonchifolia*, Santa Lucía *Ageratum conyzoides*, Bledo *Amaranthus hybridus*, Flor amarilla *Melampodium divaricatum*, Arroz rojo *Oryza sativa*, Pata de gallina *Eleusine indica*, Alambriillo *Digitaria sanguinalis*, Caminadora *Rottboellia exaltata*, Cabezón *Paspalum paniculatum*, Zacate para *Brachiaria mutica*, Grama *Paspalum* sp., Pasto jaraquea *Hyphanemia rufa*, Pajón *Paspalum virgatum*, Kikuyo *Pennisetum clandestinum*, Pasto guinea *Panicum maximum*, Zacate Johnson *Sorghum halepense*, Estrella africana *Cynodon plectostachyus*, Pasto elefante *Pennisetum purpureum*.

ÉPOCA DE APLICACIÓN: se aplica en postemergencia a la maleza según sea el caso.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 0 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: se debe esperar a que el rocío de la aplicación haya secado o utilizar el equipo de protección personal completo.

FITOTOXICIDAD: no es fitotóxico a las dosis y épocas recomendadas en este panfleto.

COMPATIBILIDAD: no se conoce incompatibilidad con otros productos de uso común en los cultivos recomendados en este panfleto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: almacene y transporte el producto en lugares frescos secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes y medicinas. Manténgalo en su envase original, cerrado herméticamente y etiquetado. No es inflamable, no es explosivo, resistente a la oxidación y la luz, no es corrosivo.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: se presenta una leve irritación de los ojos y membranas mucosas provocando un enrojecimiento de las mismas.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: en caso de ingestión no induzca el vómito. No administre nada vía oral si la persona está inconsciente. Busque atención médica.

INHALACIÓN: retire el paciente a un lugar ventilado y seco. Afloje las prendas de vestir y vigile la respiración.

CONTACTO CON LOS OJOS: lave inmediatamente con suficiente agua limpia durante 15 minutos.

CONTACTO CON LA PIEL: quite las prendas de vestir y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto. Seguir tratamiento sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN	PAÍS	Nº TELÉFONO
Centro de Información y Asistencia Toxicológica	Guatemala	230-0080 / 1-801-00298-32
Ministerio de Salud	El Salvador	288-0417
Secretaría de Recursos Naturales Sanidad Vegetal	Honduras	311-006
Centro Nacional de Toxicología	Nicaragua	289-4514
Centro Nacional de Intoxicaciones	Costa Rica	2223-1028
Centro Nacional de Investigaciones e Información de Medicamentos y Tóxicos	Panamá	269-2741

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: en caso de derrames o desechos de plaguicidas recogerlos con aserrín o con material absorbente y para producto sólido recoger con una pala, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud. Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perforélos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue ese al centro de recolección más cercano o desecho de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA: la compañía fabricante y el registrante, así como el distribuidor garantizan el contenido de este envase, siempre que se encuentre en su envase original bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. Sólo garantizamos el contenido inalterable del producto de acuerdo a lo estipulado en la etiqueta y el uso recomendado en el panfleto. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de ello.

FORMULADO POR:

Bajo acuerdo de manufactura con Insecticidas Internacionales, S.A. por: **AGROSER S.A.** Agroquímicos, Semillas y Equipos de Riego, S.A. Avenida Carrera 20, # 80 – 60, Oficina 302, Barrio Los Héroes, Bogotá, D.C. Colombia. Telefax 00-57-1-6348391-92-93.

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDORA AGRO COMERCIAL S.A.
Zona Franca BES, Coyoil, Alajuela, Costa Rica.
Cédula jurídica. 3-101-010782.
Teléfono: 2494-9800.

DISTRIBUIDO POR:

PAÍS	Nº DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
COSTA RICA	4861	10-07-2002

