

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.



CUPRITAZELL 24 SC

FUNGICIDA, BACTERICIDA - INORGANICO
COPPER SULPHATE PENTAHYDRATE

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE
DENSIDAD (20°C): 1.20 g/ml

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O
SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y LA
PIEL POR EXPOSICIÓN

"NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN"



"MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS
MENTALMENTE, INCAPACES, ANIMALES DOMESTICOS
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS"

USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

CUPRITAZELL 24 SC es un fungicida-bactericida sistémico con acción de contacto y curativa. Se absorbe a través de las hojas y raíz y se transporta sistémicamente vía floema y xilema. El cobre forma complejos con algunos grupos químicos que descomponen las células de los patógenos.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Antes de aplicar, asegúrese que el equipo de aplicación este debidamente calibrado y el equipo de protección esté en buenas condiciones de uso. Se recomienda su aplicación en forma terrestre en un volumen de caldo de 200 litros de mezcla/ha de agua mínimo. Utilice boquilla tipo abanico plano durante la aplicación. Durante el manejo y aplicación utilice equipos de protección: overol, guantes y botas de hule, gafas y mascarilla.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen de agua; agregar la dosis recomendada del producto y termine de llenar con agua el volumen del tanque de aplicación agitando vigorosamente. Los utensilios usados como, dosificadores, cubeta, toneles, durante la preparación y aplicación de la mezcla deben ser lavados después de cada jornada de trabajo, por lo menos tres veces. Recuerde brindar mantenimiento permanente al equipo de aplicación.



RECOMENDACIONES DE USO:

Para Costa Rica: Melón, pepino, sandía, tomate, papa y Chile dulce.

Para El Salvador, Nicaragua, Panamá y R. Dominicana.

Cultivos	Enfermedades	Dosis de aplicación
Melón (<i>Cucumis Melo</i>)	Mildiu polvoso (<i>Oidium</i> spp.)	Dosis preventiva: 0.75-1.0 litro/ha
Pepino (<i>Cucumis sativus</i>)	Mildiu vellosa (<i>Peronospora parasitica</i>)	1.25-1.5 ml/litro de agua
Sandía (<i>Citrullus vulgaris</i>)	Mancha bacterial (<i>Xanthomonas vesicatoria</i>)	Dosis curativa: 1.0-1.5 litro /ha. 1.5-3.0 ml/litro de agua
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>).	Tizón Temprano (<i>Alternaria</i> spp.)	Al transplante: Inmersión de Plántulas: 1.5-2.0 ml/ litro de agua
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Tizón Tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	Inmersión (semilla de papa) 1.5- 3.0 ml por litro de agua
	Mancha de la hoja (<i>Stemophyllum solana</i>)	
	Bacteriosis (<i>Erwinia</i> sp), (<i>Xanthomonas</i> sp), (<i>Pseudomonas</i> sp)	
Chile dulce (<i>Capsicum annuum</i>)	Mancha bacterial (<i>Xanthomonas vesicatoria</i>)	Al suelo: 1.5-3.0 ml por litro de agua y por m ²
	Ojo de pájaro (<i>Cercospora capsici</i>)	
Maní (<i>Arachis hypogaea</i>)	Viruela temprana (<i>Cercospora arachidicola</i>)	Dosis preventiva: 0.3-0.5 L/ha (0.21-0.35 L/mz)
	Viruela tardía (<i>Cercosporidium personatum</i>)	Dosis curativa: 0.75-1.0 L/ha (0.52- 0.7 L/mz)
	Podredumbre (<i>Sclerotinia</i>)	
Tabaco (<i>Nicotiana tabacum</i>)	Mancha foliar (<i>Cercospora</i> sp.)	Inmersión de las plántulas: 1.5-2.0 ml/L agua
	Moho azul (<i>Peronospora</i> sp.)	
	Antracnosis (<i>Collectotrichum</i>)	

Plátano (<i>Musa</i> sp.)	Sigatoka amarilla (<i>Mycosphaerella musicola</i>) Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>) Bacteriosis (<i>Erwinia</i> , <i>Pseudomonas</i>)	Dosis preventiva: 0.75-1.0 L/ha (0.52-0.7 L/mz)
Piña (<i>Ananas sativus</i>)	Fusariosis (<i>Fusarium</i> sp.)	Dosis curativa: 1.0-1.5 L/ha (0.7-1.0 L/mz)
Coco (<i>Cocos nucifera</i>)	Pudrición del cogollo (<i>Phytophthora palmivora</i>)	
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Tizón (<i>Piricularia oryzae</i>) Mancha foliar (<i>Cercospora</i>) Pudrición (<i>Rhizoctonia</i> sp.) Phytophthora spp. Phyium spp. Fusariosis (<i>Fusarium</i>)	Dosis preventiva: 0.3-0.5 L/ha (0.21-0.35 L/mz)
Café (<i>Coffea arabica</i>)	Roya (<i>Hemileia vastatrix</i>) Ojo de gallo (<i>Mycenaetia</i>) Mancha de hierro (<i>Cercospora coffeicola</i>) Antracnosis (<i>Colletotrichum</i>)	Dosis curativa: 0.75-1.0 L/ha (0.52- 0.7 L/mz)
Chirimoya (<i>Annona Cherimola</i>)	Antracnosis (<i>Gloeosporium</i>)	
Mango (<i>Mangifera indica</i>)	Mancha foliar (<i>Alternaria</i> sp.)	1.2 L/1200L agua/ha
Aguate (<i>Persea americana</i>)	Gomosis (<i>Phytophthora</i> sp.) Mancha (<i>Mycosphaerella</i>) Sarna (<i>Elsinoe</i> sp.) Bacteriosis (<i>Erwinia</i>)	0.84 L/1200L agua/mz
Ornamentales	Moho gris (<i>Botrytis</i> spp.) Tizón bacterial (<i>Xanthomonas</i> spp.) Mancha bacterial (<i>Pseudomonas</i> sp.) Podredumbre suave (<i>Erwinia</i> sp.) Cáncer bacteriano (<i>Corynebacterium</i> spp.) Pudrición de raíz y tallo (<i>Cilindrocylindrium</i> spp.) Mal del talluelo (<i>Rhizoctonia</i> spp.)	Dosis preventiva: 0.75-1.5 L/ha (0.52-1.0 L/mz)
		Dosis curativa: 1.5-2.0 L/ha (0.7-1.4 L/mz)

No aplicar en horas de calor intenso o cuando exista probabilidad alta de lluvia intensa, ni cuando la velocidad del viento sea 15 km/hora o mayor.

INTERVALO DE APLICACIÓN: Se debe usar en un programa fitosanitario de 3-4 aplicaciones consecutivas a intervalos de 8-15 días.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: No existe restricción entre la última aplicación y la cosecha.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: No existe restricción entre la aplicación y la entrada de personas y animales domésticos al área tratada.

FITOTOXICIDAD: A las dosis y épocas de aplicación recomendadas no es fitotóxico en los cultivos recomendados, tenga cuidado por deriva a cultivos vecinos, sin embargo, el cobre causa senescencia prematura en solanáceas y frijol si se usa de forma constante. En plantas jóvenes con crecimiento activo puede madurar precozmente deteniendo el crecimiento.

COMPATIBILIDAD: Cupritozell 24 SC es incompatible con fenvalerato, paration, clorpirifos y dicloran. No mezclar con plaguicidas, surfactantes y/o fertilizantes sin pruebas previas que demuestren compatibilidad.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Durante su manejo mezcla aplicación y lavado del equipo, utilice equipo de protección completo: sombrero, gafas protectoras, mascarilla, overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación y protección después de cada jornada. No lave ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto directo con el producto y respirar la llovizna de aspersión.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transportar ni almacenar este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los plaguicidas en contacto con otros agroquímicos fertilizantes, semillas. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado del calor. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA**



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Corrosivo para los ojos. Provoca una irritación severa de la piel, las personas con problemas de sensibilidad alérgica deben extremar precauciones. Por ingestión produce náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, dolor abdominal y sabor metálico en la boca. Pueden producir daños en la mucosa, en este caso se contraindica el lavado estomacal.

PRIMEROS AUXILIOS

POR INGESTIÓN: Si el paciente está consciente y no presenta convulsiones, provocar el vómito dando a beber dos vasos de agua seguidos estimule la parte posterior de la garganta con la punta del dedo índice o un objeto no punzante. Repita el estímulo hasta que el vómito fluya claro. Llame a un médico o lleve al paciente a un hospital.

POR INHALACIÓN: Retirar al paciente del área contaminada, manténgalo en reposo y vigile su respiración. Si es necesario administre respiración artificial.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Irrigar con abundante agua o solución salina isotónica a baja presión durante 15 minutos o más.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quitar la ropa contaminada, lavar el cabello y la piel con abundante agua y jabón por lo menos durante 10 minutos.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de fortalecimiento general, vigile los signos vitales y la respiración. Tratamiento solo por personal médico especializado.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
Guatemala	Centro de Asistencia Toxicológica	502 2513560/ 502 232-0735
Belice	Centro de Intoxicaciones	501 2321548 501 230778
El Salvador	Hospital San Rafael Santa Tecla	2525-5800 Ext (148-149)
Honduras	Hospital Escuela	504 2392662 /2311006
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	505 2897150/ 505 289 3328
Costa Rica	Centro Nacional de Intoxicaciones	506 2231028
Panamá	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	507 523 4948/4968
Rep. Dominicana	Hospital Dr. Luis Aybar Hospital Dr. Fco. E Moscoso Puello	684-3478/684-3672 681-2913/681-6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

Este producto es tóxico para peces y crustáceos, por lo tanto no debe contaminar ríos, lagos, estanques u otras fuentes de aguas superficiales o subterráneas con este producto o con envases o empaques vacíos.



LIGERAMENTE TOXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS

NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Recoja los derrames con un material adsorbente (arena, tierra o aserrín) deposítelos en un recipiente y entiérrelos en un lugar seguro, a una profundidad no menor de 40 cm del borde superior del recipiente a la superficie, alejado de fuentes de aguas subterráneas como superficiales. Perfore y entierre los envases vacíos, remanentes y desechos de igual forma a los derrames.

**"TRIPLE LAVADO"
LOS ENVASES VACÍOS DEBEN LAVARSE
TRES VECES; EL AGUA DEL
LAVADO DEBERÁ AGREGARSE A LA MEZCLA.**



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA:

ZELL CHEMIE INTL. SL, garantiza el contenido de este producto según su etiqueta, siempre que se encuentre en envase original con el sello de garantía íntegro. ZELL CHEMIE INTL no asume responsabilidades por uso de este producto diferente a lo recomendado en el panfleto adjunto.

FORMULADOR:

ZELL CHEMIE INTERNACIONAL, S.L.

Blasco Ibañez, 14.- Pta. 3 / 4. 46132 Almassera -Valencia (SPAIN)
) Phone: ++34 96 186 21 20 Fax: ++34 96 185 57 43
E-mail: zell@zellchemie.com Web: www.zellchemie.com

PAÍS	NUMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
EL SALVADOR	AG.2013-12-980	11/12/2013
NICARAGUA	ZELL-094F-2-2007	09/04/2007
COSTA RICA	870282	22/06/2009
PANAMA	1809	08/02/2006
REP. DOMINICANA	2553-27-B	13/05/2005