


¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

CURACRON® 50 EC

INSECTICIDA – ORGANOFOSFORADO
PROFENOFOS



DAÑINO

ANTÍDOTO: ATROPINA

SOLVENTE: MEZCLA DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS
DENSIDAD: 1,130 – 1,160 g/cm³ a 20°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O
SE INHALA. PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL
POR EXPOSICIÓN

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”
“MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS
MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS,
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

Curacron® 50 EC es un insecticida y acaricida de amplio espectro y rápida acción inicial. Es absorbido principalmente por vía foliar y posee una importante acción en profundidad (acción translaminar), pero sin ser sistémico. Debido a su rápida penetración en la planta (o adherencia en la planta) las fuertes lluvias, poco después de la aplicación, no afectan la acción del producto. Esto es particularmente ventajoso en regiones con abundantes precipitaciones. Curacron® 50 EC tiene amplio espectro de acción contra un gran número de insectos masticadores, minadores y chupadores. Tiene en especial un efecto sobresaliente sobre los principales insectos del orden lepidóptero, con énfasis en gusano cogollero, soldado, prodenia y bellotero. Siendo Curacron® 50 EC un éster del ácido fosfórico, inhibe la actividad de la colinesterasa.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Curacron® 50 EC puede aplicarse usando tractor o avión. Calibre el equipo adecuadamente previo a la aplicación y lávelo inmediatamente después de usarlo. Para Costa Rica, en el caso de aplicaciones aéreas se deben seguir las siguientes medidas (según decreto 31520): Se prohíbe desecar en vuelo los remanentes de agroquímicos no utilizados. Descargar cualquier residuo líquido de la aeronave en un sistema de tratamiento debidamente aprobado por el Ministerio de Salud. Se prohíbe el lavado de cualquier equipo de aplicación en ríos, lagos y corrientes de agua. Se deberá dejar una franja de no aplicación aérea no menor de 100 metros entre el campo a tratar y cualquier carretera, centros de población, casas de habitación, edificios donde permanezca personal laborando, fuentes de agua y cultivos aledaños o fincas vecinas susceptibles a efectos negativos derivados del plaguicida aplicado. Para espolvorear y asperjar agroquímicos, los límites máximos de viento serán 10 Km/h para espolvoreo y 15 Km/h para aspersiones. Calibre siempre su equipo sólo con agua, antes de aplicar el producto. Asegúrese que el equipo de aplicación esté en buenas condiciones. Recuerde obtener el equipo auxiliar adecuado (medidores de productos líquidos y sólidos, cubetas graduadas, paletas de agitación, cepillos, brochas, etc.) Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto, durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación: botas, mascarilla, anteojos y guantes.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Después de agregar la cantidad recomendada del producto en agua limpia, agite bien la mezcla y aplíquela. En el caso de aplicaciones aéreas: Se debe dejar una franja de no aplicación aérea no menor a 100 metros de fuentes de agua. La altura del vuelo debe ser igual o menor a 5 metros sobre el dosel de la plantación. Se debe trabajar un tamaño de gota promedio entre 200 y 300 micras. La temperatura deberá ser mayor a 29°C y la humedad relativa mayor a 70%.

Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto, durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación: botas, mascarilla, anteojos, guantes, dosificador y equipo de aplicación en buen estado.



RECOMENDACIONES DE USO:

USO AUTORIZADO EN COSTA RICA:	
Arroz	<u>Oryza sativa</u>
Cebolla	<u>Allium cepa</u>
PLAGA A CONTROLAR:	
Acaro blanco	<u>Steneotarsonemus spinky</u>
Trips	<u>Thrips tabaci</u>

DOSIS RECOMENDADA:

Arroz: 1.5 L/ha para 3 – 25 ácaros / planta. 2 L/ha para más de 25 ácaros / planta. En aplicaciones aéreas se recomienda un volumen de 55 a 75 litros de agua por hectárea.

Cebolla: 1 L/ha. Iniciar las aplicaciones cuando se presenten 2-4 trips por hoja. Utilizar un volumen de 600 a 800 L/ha.

USOS AUTORIZADOS EN PANAMÁ:	
Arroz	<u>Oryza sativa</u>
Maíz	<u>Zea mays</u>

USO AUTORIZADO EN REPUBLICA DOMINICANA:	
Arroz	<u>Oryza sativa</u>

NOMBRE DE LOS PLAGAS A CONTROLAR:	
Sogata	<u>Sogata oryzicola</u>
Chinche blissus	<u>Blissus leucopeterus</u>
Gusano cogollero	<u>Spodoptera frugiperda</u>
Mocis	<u>Mocis sp</u>
Novia del arroz	<u>Rupella albinella</u>
Barrenador listado	<u>Chilo suppressalis</u>
Gusano elotero	<u>Heliothis zea</u>
Acaro blanco	<u>Steneotarsonemus spinky</u>

DOSIS RECOMENDADAS:

Arroz: 0,8 – 1,0 L/ha (0,5 – 7 L/mz). Acaro blanco: 1.5 L/ha para 3 – 25 ácaros/planta. 2 L/ha para más de 25 ácaros/planta.

Maíz: 0,7 L/ha (0,5 L/mz)

EPOCA DE APLICACIÓN:

Al inicio de la infestación.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Cada 15 días para arroz.

8 días después de la primera aplicación para maíz.

Cebolla cada 7 días.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Arroz, maíz, cebolla: 14 días antes de la cosecha.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

24 horas.

FITOTOXICIDAD:

Cuando se aplica Curacron® 50 EC a la dosis recomendada y en el cultivo indicado, no es fitotóxico.

COMPATIBILIDAD:

Curacron® 50 EC es compatible con la mayoría de insecticidas, acaricidas y fungicidas de reacción neutra o débilmente ácida.

No mezclar con otros productos de reacción básica, tales como oxiclورو de cobre y caldo bordeles. Cuando se mezcle con otros productos, se debe efectuar previamente un ensayo de compatibilidad.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

CURACRON® 50 EC es inflamable, no es explosivo, no es corrosivo. Almacénelo en bodegas seguras, alejadas del calor, el fuego directo y la humedad. No transportar junto con productos de consumo animal y humano. Almacénelo y téngalo en su envase original, bien cerrado y debidamente etiquetado, con su correspondiente panfleto.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO
Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Por ser un insecticida organofosforado, inhibe la colinesterasa, causando: contracción de pupilas, mareo, náusea, vómitos, sudor excesivo, calambres abdominales, diarrea, dolor de cabeza, visión borrosa, salivación, lagrimeo y espasmos musculares incontrolables.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: No induzca el vómito. Contacte a un médico inmediatamente.

POR INHALACIÓN: Retire a la persona del área contaminada, llévela a un lugar fresco y ventilado y protéjala de la hipotermia.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con abundante agua limpia durante 15 minutos como mínimo y llame inmediatamente a un médico.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lave con abundante agua y jabón las partes del cuerpo afectadas.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

El antídoto es Atropina. Bajo supervisión médica, se puede aplicar un preparado de oxima como Toxogonin. Inyecte de 2 a 4 mg de sulfato de atropina (para niños de 0,5 a 2 mg según la edad) en forma intravenosa o intramuscular cada 5 a 10 minutos, hasta la atropinización completa. Continúe el tratamiento por 24-48 horas.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	TELÉFONO
COSTA RICA	Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones	2223-1028
PANAMÁ	Centro de Información e Investigación de Medicamentos y Tóxicos	523-4948, 523-4968
REPÚBLICA DOMINICANA	Hospital Dr. Luis Aybar	684-3478 y 684-3672
	Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello	681-2913 y 681-6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA EL GANADO.

No aplique cerca de animales domésticos.
El área recién tratada no deberá usarse para pasto o alimento y no se debe dar como forraje; alejar al ganado.



TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

TOXICO PARA ABEJAS.

No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre del producto hacia otras áreas.


MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En el caso de derrames o desechos del producto, recogerlos con aserrín o con material absorbente, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos. A fin de evitar remanentes, se sugiere preparar la mezcla a utilizar en el día.

Sí el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto.

No contamine con este producto o sus envases, desechos o derrames: ríos, lagos, charcas, zanjas, canales de drenaje, alcantarillas, etc. Se prohíbe la aspersión y espolvoreo de agroquímicos en los diferentes cuerpos de agua (ríos, lagos, embalses, manantiales, esteros, pantanos, manglares, quebradas, océanos, mares y estuarios). Evite los derrames del producto por la contaminación que puede provocar a las fuentes de agua.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

El formulador garantiza el contenido de este envase, siendo apto el producto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso. El buen uso será responsabilidad exclusiva del comprador.

FORMULADOR:

Syngenta, S.A.
Carretera a Mamonal, Km 6, Cartagena, Colombia
Tel.: 95-668-5475. Fax: 95-668-5458

IMPORTADO POR:

Costa Rica:

Syngenta Crop Protection, S.A. – Sucursal Costa Rica
700 m este de la Intersección del Aeropuerto Juan Santamaría
Calle paralela, contiguo Zona Franca Saret
Plaza Aeropuerto, Oficina D1, Alajuela, Costa Rica.
Tel.: 2431-4707. Fax: 2431-4710

Panamá:

Syngenta, S.A.
R.U.C. 5306-2-329422 D.V.80, Clave 3987
Business Park, Costa del Este
Ave. La Rotonda, Edificio Torre V, Piso 12 Ciudad de Panamá
República de Panamá
Tel.: 270-8200 / Fax: 270-8288

República Dominicana:

Syngenta Crop Protection, S.A. – Sucursal República Dominicana
Porfirio Herrera No. 29, Torre Empresarial INICA, Local 4W
Ensanche Evaristo Morales, Santo Domingo
Tel.: 1-809 227-0414. Fax 1-809 540-9340

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
COSTA RICA	870268	04-06-09
PANAMÁ	5040	04-09-07
REPÚBLICA DOMINICANA	1275	24-05-08