

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.



We create chemistry

Cycosin® 50 SC

FUNGICIDA - TIOFANATO
THIOPHANATE-METHYL

PRECAUCIÓN
ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1.22 g/ml a 30°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE
Y/O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR
EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN MANTÉNGASE ALEJADO DE
LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES
DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS



USO AGRONÓMICO:

MODO DE ACCIÓN: CYCOSIN 50 SC es un fungicida sistémico de elevada acción preventiva y curativa que se absorbe por hojas y raíces. Es distribuido por toda la planta vía floema. Inhibe la respiración celular e impide la culminación de la mitosis en las células del hongo.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Puede ser aplicado con equipo manual, terrestre o aéreo. Calibre el equipo antes de aplicar el producto. En aplicaciones aéreas el volumen de caldo no debe ser menos de 50 l/ha, en aplicaciones terrestres use un mínimo de 200 l/ha. Lave el equipo después de cada jornada de trabajo. Con equipo convencional utilice boquilla de cono hueco.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Agregue la mitad de agua al tanque, vierta la cantidad recomendada de CYCOSIN 50 SC, agite y termine de llenar el tanque. Verifique la calidad del agua para evitar el uso de aguas duras y así lograr mayor eficacia del producto.



RECOMENDACIONES DE USO:
GUATEMALA, BELICE, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA, COSTA RICA Y PANAMÁ.

CULTIVO	PLAGAS A CONTROLAR	DOSIS RECOMENDADA (l/ha)	Epoca de aplicación
Arroz <u>Oryza sativa</u>	Quemazón o añublo <u>Pyricularia sp</u>	1,0-1,3	1º aplicación al panzoneo. 2º inicio de espigamiento. 3º al terminar de espiga.
	Pudrición de la vaina <u>Rhizoctonia solani</u>	1,0-1,5	Use la dosis baja como preventivo al observar los primeros síntomas, y la dosis alta si la enfermedad está claramente visible.

CULTIVO	PLAGAS A CONTROLAR	DOSIS RECOMENDADA (l/ha)	Epoca de aplicación
Banano <u>Musa spp</u>	Sigatoka amarilla <u>Mycosphaerella musicola</u> Sigatoka negra <u>Mycosphaerella fijiensis</u>	0,42-0,56	Agréguese de 7-10 litros de aceite agrícola por hectárea más un 1% de surfactante por volumen de aceite.
Melón <u>Cucumis melo</u> Sandía <u>Citrullus lunatus</u> Pepino <u>Cucumis sativus</u>	Antracnosis <u>Colletotrichum spp.</u>	0,7-1,0	Asperjar haciendo un cubrimiento uniforme del follaje.
Tomate <u>Lycopersicon esculentum</u>	Antracnosis <u>Colletotrichum sp.</u>	1,0-1,4	Asperjar haciendo un cubrimiento uniforme del follaje, flores y partes frutales.
Frijol <u>Phaseolus vulgaris</u>	Antracnosis <u>Colletotrichum sp.</u>	1,0-1,4	Asperjar haciendo un cubrimiento uniforme del follaje.
Mani <u>Arachis hypogaea</u>	Mancha o viruela <u>Cercospora sp.</u>	0,7-1,0	Asperjar haciendo un cubrimiento uniforme del follaje.
Cítricos <u>Citrus spl</u>	Sama <u>Elsinoe fawcettii</u>	1,0-1,4	Asperjar haciendo un cubrimiento uniforme del follaje nuevo y los frutos recién formados. Repetir 15 días después.
Tabaco <u>Nicotiana tabacum</u>	Ojo de sapo <u>Cercospora sp.</u>	0,7-1,0	Asperjar bien todo el follaje sobre todo después de la capa. Mezclar o alternar con un carbamato.
Fresa <u>Fragaria spp.</u>	Mancha cercospora <u>Cercospora sp.</u>	0,7-1,0	Asperjar el follaje.
Ornamentales de flores y follaje	<u>Fusarium sola</u> <u>Rhizoctonia solani</u> <u>Verticillium albo-atrum</u> <u>Sphaerotheca panosa</u> <u>Phomopsis gardenia</u> <u>Botrytis sp.</u> <u>Colletotrichum sp.</u>	0,70-1,5	Asperjar haciendo un cubrimiento uniforme del follaje.
Café <u>Coffea arabica</u>	Mal de hilachas <u>Pellicularia sp.</u> Chasparria <u>Cercospora coffeicola</u> Chasparria negra <u>Colletotrichum sp.</u>	0,7-1,0	Asperjar haciendo un cubrimiento uniforme del follaje y frutos recién formados.

INTERVALO DE APLICACIÓN: Aplique cada 15 a 20 días, según sean las condiciones climáticas y la incidencia de la enfermedad.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

CULTIVO	DÍAS
Café	50
Arroz, Cítricos, Tabaco, Fresa	15
Melón, Sandía, Pepino, Frijol, Maní	10
Tomate	8
Banano	0

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Una vez que la aspersión se haya secado sobre el follaje.

FITOTOXICIDAD: No se ha reportado fitotoxicidad alguna en los en que se ha aplicado el producto de acuerdo a la dosis que aquí se recomienda.

COMPATIBILIDAD: CYCOSIN 50 SC es compatible con la mayoría de los plaguicidas comunes en el mercado con excepción de aquellos muy alcalinos. No es compatible con el caldo bordelés y productos fuertemente alcalinos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No almacene ni transporte el producto junto con alimentos, ropa, medicinas ni animales. Manténgase en su envase original, lejos de la luz directa del sol. Almacene bajo llave, en un lugar seco y fresco, alejado del calor o del fuego. No es corrosivo, explosivo ni inflamable.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS
DE HABITACIÓN
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO
Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO**



**BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE
ROPA LIMPIA**

SINTOMAS DE INTOXICACION: No se conocen síntomas específicos, pero el contacto prolongado con el producto causa irritación de la piel, ojos y mucosas de la nariz y garganta.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: No inducir el vomito. Dé a beber 1 ó 2 vasos de agua y busque atención médica.

CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón. Remueva la ropa contaminada y lávela después de usarla.

INHALACIÓN: Retire a la persona del área contaminada y mántengala en reposo, si es necesario suministre respiración artificial.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave los ojos inmediatamente con agua fresca por lo menos durante 15 minutos. En caso necesario obtenga atención médica.

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA AL VÓMITO A
PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico. Dar Tratamiento sintomático de acuerdo con el cuadro clínico.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN

GUATEMALA	
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	2251-3560 2232-0735
BELICE	
KARL HEUSNER, MEMORIAL HOSPITAL	230-778
EL SALVADOR	
HOSPITAL SAN RAFAEL, SANTA TECLA	2525-5800 Ext. 148 y 149
HONDURAS	
HOSPITAL ESCUELA	232-2322 232-2415
NICARAGUA	
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	2289-7150 2289-3328
COSTA RICA	
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES	2223-1028
PANAMA	
CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS Y TÓXICOS	523-4948
REPÚBLICA DOMINICANA	
HOSPITAL DR. LUIS AYBAR	681-2181
HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO P.	681-7828

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES.



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O
CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. Los remanentes de plaguicidas sin utilizar deben mantenerse en su envase original debidamente cerrado y etiquetado.

**EL USO DE LOS ENVASES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON
DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

AVISO DE GARANTIA: Las instrucciones para el uso de este producto reflejan los resultados de la experiencia de la compañía basada en ensayos de campo y uso práctico. Dichas instrucciones se creen dignas de confianza y deben observarse cuidadosamente. Es imposible, sin embargo, eliminar los riesgos inherentes al uso de este producto. Cualquier daño a la cosecha, falta de eficacia y otras consecuencias involuntarias, pueden ser el resultado de factores que están fuera del control de BASF, como condiciones climáticas, presencia de otros materiales, el método de uso o aplicación, etc. El usuario debe asumir dichos riesgos. BASF y el registrante sólo garantizan que el producto se ajusta a la descripción química de la etiqueta y que es razonablemente apto para los usos descritos en el panfleto, cuando se usa de acuerdo con las instrucciones y sujeto a los riesgos mencionados anteriormente. BASF NO DA NI AUTORIZA A NINGÚN AGENTE O REPRESENTANTE PARA DAR NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA Y NO PRESTA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN DETERMINADO. *Los períodos de carencia indicados en el panfleto son para las condiciones locales, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino.*

FORMULADOR:

Formulaciones Químicas S.A. (FORMUQUISA)
Chomes, Puntarenas, Costa Rica
Tel: 2231-1625 Fax: 2253-4026

IMPORTADO POR:

COSTA RICA:	BASF Costa Rica S.A. Los Balcones, Plaza Roble, Escazú. San José, Costa Rica Tel.: 2201-1900, Fax: 2201-8221
EL SALVADOR:	Agroquímica Internacional (AGRINTER). Km 31 Carretera a San Juan Opico Sitio El Niño, La Libertad, El Salvador. Distribuidores e Importadores Agrícolas (DIAGRI S.A DE CV). 6a Calle Ote. N° 24, Rosario la Paz Depto. La Paz, El Salvador C.A. Técnica Universal Salvadoreña, S.A. de CV. Km 9 ½ Carretera al Puerto de la Libertad, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador.
GUATEMALA:	BASF Guatemala S.A. Avenida Petapa 47-31, Zona 12, Ciudad Guatemala Tel.: 2445-7600, Fax: 2445-7699
DISTRIBUIDO POR:	
EL SALVADOR:	Agroquímica Internacional (AGRINTER). Km 31 Carretera a San Juan Opico Sitio El Niño, La Libertad, El Salvador. Distribuidores e Importadores Agrícolas (DIAGRI S.A DE CV). 6a Calle Ote. N° 24, Rosario la Paz Depto. La Paz, El Salvador C.A. Técnica Universal Salvadoreña, S.A. de CV. Km 9 ½ Carretera al Puerto de la Libertad, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador.

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	78-39	18-01-13
BELICE	0265-1	20-11-11
EL SALVADOR	AG-96-01-300	03-04-14
HONDURAS	26-13-II	12-10-12
NICARAGUA	BA-095-D7-96	29-10-01
COSTA RICA	1754	12-11-93
PANAMA	1001	22-09-09