

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.



Sembrando un futuro más rentable

DAC 2,4-D

HERBICIDA – ÁCIDO FENOXICARBOXÍLICO

2,4-D



DAÑINO
ANTÍDOTO: NO TIENE.

DENSIDAD: 1,20 g/ml A 20 °C.

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO.

MODO DE ACCIÓN:

Este producto se absorbe principalmente por las hojas y es sistémico. Es absorbido por las raíces, follaje y translocado rápidamente en la planta, vía xilema y floema.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Este producto puede aplicarse con equipo de espalda, con equipo terrestre acoplado a un tractor con un volumen de 200 litros por hectárea. Utilice boquillas de abanico 8002. Las aplicaciones deben hacerse cuando casi no se tengan vientos y las temperaturas no sean mayores de 32 °C. Observe que el equipo de aplicación esté en condiciones adecuadas de uso. Calibre el equipo de aplicación. El equipo y los utensilios empleados en la mezcla deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Para preparar el caldo de aplicación, llene el tanque de la aspersora hasta la mitad con agua limpia poniendo el sistema de agitación o recirculación a trabajar, vierta luego la cantidad requerida de DAC 2,4-D y termine de llenar el tanque con agua limpia.



RECOMENDACIONES DE USO: COSTA RICA.

Controla gran cantidad de malas hierbas como:			
Bledo	<i>Amaranthus spp</i>	Churrístate	<i>Ipomoea spp</i>
Moriseco	<i>Bidens pilosa</i>	Malva	<i>Malachra alceifolia</i>
Canutillo	<i>Commelina diffusa</i>	Fior Amarilla	<i>Melanpodium spp</i>
Meloncillo	<i>Cucumis melo</i>	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>
Lechosa	<i>Euphorbia spp</i>	Cerrajilla	<i>Sonchus oleraceus</i>
Mielcilla	<i>Galinsoga ciliata</i>		

Se recomienda su uso en los siguientes cultivos:	Dosis l/ha
Arroz	2,0 Postemergente
Caña de Azúcar	3,6 Postemergente
Maíz	2,7 Postemergente
Sorgo	2,0 Postemergente
Cercos y pastos	1,3 – 2,5

ÉPOCA E INTERVALO DE APLICACIÓN:

Las aplicaciones deben efectuarse temprano en la mañana para evitar la deriva y el daño a cultivos cercanos susceptibles. En arroz aplicar en postemergencia de 1-8 semanas de la emergencia del arroz de secano y 8 semanas en arroz inundado. En maíz aplicar en preemergencia 3 días después de la siembra. En postemergencia en aplicación dirigida cuando las plantas tengan 15 cm de altura. En la caña en preemergencia aplique después de la siempre antes de que la caña germine. En postemergencia deben ser aplicaciones dirigidas. En potreros las plantas de raíces profundas requieren de varias aplicaciones cuando reaparezcan los rebrotos.

Para los cultivos arroz y caña de azúcar se puede aplicar por vía aérea, para lo cual se aplica a la dosis de 2,0 l/ha para arroz y de 3,6 l/ha para caña de azúcar, con un volumen de aplicación de 75-80 l/ha. **Es necesario cumplir con las recomendaciones establecidas en el D.E. 31520-MS-MAG-MI-NAE-MOPT-MGPSP. Reglamento para las actividades de la aviación agrícola.**

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Está implícito en la época de aplicación, que es en las primeras semanas de edad del cultivo.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Esperar a que se seque el rocío de la aplicación. Si es necesario entrar antes, debe utilizarse el equipo de protección completo.

FITOTOXICIDAD:

Este producto es fitotóxico a los vegetales de hoja ancha como tomate, papa, algodón, uvas, árboles frutales y flores. No se debe aplicar cerca de plantaciones de tomate, papa, frijol, algodón, cucurbitáceas, etc.

COMPATIBILIDAD:

Este producto es compatible con los plaguicidas usados en la agricultura como: propanil, dicamba, picloran, MCPA y paraquat, pero lo más recomendable es realizar una prueba de compatibilidad antes de utilizarlos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

ESTE PRODUCTO NO ES CORROSIVO NI INFLAMABLE. No transporte este producto con alimentos, forrajes, semillas, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los herbicidas en contacto con otros agroquímicos. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado alejado del calor, alejado de los niños, personas mentalmente incapaces y animales domésticos. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Puede causar quemaduras en la boca y esófago, náuseas, vómito, diarrea, calambres, debilidad muscular, arritmias, convulsiones, coma, hipotermia, hipotensión, daños hepáticos y renal. Puede ocurrir irritación de la piel, ojos, nariz y garganta, así como vértigos, dolor de cabeza, malestar y parestesias.

PRIMEROS AUXILIOS:

Ingestión: Dé a beber suficiente agua y luego toque la base posterior de la lengua con los dedos o algún objeto no punzocortante. Obtenga atención médica de inmediato.

Inhalación: Retire la persona afectada del área contaminada a un área de mayor ventilación y manténgala en reposo. En caso necesario administre respiración artificial.

Contacto con los ojos: Lave la parte afectada por espacio de 15 minutos con agua limpia. Obtenga atención médica.

Contacto con la piel: Quítese las prendas de vestir y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón. Nunca dé a beber ni induzca el vómito a personas en estado de inconsciencia.

TRATAMIENTO MÉDICO:

El tratamiento médico es sintomático. En caso de intoxicación no olvide notificar al Ministerio de Salud.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

Institución	País	Teléfono
Centro Nacional de Intoxicaciones	Costa Rica	2223-1028

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA GANADO.

No permita el ingreso del ganado al área tratada durante los 45 días posteriores a la aplicación.



TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON EL PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

TÓXICO PARA ABEJAS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perforélos. Si el país cuenta con un programa de recolección y disposición de envases, entregue este al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto. En caso de derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y recólectelos en un recipiente hermético y entréguelo al distribuidor o elimínelo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

Debido a que está fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento, manipuleo y uso de este producto, nos es imposible asumir responsabilidades por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Nuestra responsabilidad alcanza a la composición química del producto así como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el envase se encuentre sellado. Garantizamos así mismo la eficacia del producto, siempre y cuando su uso se ajuste a las especificaciones indicadas en el panfleto.

FORMULADO POR:

SHANDONG QIAOCHANG CHEMICAL CO., LTD.

South of Zinyongshen Road, Binbei, Bincheng District, Binzhou City, Shandong, China.

Tel: +86 0543-22261707

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

DAC - DISTRIBUIDORA AGROCOMERCIAL S.A.

Tel: 2494-9800 • Fax: 2249-3733 • Coyoil, Alajuela, Costa Rica.

info@agrodac.com • www.agrodac.com

País
Costa Rica

Número de registro
2671

Fecha de registro
05/01/93