

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

DAC

DAC AMETRINA 50 SC

HERBICIDA-TRIAZINA AMETRYN

CUIDADO
ANTÍDOTO: NO TIENE.

Densidad: 1,12 g/ml a 20 °C.

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO.

MODO DE ACCIÓN:

Herbicida pre y post-emergente con actividad residual. Contiene 50% de Ametrina. Sistémico por vía radicular y foliar.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Este producto puede aplicarse con equipo de espalda o equipo terrestre acoplado a un tractor con un volumen de aplicación de 400 litros de agua por hectárea. Observe que el equipo de aplicación esté en condiciones adecuadas de uso. Calibre el equipo de aplicación. Para aplicarlo utilice boquillas de cono hueco. Este producto no ejerce ningún tipo de acción sobre el equipo de aplicación.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene el tanque hasta la mitad con agua limpia, ponga el sistema de agitación a funcionar y vierta la dosis del producto y luego termine de llenar el tanque con agua limpia. El equipo y los utensilios empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo. Deseche las aguas de lavado en un hueco, lejos de fuentes de agua y viviendas. Debe de usar guantes y botas de hule durante el lavado del equipo de aplicación.



RECOMENDACIONES DE USO: COSTA RICA.

Ametrina es un herbicida selectivo para el control de malezas de hoja ancha y gramíneas en la piña (*Ananas comosus*), caña de azúcar (*Saccharum officinarum*) y banano (*Musa sp*), puede emplearse en aplicaciones post-emergentes dirigidas en maíz (*Zea mays*) y cítricos (*Citrus sp*). Las siguientes malezas son controladas normalmente por aplicaciones post-emergentes temprana: Bledo (*Amaranthus spinosus*), Moriseco (*Bidens pilosa*), Apazote (*Chenopodium album*), Canutillo (*Commelina benghalensis*), Mielicilla (*Galinsoga parviflora*), Churristate (*Ipomoea purpurea*), Verdolaga (*Portulaca oleracea*), Hierba Mora (*Solanum nigrum*), Digitaria (*Digitaria sanguinalis*), Arrocillo (*Echinochloa crus-galli*), Zacate Guinea (*Panicum schinzii*), Pata de Gallina (*Eleusine indica*), Pega-Pega (*Setaria verticillata*).

OFRECE PROTECCIÓN A LOS SIGUIENTES CULTIVOS: La Ametrina es usada como un herbicida selectivo pre y post-emergente en banano, caña de azúcar y piña.

DOSIS RECOMENDADA: De 3,2 a 4,8 litros/ha.

ÉPOCA DE APLICACIÓN: Banano (*Musa sp*) en preemergencia de las malezas en aplicación dirigida. Caña de azúcar (*Saccharum officinarum*) Las aplicaciones se efectúan después de plantar la caña de azúcar o de la operación de corta (caña soca). Generalmente se realiza un tratamiento de base. Se puede efectuar el tratamiento herbicida antes de la emergencia de las malezas. La mejor época para la aplicación es sobre las malezas recién emergidas, pero no más tarde del estado de tres hojas de las gramíneas. Piña (*Ananas comosus*): Aplicado en preemergencia.

INTERVALO DE APLICACIÓN: 1 aplicación por temporada.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 60 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Esperar a que se seque el rocío de la aplicación. Si es necesario ingresar antes, debe utilizarse el equipo de protección completo.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis y en los cultivos indicados en el panfleto.

COMPATIBILIDAD: Puede usarse en combinación con 2,4D o MCPA, MSMA.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacene este producto bajo llave, en un lugar fresco y seco, en su envase original, bien etiquetado, alejado de alimentos, fertilizantes u semillas. El transporte debe hacerse aparte de alimentos y medicinas, compruebe que los envases estén bien cerrados u en buen estado para evitar derrames. Este producto no es corrosivo ni inflamable.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Efectos irritantes en la piel y en las membranas mucosas. Grandes ingestiones pueden causar vómitos, náuseas, dolor abdominal y diarrea.

PRIMEROS AUXILIOS:

Ingestión: Si la Ametrina es ingerida accidentalmente no hay antídoto específico, haga un lavado del estómago con agua, administre carbón activado en agua y un purgante salino. No administre aceites, grasas, laxantes o productos lácteos. Si está consciente y alerta induzca vómito.

Inhalación: Evítese respirar la neblina de la atomización. De ser necesario traslade al paciente a un lugar de aire puro y manténgase en reposo.

Contacto con los ojos: Lave con agua por 10 a 15 minutos Si la irritación persiste consulte a un médico.

Contacto con la piel: Lave con agua y jabón. Si la irritación persiste consulte a un médico.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

Seguir tratamiento sintomático, En caso de intoxicación lleve al paciente al médico y facilite el panfleto y/o la etiqueta. Llamar al Centro Nacional de Intoxicaciones al teléfono 2223-1028.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN

País	Institución	Teléfonos
Costa Rica	Centro Nacional de Intoxicaciones	2223-1028

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

Tóxico para peces.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON EL PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase. La destrucción de envases debe hacerse a través del triple lavado (agregue el resultado del enjuague a la mezcla), perforación de envases y entrega a los centros de acopio para su distribución técnicamente aceptada, para evitar la contaminación ambiental. En caso de derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y recólteles en un recipiente hermético y entréguelo al distribuidor o elimínelo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

Debido a que esta fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento, manipuleo y uso de este producto nos es imposible asumir responsabilidades por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Nuestra responsabilidad alcanza a la composición química del producto tal y como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el envase se encuentre sellado. Garantizamos así mismo la eficacia del producto, siempre y cuando su uso se ajuste a las especificaciones indicadas en este panfleto.

FORMULADO POR:

ZHEJIANG CHANGXING ZHONGSHAN CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO., LTD.

Zhongschan, Xiapou, Changxing, Zhejiang Province, 313116, China
Tel: 86 572 6121387

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

DAC - DISTRIBUIDORA AGROCOMERCIAL S.A.

Tel: 2494-9800 • Fax: 2249-3733 • Coyol, Alajuela, Costa Rica.
info@agrodac.com • www.agrodac.com

PAÍS
Costa rica

NÚMERO DE REGISTRO
3277

FECHA DE REGISTRO
08/10/92