

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.



DAC GLIFOSATO 35,6 SL

HERBICIDA – GLICINA GLYPHOSATE

PRECAUCIÓN
ANTÍDOTO: NO TIENE.

Densidad: 1,16 g/ml a 20 °C.

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS
A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE
INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO.

MODO DE ACCIÓN:

DAC Glifosato 35,6 SL es un herbicida post-emergente, no selectivo. Penetra solo a través del follaje y otros tejidos verdes de la planta. Se transloca basipetalmente a través del floema hasta otros puntos de crecimiento o tejidos meristemáticos de la planta. También se puede mover en la planta por el xilema en forma muy limitada. El mecanismo de acción consiste en la inhibición de los aminoácidos.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Observe que el equipo de aplicación esté en condiciones adecuadas de uso. Se pueden utilizar bombas de mochila o aspersores motorizadas. Se recomienda utilizar boquillas de abanico plano TJ-800050 hasta TJ-8004, para control de malezas en general en área total. Para aplicar en bandas se recomienda boquilla de inundación tipo Floodjet. Para aplicaciones de parchoneo utilizar boquillas cónicas. Para aplicaciones terrestres se recomiendan volúmenes de aspersión desde 60 hasta 600 l/ha haciendo el debido ajuste de concentración de producto en la mezcla para aplicar la dosis recomendada. Para aplicaciones aéreas úsese volúmenes desde 25 – 50 l/ha con gotas grandes (300 – 500 micras). La altura de vuelo no debe de ser mayor de 3m, la velocidad del viento no menor de 5 Km/hora, la humedad relativa mayor de 80% y la temperatura ambiental menor de 28 grados centígrados. Utilícese un agente antiderrivante de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de ese producto. Evite aplicar bajo condiciones de inversión atmosférica. Este producto no es corrosivo al equipo de aplicación.

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene el tanque hasta la mitad con agua limpia, o el tanque usado para preparar las mezclas con agua limpia, y agregue la cantidad recomendada de este producto y agite para que se mezcle con el agua. Use la mezcla el día de su aplicación. El equipo y los utensilios usados en la mezcla y la aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo. Deseche las aguas de lavado en un hueco lejos de fuentes de agua y viviendas, el personal que efectúe el lavado de los equipos, debe usar guantes y botas de hule.

RECOMENDACIONES DE USO: Costa Rica.



Este producto controla una gran diversidad de malezas como son: Bermuda (*Cynodon plectostachyus*), Alambrilla (*Digitaria* spp), Kikuyo (*Pennisetum clandestinum*), Cabezón (*Paspalum paniculatum*), Caminadora (*Rottboellia exaltata*), Zacate Guinea (*Panicum maximum*), Pata de Gallina (*Eleusine indica*), Zacate Para (*Brachiaria mutica*), Pajón (*Paspalum virgatum*), Gamalote (*Paspalum* sp), Arroz Rojo (*Oryza sativa*), Pasto Jaraqua (*Hyparrhenia rufa*), Zacate Jhonson (*Sorghum halepense*), Pasto Elefante (*Pennisetum purpureum*), Bleido (*Amaranthus* spp), Mozote (*Bidens pilosa*), Santa Lucia (*Ageratum conyzoides*), Flor Amarilla (*Melampodium divaricatum*), Clavelillo (*Emilia sonchifolia*).

CULTIVO		DOSIS
Café	<i>Coffea arabica</i>	Malezas anuales: 1 l/ha en 40 – 60 litros de agua con el sistema bajo volumen. Aplicar cuando las malezas están en crecimiento y con una altura de 15 – 30 cm de altura. Malezas perennes: 2 – 3 l/ha en 100 – 400 litros de agua/ha. Se debe de aplicar con boquillas de alto volumen. En el caso de grama y ciperáceas utilice de 3 – 4 l/ha.
Cítricos	<i>Citrus</i> sp	
Banano	<i>Musa</i> sp	
Palma africana	<i>Elaeis guineensis</i>	
Aguaicate	<i>Persea americana</i>	
Presiembra		Utilice de 3 – 4 l/ha en 100 – 400 litros de agua/ha.
Arroz	<i>Oryza sativa</i>	
Maíz	<i>Zea mays</i>	
Sorgo	<i>Sorghum bicolor</i>	
Papa	<i>Solanum tuberosum</i>	

ÉPOCA DE APLICACIÓN: Utilizar en pre – post emergencia a la maleza, según sea el caso.

INTERVALO DE APLICACIÓN: Se aplica al inicio del cultivo.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: Sin restricción.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Esperar a que se seque el rocío de la aplicación. Si es necesario entrar antes, debe utilizarse el equipo de protección completo.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis recomendadas en este panfleto.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con herbicidas de contacto, hormonales, si hay duda realice una prueba de compatibilidad a pequeña escala.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte este producto con alimentos, semillas, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los herbicidas en contacto con otros agroquímicos. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor, de niños, personas discapacitadas y animales domésticos. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar. Este producto es corrosivo al hierro y al acero.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Se presenta leve irritación y enrojecimiento de los ojos y membranas mucosas y del tracto respiratorio, náuseas.

PRIMEROS AUXILIOS:

Ingestión: Induzca el vómito dando a beber jarabe de ipecacuana a una dosis de 30 ml en adultos y de 15 ml en niños. En caso de no tener jarabe dé a beber dos vasos de agua y luego toque la base posterior de la lengua con los dedos o algún objeto no punzocortante.

Inhalación: Retire al paciente a un lugar ventilado, seco y aireado. Afloje las prendas de vestir y vigile la respiración.

Contacto con los ojos: Lave inmediatamente con agua durante 15 minutos. Obtenga atención médica.

Contacto con la piel: Quítese las prendas contaminadas y lave la zona afectada con suficiente agua y jabón.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico. El tratamiento médico es sintomático y de soporte. En caso de intoxicación notificar al Ministerio de Salud.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

Institución	País	Número de teléfono
Centro Nacional de Intoxicaciones	Costa Rica	2223-1028

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS, ESTANQUES O FUENTES DE AGUA SUBTERRÁNEAS CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos y perforelos. Si el país cuenta con un programa especial de recolección y disposición de envases entregue este al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto. En caso de derrames o desechos de plaguicidas recoja los con aserrín o algún material absorbente y recólectelos en un recipiente hermético y entréguelo al distribuidor o elimínelo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON
DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su empaque original y cerrado herméticamente. También garantizan la eficacia del producto, siempre y cuando se le dé el uso estipulado en el panfleto. Debido a que está fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento y manipuleo de este producto, nos es imposible asumir responsabilidades por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Se garantiza, así mismo la composición química del producto tal y como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el empaque se encuentre sellado.

FORMULADO POR: ZHEJIANG JINFANDA BIOCHEMICAL CO., LTD.

Hencun Town, Tonglu Country, Zhejiang Province, China.

Tel: +86-571-56986668 / Fax: +86-571-56986618.

Distribuido por: DAC - DISTRIBUIDORA AGROCOMERCIAL S.A.

Tel: 2494-9800 • Fax: 2249-3733 • Coyol, Alajuela, Costa Rica.

info@agrodac.com • www.agrodac.com

PAÍS
Costa Rica

NÚMERO DE REGISTRO
3301

FECHA DE REGISTRO
07/12/92