

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.



DAC PROPICONAZOL 25 EC

FUNGICIDA – TRIAZOL

PROPICONAZOL

ATENCIÓN
ANTÍDOTO: NO TIENE.

SOLVENTE: MEZCLA DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS.
DENSIDAD: 0.98 G/ML A 20 °C.

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO.

MODO DE ACCIÓN: DAC PROPICONAZOL 25 EC es un fungicida sistemático del grupo de los triazoles con un amplio espectro de acción. Controla hongos de los órdenes: ascomycetes, basidiomycetes y deuteromycetes. Se absorbe por el follaje y se transloca a través del xilema. Este producto se usa para el control de las principales enfermedades del banano, plátano, café, arroz, ornamentales y piña.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: DAC PROPICONAZOL 25 EC es un fungicida sistémico (es absorbido rápidamente a través de la cutícula y transportado en forma acrópeta (de abajo hacia arriba en las hojas) que inhibe la biosíntesis del ergosterol, elemento esencial de las membranas celulares de los hongos. Ejerce su acción preventiva, curativa y erradicante, en especial sobre las fases iniciales de la enfermedad.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Pueden utilizar aviones o helicópteros equipados con unidades rotatorias ("MicroNaires") o barras con boquillas de diversos tipos (cono hueco). Se le solicita cumplir con las recomendaciones de aplicación aérea indicadas en el D.E. 31520-MS-MAG-MINAE-MOPT-MGPSP. Si se aplica con equipo estacionario, de tractor, de espalda, éstos deben ajustarse de tal forma que brinden buena cobertura y un tamaño uniforme de gotas. Para un mayor efecto utilice boquillas que expulsen gotas de tamaño promedio de 200 µ o menos. Antes de utilizar el producto verifique que el equipo de aplicación este en buen estado de uso y calibrado. No tiene acción química sobre equipos. También puede utilizar equipos manuales y motorizados de espalda con boquillas de cono hueco, equipos terrestres como tractores con aguilones y boquillas que garanticen una cobertura uniforme y total del cultivo, sin excesivo goteo derivado de la aplicación de volúmenes muy elevados.

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: APLICACIÓN EN ACEITE PURO: Agitar bien el producto en su envase original previo a la mezcla con el aceite. Colocar la dosis de DAC en el tanque mezclador y agregar la cantidad requerida de aceite mineral parafínico, para completar el volumen total de mezcla que se desea aplicar por hectárea, tomando en cuenta que la acumulación excesiva de aceite mineral parafínico en las hojas de las plantas puede afectar los rendimientos del cultivo de banano y la calidad de la fruta. EMULSIONES: Colocar la cantidad de aceite que se desea aplicar en el tanque. Con el agitador funcionando, iniciar la incorporación de agua hasta completar el mililitro, agregar DAC PROPICONAZOL 25 EC y continuar llenando el tanque para alcanzar el volumen total requerido. Después de cada aplicación, los utensilios usados en la mezcla, al igual que los equipos, deben lavarse en forma adecuada.

RECOMENDACIONES DE USO. País: Costa Rica.

Cultivo	Plaga	Dosis	Observaciones
Banano <i>Musa spp</i>	Sigatoka Negra <i>Mycosphaerella</i> <i>fiijensis</i> var. <i>Difformis</i>	0.4 l/ha (0.28 l/mz)	Aplicación Aérea: Aplicaciones en emulsión: Épocas de transición: dosis de aceite: 5 a 8 L/ha (3.5-5.6 L/mz). Volúmenes de aplicación: Entre 12 y 20 L/ha (8.5-14.1 L/mz). Utilizar programas alternos o integrados con otros fungicidas. Aplicaciones en aceite puro: En épocas de mayor precipitación y alta incidencia de la enfermedad. Volumen de aceite: 10 a 12 L/ha. (7.1-8.5 L/mz). Aplicación Terrestre: Volumen de aplicación es de 200 a 400 L/ha. Intervalo de aplicación: Los intervalos de aplicación dependen de la incidencia de la enfermedad.
Piña <i>Ananas</i> <i>comosus</i>	<i>Fusarium</i> <i>oxysporum</i>	1.75 l/ha (1.22 l/mz) 2.5 l/ha (1.75 l/mz)	Usar 2 ciclos de aplicación bajo condiciones climáticas difíciles. Use las dosis altas en condiciones más difíciles. Volumen de aplicación 2000 l de agua por hectárea.
Aplicaciones Terrestres			
Café <i>Coffea arabica</i>	Roya <i>Hemileia vastatrix</i>	0.75 – 1.0 l/ha (0.5 – 0.7 l/mz)	Aplicaciones en agua: Iniciar las aplicaciones al principio de la época lluviosa. 8 aplicaciones por ciclo. Los intervalos de aplicación dependen de la incidencia de la enfermedad. Se recomienda utilizar DAC PROPICONAZOL 25 EC con fungicidas protectores y alternarlo con fungicidas sistémicos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia. Se recomiendan volúmenes de 200 a 400 L/ha (141-282 L/mz).
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Helminthosporiosis <i>Helminthosporium</i> <i>oryzae</i>	0.5 l/ha (0.35 l/mz)	Realizar 2 aplicaciones por ciclo de cultivo, la primera en etapa temprana y otra para proteger la espiga, se puede mezclar con fungicidas protectores para evitar el desarrollo de resistencia. Volumen de aplicación: Terrestre: usar 100-400 L/ha.
Ornamentales	Roya <i>Puccinia</i> sp Cenicilla <i>Sphaerotheca</i> <i>pannosa</i>	0.75 l/ha (0.5 l/mz)	Aplicaciones en agua: Iniciar las aplicaciones al inicio de la época lluviosa. Los intervalos de aplicación dependen de la incidencia de la enfermedad. En general se recomienda de 3-5 aplicaciones por ciclo. Se recomienda mezclar DAC PROPICONAZOL 25 EC con fungicidas protectores y/o alternarlo con fungicidas sistémicos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia. Volumen de aplicación: 200-400 L/ha.

INTERVALO DE APLICACIÓN: En banano, plátano, café y ornamentales el intervalo de aplicación depende de la incidencia de la enfermedad. En piña es de 30 días entre la primera y la segunda aplicación.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: En banano y plátano no procede, ya que la fruta está embolsada y sufre un proceso de lavado durante el empaque (en casos de que la fruta no sea embolsada, el período de carencia es de 7-15 días). En café, el período de carencia es de 30 días. En arroz es de 7 días. En piña no procede debido a que las dos aplicaciones se hacen a la mitad del ciclo cultivo.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Esperar a que los residuos de las pulverizaciones se sequen, antes de autorizar el reingreso de animales domésticos o personal de la finca, salvo aquel que esté provisto de equipo protector.

FITOTOXICIDAD: No presenta ninguna fitotoxicidad si se aplica a la dosis y en la forma recomendada.

COMPATIBILIDAD: Es perfectamente miscible en agua y es compatible con los fungicidas e insecticidas comúnmente usados en reacción neutra.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacenar en lugares frescos, cerrado herméticamente, lejos de la luz del sol, lejos de llamas y fuentes de calor. Se debe transportar en su envase original, debidamente etiquetado, lejos de alimentos, medicinas y otros productos de uso agrícola.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Pueden presentarse reacciones alérgicas a personas susceptibles, náuseas, vómito, ataxia, convulsiones y coma, dolor de cabeza, vértigo y debilidad. Es ligeramente irritante a la piel y a los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión: No induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

En caso de contacto con la piel: Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

En caso de inhalación: Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

En caso de contacto con los ojos: Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: No existe antídoto específico. Seguir terapia sintomática y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

País	Institución	Número de teléfono
Costa Rica	Centro Nacional de Intoxicaciones	2223-1028

PROTECCIÓN AL AMBIENTE:



TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

RESPECTE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUSES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON LAS BARRERAS DE PROTECCIÓN QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Utilice los envases vacíos y entréguelos al centro de recolección más cercano. En el caso de derrames recoja los con aserrín o con material absorbente deposítelos en un recipiente hermético y elimínelos en un relleno sanitario autorizado.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA: El fabricante y el vendedor garantizan que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y que es razonablemente adecuado para los propósitos aquí señalados, siempre y cuando se sigan las instrucciones de la etiqueta y el panfleto, y se use bajo condiciones normales. No se extiende ningún tipo de garantía expresa o implícita, para su comercialización o utilidad para cualquier propósito específico, cuando no se sigan las instrucciones de la etiqueta y cuando las condiciones de uso sean anormales o no hayan sido razonablemente previstas por el vendedor, o en cuyo caso el comprador asume los riesgos de manejo y uso.

FORMULADOR: LABORATORIOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, S.A. (LAQUINSA), Llorente de Tibás, 1 1/2 kilómetros al este del periódico La Nación • Teléfono: 2247-1000, San José, Costa Rica.

IMPORTADO POR: DAC - DISTRIBUIDORA AGROCOMERCIAL S.A. Tel: 2494-9800 • Fax: 2249-3733. Coyoil, Alajuela, Costa Rica. • info@agrodac.com • www.agrodac.com

País: Costa Rica

Número de registro: 3908

Fecha de registro: 17/06/96