

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.



ETHOFIN 10 SC

FUNGICIDA – THIAZOLE CARBOXIMIDE
ETHABOXAM

PRECAUCIÓN
ANTÍDOTO: NO TIENE.

Densidad: 1.04 g/ml a 20°C.

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE
Y/O INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,
ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



USO AGRONÓMICO.

MODO DE ACCIÓN.

Este producto es un fungicida que inhibe completamente el crecimiento micelial del hongo y su esporulación, inhibiendo los microtubos del hongo y afectando la respiración mitocondrial. El producto es protector, curativo, translaminar y sistémico.

EQUIPO DE APLICACIÓN.

Este producto puede ser aplicado con equipo ya sea manual, acoplado al tractor y aéreo, el volumen de aplicación varía de acuerdo al tipo de equipo, con equipo terrestre aplique de 200 – 400 litros/ha, con equipo aéreo aplique entre 40 – 60 litros/ha, use boquillas de cono hueco. Cerciórese que el equipo de aplicación se encuentre en condiciones adecuadas de uso. Calibre el equipo de aplicación. Debe usar botas, mascarilla, anteojos y guantes durante la aplicación. Este producto no presenta ningún tipo de acción sobre el equipo de aplicación.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA.

Para preparar el caldo de aplicación, llene el tanque de la aspersora hasta la mitad con agua limpia poniendo el sistema de agitación o recirculación a trabajar, vierta luego la cantidad requerida del producto y termine de llenar el tanque con agua limpia. Deseche las aguas del lavado del equipo en un hueco, lejos de fuentes de agua y viviendas. El equipo y los utensilios empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo.



RECOMENDACIONES DE USO.

PAÍS: COSTA RICA.

CULTIVOS	ENFERMEDADES	DOSIS
PAPA <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón tardío o Apagón <i>Phytophthora infestans</i>	1.5 Lt/ha.

ÉPOCA DE APLICACIÓN E INTERVALO DE APLICACIÓN.

En forma preventiva o a la aparición de los primeros brotes de la enfermedad. Se puede aplicar con intervalos de 4 a 7 días según el nivel de enfermedad.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA.

30 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA.

Esperar a que se seque el rocío de la aplicación. Si es necesario antes debe utilizarse el equipo de protección completo.

FITOTOXICIDAD.

No es fitotóxico usándolo en los cultivos y a la dosis recomendadas en este panfleto.

COMPATIBILIDAD.

Este producto es compatible con la mayoría de agroquímicos utilizados en la agricultura. No lo mezcle con productos alcalinos como caldo bordelés, la cal corriente y compuestos a base de azufre y calcio.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE.

Este producto no es inflamable, no es explosivo ni corrosivo. No transporte este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los herbicidas en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases o empaques sin cerrar.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN.

No se han encontrado síntomas de toxicidad en humanos.

PRIMEROS AUXILIOS.

Ingestión: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, dele a beber claras de huevo en un poco de agua (8 para adultos y 4 para niños).

Inhalación: Retire a la persona afectada del área contaminada a una de mayor ventilación y manténgala en reposo. En caso necesario obtenga atención médica.

Contacto con los ojos: Lave inmediatamente con agua durante quince minutos. Obtenga atención médica.

Contacto con la piel: Quítese las ropas contaminadas y lave la zona afectada con suficiente agua y jabón.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO.

El tratamiento médico es sintomático y de soporte. No existe antídoto específico.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN.

INSTITUCIÓN	PAÍS	NÚMERO DE TELÉFONO
Centro Nacional de Control de Intoxicaciones	Costa Rica	2223-1028

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

Tóxico para peces.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES.

En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recogerlos con aserrín o con material absorbente y para producto sólido recoger con una pala, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlos al distribuidor o eliminarlos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del producto.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS,
PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

AVISO DE GARANTÍA.

El fabricante y el registrante garantizan que el contenido químico de este envase corresponde a lo expresado en la etiqueta. Debe usarse exclusivamente para los propósitos señalados en las instrucciones de este panfleto, dentro de condiciones normales de almacenamiento y mantenerse en envases con su sello original. El comprador asume todos los riesgos y responsabilidades resultante del almacenamiento, manejo, uso, dosificación, aplicación, daños en los cultivos por el mal uso y lucro cesante que estén fuera de nuestro control.

FABRICADO Y FORMULADO POR:

DON BANG AGRO.

Con dirección 1055-2, Namhyun-Dong, Kwanak-ku,
Seul, Corea, 151-080, bajo supervisión de LG Life Science.

IMPORTADO POR:

DAC - DISTRIBUIDORA AGROCOMERCIAL S.A.

Tel: 2494-9800 • Fax: 2249-3733 • Coyol, Alajuela, Costa Rica.
info@agrodac.com • www.agrodac.com

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO	NÚMERO DE PERMISO DE REEMPAQUE
Costa Rica	8702156	28/10/09	8
República Dominicana	3569	06/10/10	