

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

KARATE ZEON® 2,5 CS

INSECTICIDA – PIRETROIDE
LAMBDA-CYHALOTHRIN



DAÑINO

ANTÍDOTO: NO TIENE
SOLVENTE: HIDROCARBURO AROMÁTICO
DENSIDAD: 0,98 g/cm³ a 20°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O
SE INHALA. PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR
EXPOSICIÓN

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”
“MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS
MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS,
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

KARATE ZEON® 2,5 CS es un insecticida de contacto e ingestión, presentando además un buen efecto residual. KARATE ZEON® 2,5 CS actúa sobre el sistema nervioso del insecto, provocando hiperexcitación, convulsiones, parálisis y finalmente la muerte. KARATE ZEON® 2,5 CS produce el bloqueo de la conducción de los estímulos nerviosos al modificar el movimiento de los iones de sodio, afectando así la permeabilidad de las membranas de las células nerviosas.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Aspersora de mochila, equipo accionado por tractor o avión. Para espolvorear y asperjar agroquímicos, los límites máximos de viento serán 10 Km/h para espolvoreo y 15 Km/h para aspersiones. Antes de utilizar el equipo de aspersión, revise cuidadosamente que esté en buen estado de funcionamiento. Antes de aplicar KARATE ZEON® 2,5 CS, calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis correcta. Se recomienda usar boquillas de cono hueco, para equipo terrestre. Para aplicaciones aéreas, utilizar de 55 a 75 litros de agua por hectárea.

Después de la aplicación lave el equipo de aspersión con agua limpia y jabón, déjelo secar y guárdelo. Utilice el equipo de protección personal antes de usar y manipular KARATE ZEON® 2,5 CS.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Póngase el equipo de protección personal antes de usar y manipular KARATE ZEON® 2,5 CS. Como con todos los productos químicos, **evite en lo posible el contacto con la solución**. No comer, beber o fumar durante el manejo y aplicación de este producto.

De acuerdo con la dosis de KARATE ZEON® 2,5 CS a utilizar, mézclelo en el tanque de la aspersora o tonel con agua limpia hasta la mitad; seguidamente complete el volumen de agua requerido. Agite para obtener una mezcla homogénea antes de comenzar la aspersión. Se recomienda una presión de 20 a 40 libras por pulgada cuadrada y un volumen de 285-570 litros de agua por hectárea (200-400 litros de agua por manzana).



RECOMENDACIONES DE USO:

USOS AUTORIZADOS EN COSTA RICA:

Algodón	<u>Gossypium spp</u>
Arroz	<u>Oryza sativa</u>
Café	<u>Coffea spp</u>
Cebolla	<u>Allium cepa</u>
Chayote	<u>Sechium edule</u>
Frijol	<u>Phaseolus vulgaris</u>
Maíz	<u>Zea mays</u>
Repollo	<u>Brassica oleracea</u> var. <u>Capitata</u>
Sorgo	<u>Sorghum spp</u>
Piña	<u>Ananas comosus</u>

DOSIS RECOMENDADA:

286-572 mL/ha (200-400 mL/mz) ó 25 cm³ por bomba de 16 litros.

Piña: 1,5 litros/ha (0,75 mL/litro de agua), con un volumen de 2,000 litros de mezcla por hectárea

APLICACIONES AÉREAS:

Para aplicación aérea en los cultivos de arroz, sorgo, maíz y frijol, la dosis es de 286-572 mL/ha en 38-57 litros de agua/ha.

Para aplicaciones aéreas en el cultivo de piña, hágalo en horas tempranas y temperatura menor a 25° C y viento menor a 8 KPH. Utilice una altura de vuelo de 1.5 a 2 m. No aplicar cerca de fuentes de agua. Dejar al menos 30 metros de franja de seguridad entre el último pase y las fuentes de agua.

Zonas recomendadas para la aplicación aérea: Zonas planas incluyendo las regiones Atlántica, Norte y Buenos Aires de Puntarenas.

USOS AUTORIZADOS GUATEMALA, BELICE, EL SALVADOR Y HONDURAS:

Maíz	<u>Zea mays</u>
Sorgo	<u>Sorghum spp</u>
Tomate	<u>Lycopersicon esculentum</u>
Papa, patata	<u>Solanum spp</u>
Brócoli	<u>Brassica oleracea</u> var. <u>italica</u>
Repollo	<u>Brassica oleracea</u> var. <u>Capitata</u>
Lechuga	<u>Lactuca sativa</u>
Maní, cacahuete	<u>Arachis hypogaea</u>
Chile, ají, pimienta	<u>Capsicum annum</u>
Frijol	<u>Phaseolus spp</u>
Ajonjolí	<u>Sesamun indicum</u>
Cebolla	<u>Allium cepa</u>
Ajo	<u>Allium sativum</u>
Arroz	<u>Oryza sativa</u>
Melón	<u>Cucumis melo</u>

USOS AUTORIZADOS EN NICARAGUA:

Maíz	<u>Zea mays</u>
Sorgo	<u>Sorghum spp</u>
Frijol	<u>Phaseolus spp</u>
Tomate	<u>Lycopersicon esculentum</u>
Arroz	<u>Oryza sativa</u>

USOS AUTORIZADOS EN PANAMÁ:

Arroz	<u>Oryza sativa</u>
Maíz	<u>Zea mays</u>
Sorgo	<u>Sorghum spp</u>
Café	<u>Coffea spp</u>
Frijol	<u>Phaseolus vulgaris</u>
Algodón	<u>Gossypium spp</u>
Melón	<u>Cucumis melo</u>
Sandía	<u>Citrullus vulgaris</u>
Zapallo	<u>Cucurbita pepo</u>

USOS AUTORIZADOS EN REPUBLICA DOMINICANA:

Apio	<u>Apium graveolens</u>
Arroz	<u>Oryza sativa</u>
Tabaco	<u>Nicotiana tabacum</u>
Habichuela	<u>Phaseolus sp</u>
Cebolla	<u>Allium cepa</u>
Ajo	<u>Allium sativum</u>
Zanahoria	<u>Daucus carota</u>
Remolacha	<u>Beta vulgaris</u>
Berenjena	<u>Solanum melongena</u>
Tomate	<u>Lycopersicon esculentum</u>
Sorgo, maicillo	<u>Sorghum vulgare</u>
Maíz	<u>Zea mays</u>
Café	<u>Coffea spp</u>
Auyama	<u>Cucurbita pepo</u>
Pastos	

NOMBRE DE LOS INSECTOS A CONTROLAR:	
Gusano cogollero, soldado, tierrero, prodenia	<u>Spodoptera spp</u>
Mosca midge, mosquita del sorgo, mosca del ovario	<u>Contarinia sorghicola</u>
Picudo de la vaina, picudo de la vaina del frijol	<u>Apion godmani</u>
Tortuguilla, coquitos perforadores	<u>Diabrotica sp</u>
Gusano diamante, polilla de la col, dorso de diamante, oruga verde	<u>Plutella xylostella</u>
Mariposa blanca, palomilla blanca	<u>Pieris sp</u>
Gusano del fruto	<u>Heliothis spp</u>
Piojillo de la cebolla, piojillo	<u>Thrips spp</u>
Chinche de la espiga de arroz	<u>Oebalus spp</u>
Afidos	<u>Myzus sp</u>
Acaros de la espiga o hiedevivos de la espiga	<u>Steneotarsonemus spinki</u>
Picudo acuático	<u>Lissorhoptrus oryzophilus</u>
Chicharrita, salta hojas verde	<u>Hortensia spp</u>
Minador	<u>Liriomyza sp</u>
Falso medidor	<u>Trichoplusia ni</u>
Mosca blanca	<u>Bemisia tabaci</u>
Picudo del chile, barrenillo del chile	<u>Anthonomus eugenii</u>
Sogata, mosquita del arroz, cigarrita	<u>Sogatodes orizicola</u>
Chinche de la espiga del arroz	<u>Alkindus sp</u>
Barrenador del fruto, gusano del melón, oruga de los melones	<u>Diaphania sp</u>
Gusano (piña)	<u>Elaphria nucicolora</u>
Thecla (piña)	<u>Strymon spp.</u>

DOSIS RECOMENDADA: 350 - 500 mL/ha (252 - 350 mL/manzana) o 25 – 35 cm³ por aspersora de mochila de 16 litros.

INTERVALO DE APLICACIÓN: Dependerá de la dinámica poblacional del insecto plaga. El intervalo puede variar de cada 3 a 8 días, o bien al observarse la presencia de los primeros insectos en el cultivo.

Piña – Costa Rica:
Gusano- Elaphria: Realizar dos aplicaciones espaciadas cada 6 días, cuando las larvas de Elaphria nucicolora se encuentren en el instar L1 y no más de L3.

Thecla- Strymon spp.: Realizar aplicaciones cada 7 días a partir de las 7 semanas después del forzamiento, de acuerdo con el monitoreo.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:
Arroz, tabaco, habichuela, auyama, papa, zanahoria, remolacha, apio, berenjena, tomate, sorgo, café, brócoli, coliflor, repollo, lechuga, chile, maní, ajonjolí, maíz y algodón: Un día.
Melón, chayote, sandía, zapallo: Tres días.
Cebolla, ajo: Catorce días.
Piña: 70 días

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:
24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: **KARATE ZEON® 2,5 CS** no es fitotóxico a los cultivos y dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD: **KARATE ZEON® 2,5 CS** es compatible con la mayoría de productos agrícolas. No es compatible con productos alcalinos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
KARATE ZEON® 2,5 CS no es inflamable. No almacene ni transporte **KARATE ZEON® 2,5 CS** junto con productos de consumo humano, animal, fertilizantes y semillas. Almacénelo y téngalo en su envase original, bien cerrado y debidamente etiquetado con su correspondiente panfleto, en un lugar seco y bien ventilado, lejos del alcance de los niños o personas mentalmente incapacitadas.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Náuseas, vómitos, dolor de estómago, diarrea, temblores, ataxia y convulsiones.

PRIMEROS AUXILIOS:
POR INGESTIÓN: No provoque el vómito, lleve inmediatamente el paciente al médico. Si la persona está consciente, dar a beber de cuatro a seis (4-6) cucharadas de carbón activado en un (1) vaso de agua.
POR INHALACIÓN: Retire al paciente a un lugar fresco, seco y aireado; manténgalo en reposo y vigile la respiración.
POR CONTACTO CON LOS OJOS: Abra los párpados y lave los ojos con un flujo continuo de agua limpia por 15 minutos. Consulte al médico.
POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón por 15 minutos.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico. Realice lavado gástrico, teniendo cuidado de prevenir el aspirado de los contenidos gástricos. Administre tratamiento sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	TELÉFONO
GUATEMALA	Centro de Información y Asesoría Toxicológica	1-801-00-29832
	Karl Heusner Memorial Hospital	2251-3560, 2232-0735
BELICE	Dr. Hurrisa Hailu	231-548 y 231-639
EL SALVADOR	Centro Nacional de Información Toxicológica, Hospital San Rafael	622-460
	Hospital Escuela	2525-5800, ext.148 y 149
HONDURAS		232-2322 y 232-2415
NICARAGUA	Centro de Toxicología Complejo de Salud Concepción Palacios	
COSTA RICA	Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones	2289-7150, ext. 213
		2223-1028
PANAMÁ	Centro de Información e Investigación de Medicamentos y Tóxicos	523-4948, 523-4968
REPÚBLICA	Hospital Dr. Luis Aybar	684-3478 y 684-3672
DOMINICANA	Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello	681-2913 y 681-6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS. NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.



No contamine fuentes de agua con los desechos o envases vacíos.
TOXICO PARA ABEJAS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:
En el caso de derrames o desechos del producto, recogerlos con aserrín o con material absorbente, recolectarlos en un recipiente hermético y

entregarlo al distribuidor o eliminarlo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

En el caso de aplicaciones aéreas, se deben seguir las siguientes medidas: Se prohíbe desechar en vuelo los remanentes de agroquímicos no utilizados. Descargar cualquier residuo líquido de la aeronave en un sistema de tratamiento debidamente aprobado por el Ministerio de Salud. Se prohíbe el lavado de cualquier equipo de aplicación en ríos, lagos y corrientes de agua.

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos. A fin de evitar remanentes, se sugiere preparar la mezcla a utilizar en el día.

Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:
El fabricante garantiza el contenido de este envase, siendo apto el producto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso. El buen uso será responsabilidad exclusiva del comprador.

FABRICANTE: Syngenta Chemicals B.V.
Rue de Tyberchamps 37, B-7180, Seneffe, Bélgica
Tel.: 02343580. Fax: 023343599

IMPORTADO POR:

Guatemala:
Agroinsumos, S.A.
5ª Avenida 5-55 zona 14, Edificio Europlaza, Torre 3, 8º Nivel.
Tel. 2312-7000 / Fax 2312-7005

Belice:
James Brodie & Co. Ltd.
16 Regent Street, Ciudad de Belice. Tel. 277-070. Fax: 275-593

El Salvador:

Honduras:
Syngenta Crop Protection – Sucursal Honduras
Residencial Las Hadas casa #2902, Tegucigalpa,
Tel 00 504 2347764, fax 00504 2320725

Nicaragua:
Syngenta Crop Protection, S. A. – Sucursal Nicaragua
Residencial Los Robles, casa L-15 Del restaurante La marseillaise media cuadra al sur, Managua Nicaragua.
Tel.: 270-5008 / Fax: 278-0928

Costa Rica:
Syngenta Crop Protection, S.A. – Sucursal Costa Rica
700 m este de la Intersección del Aeropuerto Juan Santamaría
Calle paralela, contiguo Zona Franca Saret, Plaza Aeropuerto, Oficina D1, Alajuela, Costa Rica. Tel.: 2431-4707. Fax: 2431-4710

Panamá:
Syngenta, S.A.
R.U.C. 5306-2-329422 D.V.80, Clave 3987
Panamá Torre Evergreen Piso 6, Ave. 5ta B Sur y Calle 78 Este, San Francisco, Ciudad Panamá, República de Panamá
Tel.: 270-8200 / Fax: 270-8288

República Dominicana:
Syngenta Crop Protection, S.A. – Sucursal República Dominicana
Calle Porfirio Herrera No. 29, Torre Empresarial INICA - Piso 4to.
Ensanche Evaristo Morales, Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 1- 809 227 0412 / 14. Fax: 1- 809 540 9340

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	302-145	26-02-04
BELICE	0023-6	21-10-09
EL SALVADOR	AG-99-06-554	03-06-09
HONDURAS	553-279-III	12-10-99
NICARAGUA	Sy-0891-2-99	10-06-99
COSTA RICA	4453	25-01-00
PANAMÁ	1081	28-07-09
REP. DOMINICANA	1983	02-12-09