¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

Lepicron® 75 WP

INSECTICIDA, TRIAZINA
CYROMAZINE

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA. PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

"NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN"
"MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS"



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:
LEPICRON® 75 WP *es un insecticida regulador de crecimiento con acción de contacto, que interfiere con la muda y estado de pupa de las larvas. Cuando es usado sobre las plantas la acción es sistémica; aplicado a las hojas muestra un fuerte efecto translaminar. Aplicado al suelo es tomado por las raíces y translocado acropetalmente.*

EQUIPO DE APLICACIÓN:
LEPICRON® 75 WP *puede aplicarse con aspersora de espalda, equipo terrestre o aéreo. Utilice boquilla de cono hueco. Calibre el equipo adecuadamente previo a la aplicación y lávelo inmediatamente después de usarlo. Calibre siempre su equipo con agua, antes de aplicar el producto. Asegúrese que el equipo de aplicación esté en buenas condiciones. Recuerde obtener el equipo auxiliar adecuado (medidores de productos líquidos y sólidos, cubetas graduadas, paletas de agitación, cepillos, brochas, etc.) El producto no tiene acción corrosiva sobre el equipo de aplicación. Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto, durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación: botas, mascarilla, anteojos, guantes, dosificador y equipo de aplicación en buen estado.*



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
Agregar la cantidad recomendada de ***LEPICRON® 75 WP*** *en un recipiente con agua para realizar una pre-mezcla; ésta agregarla al tanque que contiene el agua total a asperjar.*



RECOMENDACIONES DE USO:

USOS AUTORIZADOS EN COSTA RICA	
CULTIVOS	***PLAGA***
Apio ***Apium graveolens*** *Lechuga* ***Lactuca sativa*** *Melón* ***Cucumis melo*** *Tomate* ***Lycopersicon esculentum*** *Cebolla* ***Allium cepa*** *Ornamentales: Gerberas y Crisantemos*	*Minador de la hoja* ***Liriomyza trifolii***
Papa ***Solanum tuberosum***	*Minador de la hoja* ***Liriomyza spp***

DOSIS RECOMENDADAS:

Apio, Lechuga, Melón, Tomate, Cebolla y Ornamentales: *100 – 150 g/ha (50 gramos en 200 litros de agua).*
Papa: *125 g/ha*

INTERVALO DE APLICACIÓN:
Apio, Lechuga, Melón, Tomate, Cebolla y Ornamentales: *Cuando aparezca la plaga, especialmente en verano, una aplicación cada tres semanas. Se recomienda no hacer más de 12 aplicaciones en el cultivo de apio y no más de 8 en el cultivo de lechuga.*
Papa: *Aplicar cada 15 días dependiendo de la presión del insecto. Realizar aplicaciones cuando la población supere las 3 minas/planta o se encuentren 5 adultos por planta. Aplicar volúmenes de 200 a 300L asegurando una buena cobertura.*

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:
14 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:
No reingresar en áreas tratadas hasta transcurridas 24 horas después de efectuada la aplicación. En caso contrario utilice el equipo de protección personal completo.

FITOTOXICIDAD:
LEPICRON® 75 WP *no es fitotóxico en las dosis y para los cultivos recomendados en este panfleto. Sin embargo, debido al gran número de variedades e híbridos existentes, se recomienda hacer ensayos en pequeña escala para observar la fitocompatibilidad.*

COMPATIBILIDAD:
Se recomienda aplicar sólo ***LEPICRON® 75 WP*** *para obtener la mayor eficacia del producto. Ante la imposibilidad de conocer todos los productos del mercado no asumimos ninguna responsabilidad por mezclas hechos con estos.*

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, medicina, ropa, utensilios de uso doméstico o forrajes. Almacénelo bajo llave, en un lugar fresco, seco, alejado del calor o del fuego. Conserve o almacene este producto en su envase original, etiquetado y debidamente cerrado, con su correspondiente panfleto. ***LEPICRON® 75 WP*** *no es inflamable ni corrosivo.*

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:
No se conocen en humanos. Puede provocar irritación de la piel y enrojecimiento de los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS:
POR INGESTIÓN: *Si la persona está consciente, provoque el vómito dando a beber jarabe de Ipecacuana, a una dosis de 30 mL para adultos y 15 mL para niños, seguido de dos vasos de agua. En caso de no tener jarabe, dé a beber dos vasos de agua y frote la base de la lengua con el dedo o con un objeto no punzo-cortante.*
POR INHALACIÓN: *Retire al paciente del área contaminada y expóngalo al aire fresco y ventilado. Vigile la respiración.*
POR CONTACTO CON LOS OJOS: *Lávelos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo.*
POR CONTACTO CON LA PIEL: *Retire la ropa contaminada y lave abundantemente con agua y jabón las partes del cuerpo afectadas.*

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:
No se conoce antídoto específico. Dar tratamiento sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

COSTA RICA Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones 223-1028

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:



TOXICO PARA EL GANADO.

No aplique cerca de animales domésticos. No alimentar ganado en áreas que hayan sido tratadas con este producto, hasta transcurrida una semana después de efectuada la aplicación.

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS. NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.



No contamine con este producto o sus envases, desechos o derrames: ríos, lagos, charcas, zanjas, canales de drenaje, alcantarillas, etc. Evite los derrames del producto por la contaminación que puede provocar a las fuentes de agua. No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre del producto hacia otras áreas.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:
En el caso de derrames o desechos del producto, recogerlos con aserrín o con material absorbente, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.
Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos. A fin de evitar remanentes, se sugiere preparar la mezcla a utilizar en el día.
Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:
El fabricante y formulador garantizan el contenido de este envase, siendo apto el producto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso. El buen uso será responsabilidad exclusiva del comprador.

FORMULADOR:

Syngenta S.A.
Carretera a Mamonal Km 6, Cartagena, Colombia
Tel.: 95-668-5475. Fax: 95-668-5458

PAÍS	***NÚMERO DE REGISTRO***	***FECHA DE REGISTRO***
COSTA RICA	*3409*	*30-06-93*

® Marca registrada de
Gowan Crop Protection Limited.