

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO,
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.



METRALLA12.5 EC

HERBICIDA – ARILOXIFENOXIPROPIONATO
FLUAZIFOP-P-BUTYL

ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

SOLVENTE: Trimetilbenceno

DENSIDAD: 0,96 ± 0,05 g/ml a 20°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE
HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD
MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO: herbicida.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: Este producto es sistémico, selectivo, de postemergencia, que se absorbe vía foliar y se trasloca por el xilema y floema. Afecta la síntesis de lípidos a través de la inhibición de la enzima carboxilasa de la acetil coenzima A, localizada en el protoplasto. Actúa esencialmente en el sistema interno de membranas, de manera que las enzimas oxidativas e hidrolíticas son liberadas y actúan sobre los constituyentes citoplasmáticos, produciendo la destrucción de la célula.

EQUIPO DE APLICACIÓN: En aplicaciones terrestres utilizar equipos de elevado o bajo volumen. Se deben utilizar boquillas de tipo abanico plano. Antes de utilizar el equipo se debe verificar que se encuentre en buen estado de funcionamiento, sin fugas y con la calibración correcta.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen de agua con un rango de pH entre 6 y 7. Agite el producto y agregue la dosis recomendada poniendo el sistema de agitación o recirculación a funcionar y termine de llenar con agua el volumen del tanque de aplicación. El caldo de aplicación debe usarse el mismo día que se prepara la mezcla. Los utensilios usados durante la preparación y aplicación de la mezcla deben ser lavados después de cada jornada de trabajo. Brindar mantenimiento permanente al equipo de aplicación.



RECOMENDACIONES DE USO:

Honduras y Panamá

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	OBSERVA- CIONES
Ajo <i>Allium sativum</i>	Triguillo <i>Bromus catharticus</i> Ballico <i>Lolium temulentum</i>		
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Kikuyo <i>Pennisetum clandestinum</i> Pata de gallina <i>Poa annua</i>		
Café <i>Coffea arabica</i>	Lava frascos <i>Setaria geniculata</i> Gramma común <i>Paspalum conjugatum</i> Paja de burro <i>Panicum laxum</i> Pasto Argentina <i>Cynodon dactylon</i> Pata de gallo <i>Eleusine indica</i>	1.25 - 2 L/ha (0.9 – 1.4 L/mz) Volumen de caldo: 250-350 L/ha (175-245 L/mz) Momento de aplicación: Cuando las malezas tengan de 1 a 4 hojas (antes del macollaje).	
Algodón <i>Gossypium spp.</i>	<i>Echinochloa colonum</i> Pasto argentina <i>Cynodon dactylon</i> Guarda rocío <i>Digitaria sanguinalis</i>		
Soya / Soja <i>Glycine max</i>	Sorgo alepo <i>Sorghum halepense</i> Paja mona <i>Leptochloa filiformis</i> Caminadora <i>Rottboellia exaltata</i>		
Caña de azúcar <i>Saccharum officinarum</i>	Madurador de cultivo	0.352 – 0.4 L/ha (0.25 – 0.3 L/mz) Volumen de caldo: 250 - 350 L/ha (175 - 245 L/mz) Momento de aplicación: aplicaciones foliares de 4 a 6 semanas antes de la cosecha.	

Honduras

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	OBSERVA- CIONES
Melón <i>Cucumis melo</i> Calabaza <i>Cucurbita moschata</i> Calabacín <i>Cucurbita pepo</i> Pepino <i>Cucumis sativus</i> Sandía <i>Citrullus lanatus</i> Pipirán <i>Cucurbita argyrosperma</i> Patate <i>Sechium edule</i>	Zacate Guinea <i>Panicum maximum</i> Mozote <i>Cenchrus echinatus</i> Sorgo <i>Sorghum halepense</i> Kikuyo <i>Pennisetum clandestinum</i> Paitén <i>Setaria parviflora</i> Zacate <i>Chloris barbata</i> Pata de Conejo <i>Paspalum fimbriatum</i>	1,0 - 1,5 L/ha (0.70 – 1.05 L/mz) Volumen de caldo: 400 L/ha (280 L/mz) Momento de aplicación: cuando las malezas estén en pleno desarrollo o tengan de 2 a 4 hojas.	
Aji Chile <i>Capsicum sp.</i> Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i> Berenjena <i>Solanum melongena</i> Pimiento <i>Capsicum annuum</i> Tomate <i>Solanum lycopersicum</i> Lulo <i>Solanum quitoescens</i>	Paja mona o Plumilla <i>Leptochloa sp.</i> Liendre puerco o Arrocillo <i>Echinochloa sp.</i> Pasto argentina o grama bermuda <i>Cynodon dactylon</i> Guarda rocío o pangola <i>Digitaria sp.</i> Caminadora <i>Rottboellia sp.</i> Pata de gallo o de gallina <i>Eleusine sp.</i>	0.7 L/ha (0.49 L/mz) Volumen de caldo: 600 L/ha (420 L/mz) Momento de aplicación: postemergencia temprana de las malezas.	
Camote <i>Ipomoea batatas</i>		1.4 L/ha (0.98 L/mz) Volumen de caldo: 200-400 L/ha (140- 280 L/mz) Momento de aplicación: cuando las malezas poáceas están en pleno desarrollo o tengan de 2 a 4 hojas, o entre 4 - 6 cm de altura.	

Guatemala

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	OBSERVA- CIONES
Caña de azúcar <i>Saccharum officinarum</i>	Madurador de cultivo	0.30 – 0.40 L/ha (0.21 – 0.28 L/mz) Volumen de caldo: 250 - 350 L/ha (175 - 280 L/mz) Momento de aplicación: 4-6 semanas antes de la cosecha.	
Ajo <i>Allium sativum</i>	Arrocillo <i>Echinochloa colonum</i> Guarda rocío <i>Digitaria adscendens</i> Cebada cimarrona <i>Rottboellia cochinchinensis</i> Hierba de Conejo <i>Digitaria sanguinalis</i> Kikuyo <i>Pennisetum clandestinum</i>		
Algodón <i>Gossypium spp.</i>	Liendrepuerco <i>Echinochloa colonum</i> Pasto argentina <i>Cynodon dactylon</i> Guarda rocío <i>Digitaria adscendens</i> Caminadora <i>Rottboellia exaltata</i> Plumilla <i>Leptochloa filiformis</i> Mozote <i>Cenchrus echinatus</i>	1.25 – 2.00 L/ha (0.90-1.4 L/mz) Volumen de caldo: 250 - 350 L/ha (175 - 280 L/mz) Momento de aplicación: En postemergencia, cuando las malezas estén en pleno desarrollo o tengan de 2 a 4 hojas.	
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Kikuyo <i>Pennisetum clandestinum</i> Pata de gallina <i>Poa annua</i> Hierba de Conejo <i>Digitaria sanguinalis</i> Caminadora <i>Rottboellia exaltata</i>		
Soya/soja <i>Glycine max</i>	Sorgo alepo <i>Sorghum halepense</i> Paja mona <i>Heptochloa filiformis</i> Caminadora <i>Rottboellia exaltata</i> Pata de gallina <i>Eleusine indica</i> Hierba de Conejo <i>Digitaria sanguinalis</i> Cola de zorro <i>Setaria spp.</i>		

Café <i>Coffea arabica</i>	Lava frascos <i>Setaria geniculata</i> Pasto argentina <i>Cynodon dactylon</i> Gramma común <i>Paspalum conjugatum</i> Pata de gallo <i>Eleusine indica</i> Paja de burro <i>Panicum maximum</i> Mozote <i>Cenchrus echinatus</i>		
-------------------------------	--	--	--

El Salvador

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	OBSERVA- CIONES
Cítricos <i>Citrus spp.</i>	Gramma bermuda <i>Cynodon dactylon</i> Pangola <i>Digitaria adscendens</i> Zacate Guinea <i>Panicum maximum</i> Pata de gallina <i>Eleusine indica</i> Mozote <i>Cenchrus echinatus</i> Sorgo <i>Sorghum halepense</i> Caminadora <i>Rottboellia cochinchinensis</i>	1,5 - 2,0 L/ha (1.05 – 1.40 L/mz) Volumen de caldo: 300 L/ha (210 L/mz) Momento de aplicación: cuando las malezas estén en pleno desarrollo o tengan de 2 a 4 hojas.	
Piña <i>Ananas comosus</i>	Kikuyo <i>Pennisetum clandestinum</i> Paitén <i>Setaria parviflora</i> Zacate <i>Chloris barbata</i> Pata de Conejo <i>Paspalum fimbriatum</i> Plumilla <i>Leptochloa filiformis</i>	1,5 - 2,0 L/ha (1.05 – 1.40 L/mz) Volumen de caldo: 1000 L/ha (700 L/mz) Momento de aplicación: cuando las malezas poáceas estén en pleno desarrollo y tengan de 2 a 5 hojas verdaderas.	
Melón <i>Cucumis melo</i>		1,0 - 1,5 L/ha (0.70 – 1.05 L/mz) Volumen de caldo: 400 L/ha (280 L/mz) Momento de aplicación: cuando las malezas estén en pleno desarrollo o tengan de 2 a 4 hojas.	
Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i>		1,0 - 1,5 L/ha (0.70 – 1.05 L/mz) Volumen de caldo: 250 L/ha (175 L/mz) Momento de aplicación: cuando las malezas poáceas están en pleno desarrollo o tengan de 2 a 4 hojas, o entre 4 – 6 cm de altura.	
Algodón <i>Gossypium spp.</i>	Liendrepuerco <i>Echinochloa colonum</i> Gramma bermuda <i>Cynodon dactylon</i> Pangola <i>Digitaria adscendens</i> Gramínea corredora <i>Rottboellia exaltata</i> Paja mona <i>Leptochloa filiformis</i> Mozote <i>Cenchrus echinatus</i>	1.25 – 2.0 L/ha (0.90 – 1.40 L/mz) Volumen de caldo: 300 L/ha (210 L/mz) Momento de aplicación: cuando las malezas poáceas están en pleno desarrollo o tengan de 2 a 4 hojas, o entre 4 – 6 cm de altura.	
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Kikuyo <i>Pennisetum clandestinum</i> Pasto de invierno <i>Poa annua</i> Pasto cuaresma <i>Digitaria sanguinalis</i> Caminadora <i>Rottboellia exaltata</i>	1.25 – 2.0 L/ha (0.90 – 1.40 L/mz) Volumen de caldo: 350 L/ha (245 L/mz) Momento de aplicación: cuando las malezas tengan de 1 a 4 hojas (antes del macollaje).	
Ajo <i>Allium sativum</i>	Pangola <i>Digitaria adscendens</i> Caminadora <i>Rottboellia cochinchinensis</i> Pasto cuaresma <i>Digitaria sanguinalis</i> Kikuyo <i>Pennisetum clandestinum</i> Arrocillo <i>Echinochloa colonum</i>	1.25 – 2.0 L/ha (0.90 – 1.40 L/mz) Volumen de caldo: 350 L/ha (245 L/mz) Momento de aplicación: cuando las malezas poáceas están en pleno desarrollo o tengan de 2 a 4 hojas, o entre 4 -6cm de altura.	
Soya <i>Glycine max</i>	Sorgo <i>Sorghum halepense</i> Paja mona <i>Heptochloa filiformis</i> Gramínea corredora <i>Rottboellia exaltata</i> Pata de gallina <i>Eleusine indica</i> Pasto cuaresma <i>Digitaria sanguinalis</i> Cola de zorro <i>Setaria spp.</i>		
Café <i>Coffea arabica</i>	Cola de zorro <i>Setaria geniculata</i> Gramma bermuda <i>Cynodon dactylon</i> Gramma común	1.25 – 2.0 L/ha (0.90 – 1.40 L/mz) Volumen de caldo: 300 L/ha (210 L/mz)	

	<i>Paspalum conjugatum</i> Pata de gallina <i>Eleusine indica</i> Zacate Guínea <i>Panicum maximum</i> Mozote <i>Cenchrus echinatus</i>	Momento de aplicación: cuando las malezas estén en pleno desarrollo o tengan de 2 a 4 hojas.	
Caña de azúcar <i>Saccharum officinarum</i>	Madurador de cultivo	0,30–0,40 L/ha (0,21 – 0,28 L/mz) Volumen de caldo: 300 L/ha (210 L/mz) Momento de aplicación: 4-6 semanas antes de la cosecha.	

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	OBSERVA- CIONES
Ajo <i>Allium sativum</i>	Arrocillo <i>Echinochloa colonum</i> Hierba de conejo <i>Digitaria sanguinalis</i> Cebada cimarrona <i>Rottboellia spp.</i> Caminadora		
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	<i>Rottboellia exaltata</i> Lava frascos <i>Setaria geniculata</i> Pasto Argentina <i>Cynodon dactylon</i> Pata de gallina <i>Eleusine indica</i>	1,25 – 2,0 L/ha (0,90 – 1,40 L/mz) Volumen de caldo: 300 – 350 L/ha (210 – 245 L/mz) Momento de aplicación: cuando las malezas estén en pleno desarrollo o tengan de 2 a 4 hojas.	Se recomienda que exista un grado de humedad suficiente para permitir una buena traslocación del herbicida.
Café <i>Coffea arabica</i>	<i>Panicum maximum</i> Mozote <i>Cenchrus echinatus</i> Zacate Johnson <i>Sorghum halepense</i> Cola de caballo <i>Echinochloa crus-galli</i> Plumilla <i>Leptochloa filiformis</i>		
Soya <i>Glycine max</i>			
Algodón <i>Gossypium hirsutum</i>			

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	OBSERVA- CIONES
Algodón <i>Gossypium spp</i> Soya/soja <i>Glycine max</i> Cebolla <i>Allium cepa</i> Camote <i>Ipomoea batatas</i> Zanahoria <i>Daucus carota</i> Macadamia <i>Macadamia integrifolia</i> Melocotón / Durazno <i>Prunus persica</i> Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Liendre puerco <i>Echinochloa spp.</i> Pasto argentina <i>Cynodon dactylon</i> Guarda rocío <i>Digitaria spp.</i> Kikuyo <i>Pennisetum spp.</i> Pata de gallo <i>Eleusine indica</i> Sorgo alepo <i>Sorghum halepense</i> Paja mona <i>Leptochloa filiformis</i> Caminadora <i>Rottboellia spp.</i> <i>Chloris spp.</i> Lava frascos <i>Setaria spp.</i> Hierba búfalo <i>Cenchrus spp.</i> Paja de burro <i>Panicum spp.</i> Zacate blanco <i>Ixoporus unisetus</i> Gramma común <i>Paspalum spp.</i> Avena loca <i>Avena fatua</i> Brachiria <i>Brachiaria spp.</i>	1,4 L/ha (0,98 L/mz) Volumen de caldo: 200-400 L/ha (140-280 L/mz) Momento de aplicación: cuando las malezas poáceas están en pleno desarrollo o tengan de 2 a 4 hojas, o entre 4 - 6 cm de altura. 1,6-1,8 L/ha (1,1–1,2 L/mz) Volumen de caldo: 1000 L/ha (700 L/mz) Momento de aplicación: Cuando las malezas poáceas estén en pleno desarrollo y tengan de 2 a 5 hojas verdaderas. 1,4 L/ha (0,98 L/mz) Volumen de caldo: 200-400 L/ha (140-280 L/mz) Momento de aplicación: cuando las malezas poáceas están en pleno desarrollo o tengan de 2 a 4 hojas, o entre 4 - 6 cm de altura.	
Piña <i>Ananas comosus</i>			
Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i>			

INTERVALO DE APLICACIÓN: realizar un solo tratamiento.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: El plazo de seguridad es de 21 días para todos los cultivos, excepto para la piña que es de 50 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas después de la aplicación. Si es necesario ingresar antes, debe utilizar equipo de protección personal.

FITOTOXICIDAD: el producto puede resultar fitotóxico si se exceden las dosis recomendadas en los cultivos indicados.

COMPATIBILIDAD: no es compatible con agentes oxidantes.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto, durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación: guantes y botas de hule, mascarilla, sombrero, protector de ojos, pantalón y camisa de manga larga y delantal de material impermeable. No lave la

ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto directo con el producto.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: consérvese bajo llave. Manténgase fuera del alcance de los niños. No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los plaguicidas en contacto con otros agroquímicos fertilizantes, semillas. Almacene bajo llave en un lugar fresco y seco, alejelo del calor o del fuego, es inflamable. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Tiene baja toxicidad sistémica. Si se ingiere gran cantidad las manifestaciones son neurológicas: agitación o estado depresivo, somnolencia, fatiga, incoordinación, convulsiones y coma. También pueden presentarse cólicos intestinales, náuseas, vómito y diarrea. La aspiración, ya sea al vomitar o al ingerir, puede causar inflamación del pulmón (neumonitis química), que se acompaña de tos, disnea, ruidos respiratorios y fiebre. Puede causar ligera irritación ocular y dermal, así como de la mucosa de las vías respiratoria y digestiva.

PRIMEROS AUXILIOS:
EN CASO DE INGESTIÓN: no induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: no tiene antídoto específico. Vigilar los signos vitales. Tratamiento sintomático y de soporte vital. Realizar lavado gástrico, siempre en la primera hora después de la ingestión y hasta que el agua del lavado salga sin olor al tóxico y posteriormente laxante (si no existe diarrea). Mantener hidratación por vía oral o parenteral y corregir alteraciones del equilibrio ácido básico. Tratamiento de apoyo en caso de dificultad respiratoria. Para la terapia anticonvulsiva puede usarse diazepam. Tratamiento sólo por personal médico especializado.

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
Guatemala	Centro de Información y Asistencia Toxicológica	(502) 2251-3560/2232-0735
El Salvador	Hospital Nacional Rosales	(503) 2231-9262
Honduras	Hospital Escuela	(504) 232-6105
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	(505) 2289-4700 ext.1294 cel.8755-0983
Costa Rica	Centro Nacional de Intoxicaciones	(506) 2223-1028
Panamá	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	(507) 523-4948

PROTECCIÓN AL AMBIENTE

TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS
Tóxico para algas y lombrices.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

Es persistente en medio acuoso.

En caso de derrames no caminar por encima del material derramado y tomar medidas para minimizar el efecto en las aguas subterráneas. Utilizar el equipo de protección para recoger el derrame. Contener el líquido con tierra o arena. Diluir el contenido derramado con agua. Recoger el derrame mediante bombeo (emplear una bomba manual o antideflagrante) o con un absorbente adecuado. Si el líquido es demasiado viscoso para bombearlo, recogerlo con pala o cubos y colocarlo en un contenedor hermético. En caso de roturas de envases, absorber con hidrato de cal o sus combinaciones con arena, zeolita, aserrín, o arcilla y desactivarlo posteriormente, previo a su eliminación. Poner los materiales con los que se limpió, en varias fundas plásticas bien selladas y depositarlas en el centro de acopio de desechos peligrosos. Entregar al gestor autorizado para el adecuado destino final.

RESPECTE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVOREZCAN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO. ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:
Los envases donde se ha almacenado este producto no son reutilizables. Aproveche el contenido completo del envase. Cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos. No tirar los residuos por el drenaje. Elimínese los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles y como residuos peligrosos. Los envases vacíos deben ser depositados en el centro de acopio más cercano para su eliminación. Prohibido disponer los remanentes o empaques de este producto en vertederos.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:
ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.U. garantiza el contenido de este producto según su etiqueta, siempre que se encuentre en el envase original con el sello de garantía íntegro. ZELL CHEMIE INTERNACIONAL S.L.U. no asume responsabilidades por el uso de este producto, diferente a lo recomendado en este panfleto.

FORMULADO POR:
NANJING QIAOSHA CHEMICAL Co. Ltd.
Calle de Hongwu N° 359, Apartamentos 719, 720, 725; Distrito de Qinhuai Ciudad de Nanjing. República Popular de China. info@qiaoshachemical.com

IMPORTADOR:
ZELL CHEMIE DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
6A 10A Calle Poniente No.2217 Local L-C Col. Flor Blanca, San Salvador, El Salvador. Tlf. ++34 96 186 21 20 Fax: ++34 96 185 57 43
E-mail: zell@zellchemie.com Web: www.zellchemie.com

ZELL CHEMIE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
San José de la Est. De Ferrocarril al Pacífico, 100m Norte y 25m Este. San José (Costa Rica) Teléfono: 2222 5494. Email: zell@zellchemie.com

ZELL CHEMIE INTERNACIONAL, S.L.U.
C/ General Urrutia, 75 – 1 A. C.P. 46013 Valencia (ESPAÑA).
Tlf: (+34) 96 186 21 20 Fax: (+34) 96 185 57 43 E-mail: zell@zellchemie.com Web: www.zellchemie.com

ZELL CHEMIE GUATEMALA, S.A.
Avenida de la Reforma 8 – 95 Zona 10, Apartamento 202 F Edificio Avenida. Guatemala Teléfono: (+502) 2378 8484. E-mail: zell@zellchemie.com Web: www.zellchemie.com

PAÍS Y NÚMERO DE REGISTRO
COSTA RICA 8702189

