

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS



Arysta LifeScience

ORTHENE ULTRA 97 SG

INSECTICIDA - ORGANOFOSFORADO
ACEPHATE

CUIDADO

ANTÍDOTO: SULFATO DE ATROPINA.

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE
Y/O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,
ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO.

MODO DE ACCIÓN.

Este insecticida es organofosforado a base de Acephate con acción de contacto, estomacal y sistémico.

EQUIPO DE APLICACIÓN.

Se puede aplicar con equipo manual de espalda o con equipo terrestre. Antes de cargar el equipo de aplicación, cerciórese que el mismo se encuentre bien calibrado, en perfecto estado de funcionamiento y sin escapes de caldo.

Este producto se puede aplicar con cualquier equipo de aplicación y no produce corrosión. Para la mezcla, aplicación y lavado del equipo use la ropa de protección completa. El filtro de la mascarilla debe cambiarse a menudo. Evite el contacto directo con el producto. Evite respirar la llovizna de aspersión. Utilice boquilla de cono hueco.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA.

Para la aplicación del producto debe realizarse una premezcla en una cantidad reducida de agua, luego llene el tanque de la aspersora hasta la mitad con agua limpia poniendo el sistema de agitación o recirculación a trabajar, vierta la cantidad requerida de la premezcla preparada del producto y termine de llenar el tanque con agua limpia dando suficiente tiempo para que el producto se disuelva adecuadamente antes de iniciar la aplicación.

El equipo y los utensilios utilizados en la mezcla y la aplicación deben ser lavados con suficiente agua y jabón después de cada jornada de trabajo.



RECOMENDACIONES DE USO.

PAÍS: COSTA RICA.

CULTIVOS	ENFERMEDADES	DOSIS, ÉPOCA DE APLICACIÓN E INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA
TOMATE <i>Lycopersicum esculentum</i>	Áfidos <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Heliothis zea</i> Gusano Bellotero <i>Spodoptera</i> spp Gusano Cogotero <i>Feltia</i> spp Gusano Cortador <i>Manduca quinquemaculata</i> Gusano Cornudo <i>Trichoplusia ni</i> Falso Medidor	Aplique de 0.5 - 1.1 Kg/ha dependiendo del nivel de infestación. Realice las primeras aplicaciones con la aparición de los síntomas de las plagas y prosiga a intervalos de 5 días. Intervalo entre última aplicación y la cosecha: 15 días.
TABACO <i>Nicotiana tabacum</i>	Áfidos <i>Myzus persicae</i> <i>Aphis</i> spp <i>Manduca quinquemaculata</i> <i>Trichoplusia ni</i> Gusano Cornudo <i>Heliothis virescens</i> Falso Medidor <i>Bemisia tabaci</i> Gusano de Yema <i>Prodenia</i> spp Mosca Blanca Gusano Cortador	Use de 0.5 - 1.1 Kg/ha dependiendo del nivel de infestación. Aplique apenas se muestren los primeros síntomas de las plagas y continúe a intervalos de acuerdo a la incidencia de las plagas y del profesional agrónomo. Intervalo entre última aplicación y la cosecha: 15 días.
BRÓCOLI <i>Brassica oleracea italica</i> COL DE BRUSELAS <i>Brassica oleracea</i> var. <i>gemmifera</i>	Ácaros <i>Tetranychus</i> spp Áfidos <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Brevicoryne brassicae</i> <i>Aphis gossypii</i> Gusano <i>Pieris rapae</i> <i>Plutella</i> spp Gusano Cortador <i>Feltia</i> spp <i>Agrotis</i> spp <i>Diabrotica</i> spp <i>Spodoptera</i> spp Vaquitas <i>Manduca quinquemaculata</i> Gusano Cogollero <i>Trichoplusia ni</i> Gusano Cornudo <i>Heliothis zea</i> Falso Medidor Gusano Bellotero	Use de 0.5 - 1.1 Kg/ha dependiendo del nivel de infestación. Realice las primeras aplicaciones con la aparición de los síntomas de las plagas y prosiga a intervalos de 5 días. Intervalo entre última aplicación y la cosecha: 15 días.

INTERVALO DE APLICACIÓN.

Depende de la incidencia de la plaga y el programa de rotación de insecticidas.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA.

Debe esperarse a que el rocío del caldo se seque sobre el follaje antes de reingresar al área tratada. En caso necesario de hacerlo antes deberá usarse el equipo de aplicación completo.

FITOTOXICIDAD.

Orthene Ultra 97 SG no presenta fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD.

Orthene Ultra 97 SG puede ser mezclado en el tanque con la mayoría de químicos agrícolas sin perder su efectividad, sin embargo, no se debe mezclar orthene ultra 97 sg con materiales que contengan cobre o con compuestos muy alcalinos como la cal.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE.

No transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico y pecuarios en general. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor y del fuego. Conserve el producto en su empaque original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases o bolsas sin cerrar.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN.

Nauseas, vómito, dolor de cabeza, vértigo, visión borrosa, salivación excesiva, dificultad para respirar, dolores de garganta, tos, sudoración profusa, descarga nasal y diarrea.

PRIMEROS AUXILIOS.

Ingestión: si el paciente está consciente y no presenta convulsiones, se debe inducir el vómito administrando un vaso de agua caliente con dos cucharadas de sal común, o tocándole con el dedo la garganta. Si es posible consulte a un médico antes de inducir el vómito. Si la persona se encuentra en estado de inconsciencia, no induzca el vómito. Traslade a la persona y el envase del producto al centro médico más cercano.

Inhalación: traslade a la persona del área contaminada y llévela a un lugar limpio y ventilado y manténgala en reposo. En caso necesario suministre respiración artificial, preferiblemente boca a boca y obtenga atención médica inmediata.

Contacto con los ojos: lave los ojos durante 15 minutos con abundante agua limpia. Si usa lentes de contacto remuévalos.

Contacto con la piel: remueva la ropa contaminada y lávela la piel con abundante agua y jabón. Lave la ropa contaminada antes de volverla a usar.

NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO.

Este producto es un inhibidor de la colinesterasa. El antídoto es el Sulfato de Atropina, éste se administra al paciente con inyecciones intravenosas de 2-4 mg cada 5-10 minutos hasta que los signos de atropinización aparezcan.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN.

INSTITUCIÓN	PAÍS	NÚMERO DE TELÉFONO
Centro Nacional de Control de Intoxicaciones	Costa Rica	2223-1028

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE.

Tóxico para ganado.



Tóxico para peces y crustáceos.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS NI ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

Tóxico para abejas. Este producto es tóxico para las abejas expuestas al contacto directo. La aplicación directa debe evitarse cuando las abejas estén activas. No aplique el producto en horas de mayor actividad de las abejas.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y DE REMANENTES.

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue este envase al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recogerlos con aserrín o con material absorbente, y para producto sólido recoger con una pala, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlos en un relleno sanitario autorizado por el ministerio de salud.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS,
PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

AVISO DE GARANTÍA.

Debido a que está fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento, manipuleo y el uso de este producto, nos es imposible asumir responsabilidad por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Nuestra responsabilidad alcanza únicamente a la composición química del producto tal y como se indica en la etiqueta y el uso recomendado en el panfleto, siempre y cuando el envase se encuentre debidamente sellado.

FORMULADOR: ARYSTA LIFESCIENCE CORPORATION.
100 First Street Suite 1610 San Francisco.
California 94105, USA.

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

DAC - DISTRIBUIDORA AGROCOMERCIAL S.A.
Tel: 2494-9800 • Fax: 2249-3733 • Coyoil, Alajuela, Costa Rica.
info@agrodac.com • www.agrodac.com

PAÍS
Costa Rica

NÚMERO DE REGISTRO
4592

FECHA DE REGISTRO
25/10/2000

NÚMERO DE PERMISO DE REEMPAQUE
8