

SCORE® 25 EC

FUNGICIDA - TRIAZOL

DIFENOCONAZOLE

CUIDADO

ANTIDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1,04 - 1,08 g/mL a 20°C

SOLVENTE: Mezcla de hidrocarburos aromáticos

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN

MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

SCORE® 25 EC es un fungicida sistémico - translaminar con acción protectante y curativa contra una amplia gama de enfermedades causadas por hongos ascomicetos, deuteromicetos y basidiomicetos. **SCORE® 25 EC** penetra rápidamente en concentraciones suficientes para controlar infecciones tempranas pero, dada su acción principalmente translaminar, cantidades significativas del producto permanecen por más tiempo dentro de los tejidos de la planta, proporcionando mayor persistencia en el control contra futuras infecciones. **SCORE® 25 EC** es un inhibidor de la biosíntesis del ergosterol en las membranas celulares del hongo.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Aspersor de mochila o equipo accionado por tractor. Antes de utilizar el equipo de aspersión, revise cuidadosamente que esté en buen estado de funcionamiento. Antes de aplicar **SCORE® 25 EC**, calibre con agua el equipo de Aspersión. Para verificar que esté aplicando la dosis correcta. Se recomienda usar boquilla de cono hueco. Para dosificar la cantidad correcta de acuerdo con el tanque de aspersores, debe utilizar un tazón medidor. Después de la aplicación, lave el equipo de aspersión con agua y jabón. Déjelo secar y guárdelo. Utilice el equipo de protección personal antes de usar y manipular **SCORE® 25 EC**.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Póngase el equipo de protección personal antes de usar y manipular **SCORE® 25 EC**. Como con todos los productos químicos, evite en lo posible el contacto con la solución. No comer, beber ni fumar durante el manejo y aplicación de este producto. De acuerdo con la dosis de **SCORE® 25 EC** a utilizar, mézclelo en el tanque con agua limpia hasta la mitad. Seguidamente completa el volumen de agua requerido. Agite para obtener una mezcla homogénea antes de iniciar la aspersión, use la mezcla el mismo día de su preparación.

RECOMENDACIONES DE USO.

USOS AUTORIZADOS EN COSTA RICA:

CULTIVO	ENFERMEDAD QUE CONTROLA	DOSIS
Zanahoria	<u>Daucus carota var. sativa</u>	Alternaria
Cebolla	<u>Allium cepa</u>	Alternaria
Tomate	<u>Lycopersicon esculentum</u>	Tizón temprano
Cítricos	<u>Citrus spp</u>	Colletotrichum
Melón	<u>Cucumis melo L</u>	Mildiu polvoso
Papaya	<u>Carica papaya</u>	Antracnosis

INTERVALOS DE APLICACIÓN.

Zanahoria y Cebolla: Aplicar el producto cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad a un intervalo de 7 días dentro de un programa, alternando con fungicidas de diferente modo de acción.

Tomate: aplicar de manera preventiva cada 7 a 10 días según las condiciones ambientales; usar la dosis alta para cuando se presenten las condiciones más favorables para el desarrollo de la enfermedad.

Cítrico: Aplicar al aparecer los primeros síntomas cada 7 días durante la floración (Flores de tamaño de cabeza de fósforo)

Melón: aplicar a partir de los 20 días después de la siembra, repetir cada 7 días con un máximo de 3 aplicaciones por temporada, alternando con fungicidas de diferente modo de acción.

Papaya: Aplicar al detectar los primeros síntomas de la enfermedad. Realice 3 aplicaciones al Follaje a intervalos de 7 días.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Maní: 22 días, **Tomate, Cebolla:** 7 días, **Chile, Sandía, Pepino, Ejote Francés y Papaya:** 3 días, **Papa, Mango, Aguacate, Frijol y Arveja:** 14 días, **Apio:** 21 días, **Maíz Dulce y Zanahoria:** 15 días, **Arroz:** 45 días, **Cítricos:** 30 días, **Melón:** 4 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

cuando la mezcla se haya secado sobre el follaje del cultivo.

FITOTOXICIDAD:

SCORE® 25 EC No es fito tóxico a los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo con las instrucciones de uso. En caso de duda, se recomienda hacer un ensayo en pequeña escala para observar la fitotoxicidad.

COMPATIBILIDAD:

SCORE® 25 EC En mezcla de tanque es miscible con formulaciones de las mismas características. Se recomienda elaborar una pre-mezcla en pequeña escala para asegurar su compatibilidad con otros productos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Este producto no es inflamable, no es explosivo, no es corrosivo. Almacénalo en bodegas seguras. Alejada del calor, el fuego directo y la humedad. No transportar junto a productos de consumo animal y humano, transpórtelo en envases originales, bien cerrados y debidamente etiquetados con su correspondiente panfleto.

**NO ALMACENAR ESE PRODUCTO EN CASA DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y LA APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN.

Causa irritación a la piel y a los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: si es ingerido, acuda al médico inmediatamente es posible, muestre el envase. Este panfleto o la hoja de seguridad no provocar el vómito. Contiene productos destilados del petróleo y o solventes aromáticos. Si la persona está consciente, dar a beber cuatro cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua.

POR INHALACIÓN: retire al paciente del área contaminada y llévela un lugar fresco y ventilado.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: la veloz con abundante agua durante 15 minutos como mínimo.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lave la parte afectada con abundante agua y jabón.

NUNCA DEBE VER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: no se conoce antídoto específico, administrar carbón medicinal con grandes cantidades de agua. Dar tratamiento sintomático.

CENTRO NACIONALES DE INTOXICACIÓN.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

Centro de Información y asesoría toxicológica.

Karl Heusner Memorial Hospital

Dr. Hurrisa Hailu

Hospital Nacional Rosales.

Hospital escuela.

Centro Nacional de Toxicología.

Centro Nacional para el control de las intoxicaciones.

Centro de Información e Investigación de Medicamentos y tóxicos.

Hospital Dr. Luis Aybar

Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello.

TELÉFONO

1-801-00-29832

2251-3560, 2232-0735

231-548 y 231-639

622-460

2231-9262

232-2322 y 232-2415

2289-4700, ext. 1294, 87550983

2223-1028

523-4948, 523-4968

684-3478, 684-3672

681-2913, 681-6922

PAÍS

GUATEMALA

BELICE

EL SALVADOR

HONDURAS

NICARAGUA

COSTA RICA

PANAMÁ

REPÚBLICA DOMINICANA

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

No contamine con este producto o sus envases desechos o derrames los puntos. Ríos, lagos, charcas, zanjas, canales de drenaje, alcantarillas, etcétera. Evite los derrames del producto por la contaminación que puede provocar a las fuentes de agua. No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre del producto hacia otras áreas.

Manejo de envases, empaques, desechos y remanentes: en el caso de derrames o desechos del producto, recogerlos con aserrín o con material absorbente, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

Aproveche el contenido completo del envase cuando lo vacíe. Lave y enjuague 3 veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada y no utilice los envases vacíos. Perfore los. A fin de evitar remanentes, se sugiere preparar la mezcla a utilizar en el día. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue este al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto.



**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE
PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN RIESGO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

AVISO DE GARANTÍA.

El formulador garantiza el contenido de este envase, siendo apto el producto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso. El buen uso será responsabilidad exclusiva del comprador.

FORMULADOR:

Syngenta S.A.

Carretera a Marmonal Km 6, Cartagena, Colombia

Tel.: 95-668-5475. Fax: 95-668-5458

IMPORTADO POR:

Costa Rica

Syngenta Crop Protection, S.A. – Sucursal Costa Rica

700m este de la intersección del Aeropuerto Juan Santamaría

Calle paralela, Contiguo a Zona Franca Saret

Plaza Aeropuerto, Oficina D1, Alajuela, Costa Rica.

Tel.: 2431-4707. Fax: 2431-4710

PAÍS.

GUATEMALA.

EL SALVADOR.

HONDURAS.

COSTA RICA.

PANAMÁ.

REPÚBLICA DOMINICANA.

NÚMERO DE REGISTRO.

302-246

AG-2003-02-662

334-167-II

870213

5764

2303

FECHA DE REGISTRO.

27-07-12

14-02-08

03-12-13

09-02-09

29-05-12

05-02-08