

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS

INSECTICIDAS INTERNACIONALES S.A.



SHERIFF 16 SL

HERBICIDA – PIRIDINA, FENOXI
PICLORAM, 2,4-D

PRECAUCION

ANTIDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1.060 g/ml a 20 °C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE
Y/O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS
Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION
MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS. PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,
ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONOMICO

MODO DE ACCION:

SHERIFF 16 SL es una mezcla de dos herbicidas, el picloram es un herbicida sistémico absorbido rápidamente por las raíces y hojas y traslocado tanto acropétalo y basipétalo acumulándose en los nuevos brotes, envuelve la alteración de ácidos nucleicos y la síntesis de proteínas las cuales afectan una variedad de enzimas y el 2,4-D: es un herbicida sistémico selectivo que las sales son absorbidas por las raíces y los ésteres por el follaje y se acumula principalmente en las regiones meristemáticas actuando como un inhibidor de crecimiento. Se puede usar en postemergencia temprana a la maleza y al cultivo para un mejor control de las malezas.

EQUIPO DE APLICACION:

Revise que el equipo de aplicación esté en buenas condiciones de uso y calibrado. Se puede aplicar por vía terrestre con bomba de espalda manual a un volumen de hasta 300 l/ha así como aplicación mecánica terrestre con un volumen de 200 a 400 litros de agua por hectárea. Se debe utilizar boquillas de abanico plano.



FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:

Para preparar el caldo final de aplicación llenar el tanque hasta la mitad con agua, agregue la dosis de **SHERIFF 16 SL**, poniendo el sistema de agitación o recirculación a funcionar, termine de llenar con agua limpia, mantenga siempre en agitación o recirculación de la mezcla. El producto no ejerce ninguna acción física ni química sobre el equipo de aplicación.



RECOMENDACIONES DE USO: Costa Rica.

CULTIVO	MALEZAS QUE CONTROLA	DOSIS l/ha
Arroz <u>Oryza sativa</u> Caña de Azúcar <u>Saccharum officinarum</u> Pastos	Viborana <u>Asclepias curassavica</u> , Frijolillo <u>Cassia tora</u> , Camaroncillo <u>Blechnum pyramidatum</u> , Cinquillo <u>Drymaria cordata</u> , Dormilona <u>Mimosa pudica</u> , Bledo <u>Amaranthus sp.</u> , Churristate <u>Ipomoea sp.</u> , Cinco negritos <u>Lantana camara</u> Cornisuelo <u>Acacia cornigera</u> , Churrite <u>Hyptis capitata</u> , Uva cimarrona <u>Ciccus sicyodes</u> , Clavito <u>Ludwigia decurrens</u> , Turte <u>Vernonia patens</u> , Zarza <u>Mimosa pigra</u> .	Aplicar de 2.0 a 8.0 a litros en 200 a 400 litros de agua para aplicaciones terrestres cuando las malezas tengan de 3 a 4 hojas verdaderas. Para especies resistentes asperje una dosis de 4.0 a 8.0 a litros en 200 a 400 litros de agua para aplicaciones terrestres cuando las malezas tengan de 3 a 4 hojas verdaderas.

INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACION Y LA COSECHA:

Se aplica únicamente en los primeros estadios del cultivo. En todo caso no aplique 14 días antes de la cosecha. Debe mantenerse el ganado fuera de las zonas tratadas durante 45 días después de la aplicación del producto. No utilizar el cultivo o rastrojos tratados con el herbicida para el consumo o elaboración de alimento para ganado.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:

Se debe esperar 24 horas antes de ingresar al área tratada o utilizar el equipo de protección personal completo.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico al cultivo siguiendo las recomendaciones del panfleto. Es compatible con otros plaguicidas de uso común en el cultivo.

COMPATIBILIDAD:

Se puede mezclar con la mayoría de agroquímicos de uso común, sin embargo se recomienda realizar una pequeña prueba de compatibilidad.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacene y transporte el producto en lugares frescos secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes y medicinas. Manténgalo en su envase original, cerrado herméticamente y etiquetado. No es inflamable, no es explosivo, resistente a la oxidación y la luz, no es corrosivo.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y
APLICACION DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE DESPUES DE
TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.**



SINTOMAS DE INTOXICACION:

Los síntomas de intoxicación que se presentan son: quemaduras en la boca, esófago y estómago así como irritación de los ojos, nariz y garganta. Cuando se absorbe en grandes cantidades produce vértigo, dolor de cabeza, adormecimiento de las extremidades, dolores musculares, espasmos seguidos de una profunda debilidad muscular.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTION: Provoque el vómito dando a beber jarabe de ipecacuana a una dosis de 30 ml para adultos y 15 ml a niños, seguido de dos vasos de agua o frote la lengua con el dedo o con un objeto no punzante.

INHALACION: Retire el paciente a un lugar ventilado y seco. Afloje las prendas de vestir y vigile la respiración.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave inmediatamente con suficiente agua limpia durante 15 minutos.

CONTACTO CON LA PIEL: Quite las prendas de vestir y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón.

**NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS
EN ESTADO DE INCONSCIENCIA**

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:

No tiene antídoto, seguir tratamiento sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION

INSTITUCION	PAIS	No. TELEFONO
Centro Nacional de Intoxicaciones	COSTA RICA	2223-1028

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE

TOXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS



**NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE
PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS**

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En caso de derrames o desechos de plaguicidas recogerlos con aserrín o con material absorbente y para producto sólido recoger con una pala, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue ese al centro de recolección más cercano o desecho de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE
FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE**

AVISO DE GARANTIA:

La Compañía fabricante y el registrante, así como el distribuidor garantizan el contenido de este envase, siempre que se encuentre en su envase original bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. Sólo garantizamos el contenido inalterable del producto de acuerdo a lo estipulado en la etiqueta y el uso recomendado en el panfleto. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de ello.

FORMULADOR: INSECTICIDAS INTERNACIONALES C.A., Av. Isaías Medina Angarita, Zona Industrial, Carretera Nacional, salida hacia Villa de Cura, Cagua, Edo. Aragua, VENEZUELA. Telf: (0244) 395-9573, Fax: (0244) 395-3878.

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDO POR:

PAIS	NUMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
COSTA RICA	4993	25-06-2003