

INFORMATIONS UTILES POUR LE TRAITEMENT CONTRE L'ONCHOCERCOSE ET LA FILARIOSE LYMPHATIQUE

1) QUI DOIT PRENDRE LES MEDICAMENTS PENDANT LA CAMPAGNE?

Maladie	Médicaments	Cibles
Onchocercose	Mectizan® seul	Toutes personnes vivant dans les communautés affectées par cette maladie sauf les catégories de personnes suivantes: - Les personnes gravement malades ; - Les femmes enceintes ;
Filariose lymphatique	Mectizan® + Albendazole	- Les femmes allaitant des bébés de moins de 8 jours ; - Les enfants de moins de 5 ans et de moins de 90cm ; - la personne qui a bu de l'alcool le jour du traitement ;
Onchocercose + Filariose lymphatique	Mectizan® + Albendazole	- Les personnes qui n'ont jamais pris le Mectizan®

2) COMMENT DONNE-T-ON CES MEDICAMENTS?

Onchocercose		
Médicament	Taille	Dose
	Moins de 90 cm	Ne pas donner de comprimés
Mectizan® 3 mg	Entre 90-119 cm	1 comprimé
	Entre 120-139 cm	2 comprimés
	Entre 140-158 cm	3 comprimés
	Plus de 159 cm	4 comprimés

NB: S'assurer que le patient n'a pas bu d'alcool le jour du traitement

Filariose lymphatique Ou Onchocercose + Filariose lymphatique				
Médicament	Taille	Mectizan®	Dose	
			Albendazole	
	Moins de 90 cm		Ne pas donner de comprimés	
Mectizan® 3 mg + Albendazole 400mg	Entre 90-119 cm	1 comprimé	1 comprimé	
	Entre 120-139 cm	2 comprimés	1 comprimé	
	Entre 140-158 cm	3 comprimés	1 comprimé	
	Plus de 159 cm	4 comprimés	1 comprimé	

NB: S'assurer que le patient n'a pas bu d'alcool le jour du traitement