

Structuri discrete

L. POPOV, dr., lect. univ.

Elemente de combinatorică

(partea a doua)

Binomul lui Newton

Plan

1. Aranjamente cu repetiții
2. Permutări cu repetiții
3. Combinări cu repetiții
4. Proprietăți ale combinărilor
5. Binomul lui Newton
6. Proprietăți ale formulei lui Newton
7. Aplicații ale binomului Newton

Finalități de învățare

La finele studierii temei respective, studentul va fi capabil:

- să aplice în practică aranjamente cu repetiții;
- să aplice în practică permutări cu repetiții;
- să aplice în practică combinări cu repetiții;
- să identifice proprietățile combinărilor;
- să definească Binomul lui Newton;
- să identifice proprietăți ale formulei lui Newton;
- să aplice în practică binomul lui Newton etc.

Combinatorica

Reamintim că *combinatorica* este ramura matematicii care se ocupă în principal de numărarea modurilor în care pot fi alese anumite obiecte, respectând anumite condiții, incluzând următoarele elemente de combinatorică:

A graphic with an orange background and a blue triangle on the right side. It contains the text 'Elemente de combinatorică' in white, and the mathematical expressions P_n , A_n^k , and C_n^k in white at the bottom.

Elemente de
combinatorică

$$P_n$$

$$A_n^k$$

$$C_n^k$$

Elementele de combinatorică

Aranjamente

(se numește *aranjament* de **n** elemente luate câte **k** , orice mulțime ordonată alcătuită din k elemente ale mulțimii **A** .)

Permutări

(se numește *permutare* a mulțimii **A** , oricare mulțime ordonată care se formează cu elementele sale.)

Combinări

(dacă **A** este o mulțime cu **n** elemente, atunci submulțimile lui **A** având **k** elemente, unde **$0 \leq k \leq n$** , se numesc *combinări* de n luate câte k , notate C_n^k)

Formulele principale

$$A_n^k = \frac{n!}{(n - k)!}$$

$$P_n = n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$$

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n - k)!}$$

$$C_n^1 = n$$

$$A_n = P_k \cdot C_n$$

Aranjament

Dacă se dă o mulțime finită **A** cu **n** elemente ($n \in \mathbb{N}^*$), atunci un **aranjament** de **n** elemente luate câte **k** ($k \in \mathbb{N}^*$, $k \leq n$) reprezintă o submulțime ordonată cu **k** elemente ale mulțimii **A**. Numărul acestor aranjamente, numit și *aranjamente de n luate câte k* și notat A_n^k se calculează conform formulei:

$$A_n^k = n(n-1) \cdots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Acesta reprezintă numărul aplicațiilor injective ale unei mulțimi cu **k** elemente într-o mulțime cu **n** elemente.

Aranjamente cu repetiții

Aranjamente cu repetiție de n luate câte k , notat \bar{A}_n^k (unde $k, n \in \mathbb{N}^*$) este numărul aplicațiilor unei mulțimi cu k elemente într-o mulțime cu n elemente. Se poate demonstra că:

$$\bar{A}_n^k = n^k.$$

Acesta reprezintă numărul grupelor ordonate de câte k elemente (distincte sau nu), ce se pot forma cu n elemente.

Triunghiul aranjamentelor

$n = 0$

$n = 1$

$n = 2$

$n = 3$

$n = 4$

$n = 5$

$n = 6$

A_n^k

$$A_n^0 = 1$$

$$A_n^1 = n$$

$$\boxed{A_{n+1}^{k+1} = (n+1)A_n^k}$$

Construcția triunghiului se bazează pe aceste trei formule!

Construirea triunghiului aranjamentelor

Pentru a construi triunghiul se parcurg următorii pași:

1. Se începe cu cei trei de 1 de la vârful triunghiului;
2. Latura stângă a triunghiului se completează cu cifra 1;
3. Pentru a obține elementele de pe linia corespunzătoare lui $n = 2$, înmulțim elementele de pe linia imediat superioară, cu 2;
4. Pentru a obține elementele de pe linia corespunzătoare lui $n = 3$, înmulțim elementele de pe linia imediat superioară, cu 3;
5. Pentru a obține elementele de pe linia corespunzătoare lui $n = 4$, înmulțim elementele de pe linia imediat superioară, cu 4;
6. Pentru a obține elementele de pe linia corespunzătoare lui $n = 5$, înmulțim elementele de pe linia imediat superioară, cu 5;
7. Pentru a obține elementele de pe linia corespunzătoare lui $n = 6$, înmulțim elementele de pe linia imediat superioară, cu 6.

Înmulțirile se fac pe diagonală paralelă cu latura din dreapta!

Construirea triunghiului aranjamentelor

Pașii 1 și 2 au ca suport teoretic, formulele 1 și 2:

1

$$A_n^0 = 1$$

2

$$A_n^1 = n$$

Pașii 3, 4, 5 și 6 au ca suport teoretic, formula 3:

3

$$A_{n+1}^{k+1} = (n+1)A_n^k$$

Construirea triunghiului aranjamentelor

De exemplu să aplicăm formula respectivă:

3

$$A_{n+1}^{k+1} = (n+1)A_n^k$$

$$A_5^2 = 5A_4^1 = 5 \cdot 4 = 20$$

$$A_5^3 = 5A_4^2 = 5 \cdot 12 = 60$$

$$A_5^4 = 5A_4^3 = 5 \cdot 24 = 120$$

Aranjamente cu repetiții

Fie n obiecte diferite, din care alcătuim toate repartizările a câte k obiect: k - repartizări. Într-o repartizare pot fi obiecte de același tip, iar două repartizări se consideră diferite, dacă ele diferă ori prin înseși obiectele, ori prin ordinea lor. Evident, apare problema de a afla numărul total al acestor repartizări.

Vom numi astfel de repartizări *aranjamente cu repetiții* de n elemente luate câte k . Numărul lor îl vom nota \bar{A}_n^k .

Pentru orice $k, n \in \mathbb{N}$, $0 \leq k \leq n$, se poate demonstra că

$$\bar{A}_n^k = n^k.$$

Se demonstrează dacă aplicăm principiul inducției matematice după numărul k de elemente în aranjament, pentru numărul n fixat.

Pentru $k=1$ este clar că fiecare aranjament (cu repetiții) constă numai dintr-un element, și diverse aranjamente se obțin dacă considerăm elemente de tipuri diferite. Însă, deoarece numărul de tipuri este n , rezultă că și numărul aranjamentelor este n . Deci, $\bar{A}_n^1 = n$.

Exemplu. Pe un perete sunt montate 6 suporturi pentru ștergulețe. În fiecare suport se fixează sau un șterguleț galben, sau un șterguleț roșu. În câte moduri pot fi repartizate ștergulețele?

Rezolvare: $\bar{A}_2^6 = 2^6 = 64$.

Exemple

În câte moduri putem aranja numerele formate din trei cifre 1, 2, 3 a câte 2 elemente:

- a) Fără repetiții;
- b) Cu repetiții.

Rezolvare:

Aranjamente fără repetiții: 12, 13, 21, 23, 31, 32 – *fiecare cifră se repetă doar o singură dată.*

Avem 6 moduri sau avem $3!$

Aranjamente cu repetiții: 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 – *fiecare cifră se repetă de două ori.*

Avem 9 moduri sau avem 3^2 moduri.

Exemple

În câte moduri putem forma numere din trei cifre 1, 2, 3 a câte 4 elemente *cu repetiții*?

Rezolvare:

1111, 1112, 1113,

Răspuns: Avem 81 de moduri sau avem 3^4 .

În care caz se obțin mai multe moduri din trei cifre: 1, 2, 3?

În cazul în care grupăm **3 elemente a câte 2** sau în cazul în care grupăm **2 elemente a câte 3**, cu repetiții?

Cu repetiții: 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 – avem 9 moduri

Cu repetiții: 111, 112, 121, 122, 211, 212, 221, 222 – avem 8 moduri

$$3^2 > 2^3$$

Permutări cu repetiții

Aranjamentele cu repetiții formate din n elemente a_1, a_2, \dots, a_n , astfel încât fiecare din aceste elemente este atașat aranjamentului cel puțin o singură dată, se numesc *permutări cu repetiții*. Numărul lor îl vom nota \overline{P}_n . Astfel, $\overline{P}_n = \overline{A}_n^n = n^n$.

Deci, permutare cu repetiții este fiecare dintre șirurile de câte n elemente ale mulțimii $M = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, în care orice element se poate repeta până la n ori. Cu alte cuvinte, permutarea cu repetiții este o aplicație oarecare a mulțimii $E_n = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ în M .

Exemplul 1. Câte numere de trei cifre pot fi formate cu cifrele 1, 2, 3?

Rezolvare. Numărul permutărilor cu repetiții $\overline{P}_3 = 3^3 = 27$. Aceste numere sunt: 123, 132, 213, 231, 321, 312, 111, 112, 113, 121, 131, 211, 311, 222, 221, 223, 122, 322, 212, 232, 333, 331, 332, 133, 233, 313, 323.

Permutări cu și fără repetiții

În câte moduri putem forma numere din trei cifre 1, 2, 3?

Fără repetiții, fiecare cifră se repetă doar o singură dată (cifre distincte (diferite într-un număr)):

123, 132, 213, 231, 312, 321

Am obținut 6 moduri!

Cu repetiții câte avem?

111, 112, 113, 121, 122, 123, 131, 132, 133

211, 212, 213, 221, 222, 223, 231, 232, 233

311, 312, 313, 321, 322, 323, 331, 332, 333

Răspuns: avem 27 de moduri sau avem 3^3 moduri!

Permutările sunt un caz particular al aranjamentelor!

Combinări cu repetiții

Combinarea cu repetiții din n elemente luate câte k este orice grup ce conține k elemente din n , în care orice element se poate repeta. Grupurile se deosebesc cel puțin printr-un element sau prin numărul de repetare a unor elemente.

Numărul tuturor combinațiilor cu repetiții din n elemente luate câte k se notează \overline{C}_n^k și se calculează cu formula:

$$\overline{C}_n^k = C_{n+k-1}^k = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!}.$$

Demonstrația acestei formule se bazează pe faptul că admiterea posibilității repetării elementelor este echivalentă cu mărirea cu $(k-1)$ a numărului de elemente din care este alcătuită combinarea.

\overline{C}_n^k reprezintă și numărul de aplicații nedescrescătoare ale unei mulțimi total ordonate de k elemente în o mulțime total ordonată de n elemente.

Combinări cu repetiții

Exemplu 1. Să se determine numărul de triunghiuri ale căror laturi au lungimile una din valorile 4, 5, 6, 7.

Rezolvare. Avem combinări cu repetiții din 4 elemente luate câte 3. Deci, $\overline{C}_4^3 = C_6^3 = \frac{6!}{3!3!} = 20$.

Exemplu 2. La un oficiu poștal se vând ilustrate de 10 feluri. În câte moduri pot fi cumpărate 12 ilustrate?

Rezolvare. Ordinea în care facem cumpărătura nu contează. De aceea orice set de ilustrate cumpărate reprezintă o combinaire cu repetiții din 10 câte 12.

Astfel, există $\overline{C}_{10}^{12} = C_{21}^{12} = \frac{21!}{12!9!} = 293930$ moduri de a cumpăra 12 ilustrate.

Exemple de combinaări cu repetiții

Avem monede de 5, 10 și 25 bani

Ce sumă putem obține combinând câte 2 monede?

5+10; 5+25; 10+25 – fără repetiții

$$3 = C_3^2 = 3! / (2! \cdot 1!) = 3$$

Cu repetiții în ordinea lexicografică după prima monedă:

5+5; 5+10; 5+25; 10+10; 10+25; 25+25

$$6 = \underline{C_3}^2 = C_{3+2-1}^2 = C_4^2 = 4! / (2! \cdot 2!) = 3 \cdot 4 / (1 \cdot 2) = 6$$

Proprietăți ale combinărilor

1°. Pentru orice $k, n \in \mathbb{N}$, $0 \leq k \leq n$, este adevărată egalitatea:

$$C_n^k = C_n^{n-k}$$

Demonstrație. $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(n-k)!(n-(n-k))!} = C_n^{n-k}.$

Această formulă se numește *formula combinărilor complementare*. Sensul acestei afirmații este următorul. Fie M o mulțime cu n elemente. Fiecărei submulțimi A cu k elemente a lui M îi asociem o submulțime bine determinată, cu $(n-k)$ elemente, a mulțimii M , și anume A^c (complementara submulțimii A în raport cu mulțimea M). Prin această asociere, unei submulțimi cu $(n-k)$ elemente îi corespunde o singură submulțime cu k elemente. Deci, numărul submulțimilor cu k elemente ale lui M este egal cu numărul submulțimilor sale cu $(n-k)$ elemente.

Proprietăți ale combinărilor

2°. Pentru orice $n \in \mathbb{N}$ este adevărată egalitatea:

$$C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n = 2^n.$$

Demonstrație. Suma din partea stângă a egalității reprezintă tocmai numărul tuturor submulțimilor unei mulțimi cu n elemente. Deci, vom demonstra că numărul tuturor submulțimilor unei mulțimi formate din n elemente este egal cu 2^n .

Vom aplica metoda inducției matematice.

1. Afirmația este adevărată pentru $n = 0$, deoarece mulțimea vidă are o submulțime unică, și anume ea însăși.
2. Admitem că afirmația este adevărată pentru $n=k$, adică mulțimea formată din k elemente are 2^k submulțimi și să demonstrăm că mulțimea formată din $(k+1)$ elemente are 2^{k+1} submulțimi.
3. Fie o mulțime A formată din $(k+1)$ elemente: $A = \{a_1, a_2, \dots, a_k, a_{k+1}\}$ și $B = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ o submulțime a acesteia. Din presupunere rezultă că B are 2^k submulțimi. Din fiecare submulțime a lui B se obține o nouă submulțime a lui A prin adăugarea elementului a_{k+1} , deci se obțin încă 2^k submulțimi ale lui A . Prin urmare, în total sunt $2^k + 2^k = 2^{k+1}$ submulțimi ale mulțimii A . Conform principiului inducției matematice, proprietatea a du (2°) este demonstrată.

Proprietăți ale combinărilor

3°. Pentru orice $k, n \in \mathbb{N}$, $0 \leq k \leq n$, este adevărată egalitatea:

$$C_n^k = C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1}.$$

Demonstrație. Aplicând formula pentru C_n^k , obținem:

$$C_{n-1}^k = \frac{(n-1)!}{k!(n-k-1)!} = \frac{(n-1)!(n-k)}{k!(n-k)!},$$

$$C_{n-1}^{k-1} = \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k-1)!} = \frac{(n-1)!k}{k!(n-k)!}.$$

Astfel,

$$C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1} = \frac{(n-1)!(n-k)}{k!(n-k)!} + \frac{(n-1)!k}{k!(n-k)!} = \frac{(n-1)!(n-k+k)}{k!(n-k)!} = \frac{(n-1)!n}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = C_n^k,$$

c.t.d.

Proprietăți ale combinărilor

4°. *Triunghiul numeric sau triunghiul lui Pascal.*

Proprietatea 3° permite de a calcula C_n^k , cunoscând că C_{n-1}^k și C_{n-1}^{k-1} . Cu ajutorul ei pot fi calculate succesiv numerele C_n^k : întâi pentru $n=0$, apoi pentru $n=1$, pentru $n=2$ ș.a.m.d. Scriem valorile numerelor sub forma unui tabel triunghiular, care se numește *triunghiul numeric* sau *triunghiul lui Pascal*.

					1							n=0
				1		1						n=1
			1		2		1					n=2
		1		3		3		1				n=3
	1		4		6		4		1			n=4
1		5		10		10		5		1		n=5

Proprietăți ale combinărilor

4°. *Triunghiul numeric sau triunghiul lui Pascal.*

În linia $(n+1)$ a triunghiului sunt așezate în ordine numerele:

$$C_n^0, C_n^1, C_n^2, \dots, C_n^n.$$

Avem $C_n^0 = 1$, iar celelalte numere se calculează cu ajutorul formulei.

Deoarece numerele C_{n-1}^{k-1} și C_{n-1}^k sunt dispuse în acest tabel în linia precedentă celei în care se găsește C_n^k , la stânga și la dreapta acestuia pentru a obține C_n^k **adunăm numerele din linia precedentă situate la stânga și la dreapta sa.**

De exemplu, numărul **6** din linia a cincea se obține adunând numerele **3** și **3** din linia precedentă.

Proprietăți ale combinațiilor

5°. Pentru orice $m, n \in \mathbb{R}$, $0 \leq m \leq n$

$$C_{n-1}^0 + C_n^1 + C_{n+1}^2 + \dots + C_{n+m-1}^m = C_{n+m}^m.$$

Demonstrație. Considerăm m combinații cu repetiții, alcătuite din $(n+1)$ elemente. Numărul acestor combinații $\bar{C}_{n+1}^m = C_{n+m}^m$. Divizăm toate aceste combinații în clase, atribuind clasei k combinațiile în care elementul a_1 se conține de k ori. Restul $(m-k)$ locuri pot fi ocupate de celelalte elemente a_2, a_3, \dots, a_{n+1} , al căror număr este egal cu n . De aceea, în clasa k se conțin atâtea combinații câte $(m-n)$ combinații cu repetiții pot fi alcătuite din n elemente, adică $C_{n+m-k-1}^{m-k}$.

Prin urmare, numărul total de combinații este egal cu $C_{n+m-1}^m + C_{n+m-1}^{m-1} + C_n^1 + C_{n-1}^0$.

Pe de altă parte, acest număr este egal cu C_{n+m}^m c. t. d.

Proprietăți ale combinărilor

6°. Pentru orice $m, n \in \mathbb{N}$, $m \leq n$,

$$C_n^n + C_{n+1}^n + C_{n+2}^n + \dots + C_{n+m-1}^n = C_{n+m}^{n+1}.$$

Demonstrație. Substituind în 5° n cu $n+1$ și m cu $m-1$, în baza proprietății 1°, obținem proprietatea 6°.

Să examinăm câteva cazuri particulare ale proprietății 6° pentru $n = 1, 2, 3$.

Pentru $n = 1$, obținem:

$$1 + 2 + \dots + m = m(m+1)/2. \quad (1)$$

Pentru $n = 2$, obținem:

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \dots + m \cdot (m+1) = m(m+1)(m+2)/3. \quad (2)$$

Pentru $n = 3$, obținem:

$$1 \cdot 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 \cdot 4 + \dots + m \cdot (m+1) \cdot (m+2) = m(m+1)(m+2)(m+3)/4. \quad (3)$$

Cu ajutorul formulelor (2) – (3) vom deduce formule pentru calcularea în mod rațional a sumei pătratelor și a sumei cuburilor numerelor naturale de la 1 la m .

Scriem formula (2) sub forma:

$$1^2 + 2^2 + \dots + m^2 + 1 + 2 + \dots + m = m(m+1)(m+2)/3.$$

Deoarece, $1 + 2 + \dots + m = m(m+1)/2$ obținem:

$$1^2 + 2^2 + \dots + m^2 = m(m+1)(m+2)/3 - m(m+1)/2 = m(m+1)(2m+1)/6.$$

În mod analog din (3) deducem:

$$1^3 + 2^3 + \dots + m^3 = m^2(m+1)^2/4.$$

Proprietăți ale combinărilor

7°. Pentru $m, n \in \mathbb{N}$:

$$C_n^1 C_{m-1}^0 + C_n^2 C_{m-1}^1 + \dots + C_n^n C_{m-1}^{n-1} = C_{m+n-1}^m.$$

8°. Pentru orice $m, n \in \mathbb{N}$:

$$C_n^{n-1} C_{m-1}^0 + C_n^{n-2} C_{m-1}^1 + \dots + C_n^0 C_{m-1}^{n-1} = C_{m+n-1}^{n-1}.$$

9°. Pentru orice $n \in \mathbb{N}$,

$$C_n^0 - C_n^1 + C_n^2 - \dots + (-1)^n C_n^n = 0.$$

10°. Pentru orice $m, n \in \mathbb{N}$, $0 \leq m \leq n$,

$$C_n^0 C_n^m - C_n^1 C_{n-1}^{m-1} + C_n^2 C_{n-2}^{m-2} + \dots + (-1)^n C_n^n C_{n-m}^0 = 0.$$

11°. Pentru orice $m, n \in \mathbb{N}$, $m \geq n$,

$$C_n^0 C_{n+m-1}^m - C_n^1 C_{n+m-2}^{m-1} + C_n^2 C_{n+m-3}^{m-2} + \dots + (-1)^n C_n^n C_{m-1}^{m-n} = 0.$$

12°. Pentru orice $m, n \in \mathbb{N}$, $m < n$,

$$C_n^0 C_{n+m-1}^m - C_n^1 C_{n+m-2}^{m-1} + \dots + (-1)^n C_n^n C_{n-1}^0 = 0.$$

Binomul lui Newton


$$(a+b)^1 = a+b,$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2,$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3,$$

$$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4,$$

$$(a+b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5.$$



Constatăm: coeficienții din partea dreaptă ai acestor formule sunt numerele din linia corespunzătoare a triunghiului lui *Pascal*.

Observăm că coeficienții prezintă o simetrie perfectă!

Binomul lui Newton

Pentru orice număr natural nenul n este adevărată formula:

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + C_n^2 a^{n-2} b^2 + \dots + C_n^m a^{n-m} b^m + \dots + C_n^n b^n,$$

care se numește ***binomul lui Newton*** sau ***formula lui Newton***.

Partea dreaptă al egalității se numește ***dezvoltarea binomului la putere***.

Se demonstrează aplicând metoda inducției matematice.

Binomul lui Newton

$$P(n) = (a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1}b + C_n^2 a^{n-2}b^2 + \dots + C_n^m a^{n-m}b^m + \dots + C_n^n b^n,$$

1. Pentru $n=1$, $P(1)$ este adevărată, deoarece

$$(a+b)^1 = a+b = C_1^0 a + C_1^1 b.$$

2. Presupunem că pentru orice număr natural $n=k$, $k>1$: este adevărată $P(k)$, adică:

$$P(k) = (a+b)^k = C_k^0 a^k + C_k^1 a^{k-1}b + C_k^2 a^{k-2}b^2 + \dots + C_k^m a^{k-m}b^m + \dots + C_k^k b^k.$$

3. Să demonstrăm că este adevărată egalitatea $P(k+1)$.

Binomul lui Newton

Într-adevăr,

$$\begin{aligned}(a+b)^{k+1} &= (a+b)^k \cdot (a+b) = (C_k^0 a^k + C_k^1 a^{k-1} b + \dots + C_k^m a^{k-m} b^m + \dots + \\ &C_k^k b^k)(a+b) = (C_k^0 a^{k+1} + C_k^1 a^k b + \dots + C_k^{m+1} a^{k-m} b^{m+1} + \dots + C_k^k a b^k + \\ &C_k^0 a^k b + C_k^1 a^{k-1} b^2 + \dots + C_k^m a^{k-m} b^{m+1} + \dots + C_k^k b^{k+1}) = (C_k^0 a^{k+1} + \\ &(C_k^0 + C_k^1) a^k b + \dots + (C_k^m + C_k^{m+1}) a^{k-m} b^{m+1} + \dots + (C_k^{k-1} + C_k^k) a b^k + C_k^k b^{k+1}).\end{aligned}$$

Deoarece $C_k^0 = 1 = C_{k+1}^0$, $C_k^0 + C_k^1 = C_{k+1}^1, \dots, C_k^m + C_k^{m+1} = C_{k+1}^{m+1}, \dots, C_k^{k-1} + C_k^k = C_{k+1}^k$, $C_k^k = 1 = C_{k+1}^{k+1}$, obținem:

$$(a+b)^{k+1} = C_{k+1}^0 a^{k+1} + C_{k+1}^1 a^k b + \dots + C_{k+1}^{m+1} a^{k-m} b^{m+1} + \dots + C_{k+1}^{k+1} b^{k+1}.$$

Prin urmare, în baza principiului inducției matematice, egalitatea $P(n)$ este adevărată pentru orice număr natural $n \geq 1$.

Binomul lui Newton

Exemplu. Să se calculeze $(a+b)^5$ utilizând formula lui Newton

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + C_n^2 a^{n-2} b^2 + \dots + C_n^m a^{n-m} b^m + \dots + C_n^n b^n$$

Rezolvare:

$$(a+b)^5 = C_5^0 a^5 + C_5^1 a^4 b + C_5^2 a^3 b^2 + C_5^3 a^2 b^2 + C_5^4 a b^4 + C_5^5 b^5.$$

Cunoscând că:

$$C_5^0 = 1, \quad C_5^1 = 5, \quad C_5^2 = (5 \cdot 4) / (2 \cdot 1) = 10,$$

$$C_5^3 = C_5^2 = 10, \quad C_5^4 = C_5^1 = 5, \quad C_5^5 = 1,$$

obținem:

$$(a+b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^2 + 5ab^4 + b^5$$

Binomul lui Newton

Coeficienții $C_n^0, C_n^1, C_n^2, \dots, C_n^n$ din formula lui Newton se numesc *coeficienți binomiali*; ei sunt în număr de $n+1$. Formula lui Newton poate fi scrisă astfel:

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + C_n^2 a^{n-2} b^2 + \dots + C_n^{n-1} a b^{n-1} + C_n^n b^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k;$$

$$(a-b)^n = C_n^0 a^n - C_n^1 a^{n-1} b + C_n^2 a^{n-2} b^2 - \dots + (-1)^{n-1} C_n^{n-1} a b^{n-1} + (-1)^n C_n^n b^n = \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k a^{n-k} b^k.$$

Proprietăți ale formulei lui Newton

1°. În dezvoltarea binomului la putere sunt $n+1$ termeni (numărul termenilor este egal cu numărul coeficienților binomiali $C_n^0, C_n^1, C_n^2, \dots, C_n^n$).

2°. În formula lui Newton, exponenții puterilor lui a descresc de la n la 0 , iar exponenții puterilor lui b cresc de la 0 la n . Suma exponenților puterilor lui a și b în orice termen al dezvoltării este n .

3°. Coeficienții binomiali egal depărtați de termenii extremi ai dezvoltării sunt egali între ei, deoarece $C_n^k = C_n^{n-k}$.

Într-adevăr: $C_n^0 = C_n^n = 1, C_n^1 = C_n^{n-1}, C_n^2 = C_n^{n-2}$, etc.

4°. Dacă n este număr par (adică $n=2k$), atunci coeficientul binomial al termenului de mijloc al dezvoltării (adică C_n^k) este cel mai mare. Dacă n este impar (adică $n=2k+1$), atunci coeficienții binomiali ai celor doi termeni de mijloc sunt egali între ei (adică $C_n^k = C_n^{k+1}$) și sunt cei mai mari.

Proprietăți ale formulei lui Newton

5°. Termenul $C_n^k a^{n-k} b^k$, adică al $(k+1)$ -lea termen, se numește *termenul de rang k* și se notează cu T_k .

Deci, $T_k = C_n^k a^{n-k} b^k, k \in \{0, 1, \dots, n\}$.

Termenul T_k se mai numește *termenul general al dezvoltării*.

Atribuind lui k valori de la 0 la n , determinăm toți termenii dezvoltării. De exemplu:

$T_1 = C_n^0 a^n b^0 = C_n^0 a^n$ este primul termen,

$T_2 = C_n^1 a^{n-1} b$ este termenul al doilea etc.

Se poate stabili și o relație de recurență între termenii consecutivi ai dezvoltării.

Deoarece $C_n^{k+1} = (n-k)/(k+1) \cdot C_n^k$ rezultă că:

$$T_{k+1} = C_n^{k+1} a^{n-k-1} b^{k+1} = (n-k)/(k+1) \cdot C_n^k a^{n-k} b^k b/a = (n-k)/(k+1) b/a \cdot T_k$$

Am obținut următoarele: $T_{k+1} = (n-k)/(k+1) b/a \cdot T_k$.

Proprietăți ale formulei lui Newton

Observație. Să se facă distincție între coeficientul unui termen al dezvoltării binomului la putere și coeficientul binomial al aceluiași termen.

De exemplu, în dezvoltarea $(a+2)^5 = a^5 + 10a^4 + 40a^3 + 80a^2 + 80a + 32$ coeficientul celui de-al treilea termen al dezvoltării este 40, iar coeficientul său binomial este $C_5^2 = 10$.

6°. Suma coeficienților binomiali în dezvoltarea binomului la putere este 2^n . Într-adevăr, punând în formula lui Newton $a=b=1$, obținem $C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n = 2^n$.

7°. Suma coeficienților binomiali ai termenilor de rang impar este egală cu suma coeficienților binomiali ai termenilor de rang par. Într-adevăr, înlocuind în formula lui Newton $a = 1$, $b = -1$, obținem următoarele:

$$C_n^0 - C_n^1 + C_n^2 - \dots + (-1)^n C_n^n = 0, \text{ de aici } C_n^0 + C_n^2 + C_n^4 + \dots = C_n^1 + C_n^3 + C_n^5 + \dots$$

Aplicații ale binomului Newton

1. Să se determine termenul din dezvoltarea binomului $(x+1/x^4)^{10}$ care nu îl conține pe x (adică termenul care îl conține pe x la puterea zero).

Rezolvare. În conformitate cu formula termenului general al dezvoltării,

$$T_k = C_{10}^k x^{10-k} \cdot (1/x^4)^k = C_{10}^k x^{10-k} \cdot x^{-4k} = C_{10}^k x^{10-5k}.$$

Conform condiției, $10-5k = 0$, de unde $k = 2$. Astfel, termenul cerut al dezvoltării este:

$$T_2 = C_{10}^2 x^8 : x^8 = C_{10}^2 = 45.$$

Aplicații ale binomului Newton

2. Să se determine termenul de rangul 7 din dezvoltarea la putere a binomului $(y^{1/2}+x^{1/2})^n$, dacă coeficientul binomial al termenului al treilea este 45.

Rezolvare. Întâi vom calcula exponentul n al puterii binomului. Cum $C_n^2 = 45$, obținem:

$$n(n-1)/2 = 45 \Leftrightarrow C_n^2 = 45, n^2-n-90 = 0,$$

de unde $n_1=10$, $n_2=-9$.

Deci, exponentul puterii binomului $n=10$.

Astfel, $T_7 = C_{10}^6(y^{1/2})^4(x^{1/2})^6 = C_{10}^4y^2x^3$.

Aplicații ale binomului Newton

3. Să se calculeze termenul rațional din dezvoltarea binomului $(\sqrt[3]{3} + \sqrt{2})^5$.

Rezolvare. Termenul general al dezvoltării
 $T_k = C_5^k (\sqrt[3]{3})^{5-k} (\sqrt{2})^k = C_5^k \cdot 3^{(5-k)/3} \cdot 2^{k/2}$.

Expresia $3^{(5-k)/3} \cdot 2^{k/2}$ va fi rațională, dacă $(5-k)/3$ și $k/2$ vor fi numere întregi.

Este evident că numărul k trebuie să fie par și mai mic decât 5.

Această restricție o verifică numai $k = 2$.

Astfel, în dezvoltarea binomului este numai un singur termen rațional $T_2 = C_5^2 \cdot 3 \cdot 2 = 6 \cdot 5 \cdot 4 / 2 = 60$.

Exemple

Binomul lui
Newton

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n b^0 + C_n^1 a^{n-1} b^1 + \dots + C_n^n$$

$$T_{k+1} = C_n^k a^{n-k} b^k$$

Formula
termenului
general

1. Să se calculeze binomul:

$(x^2+1)^{22}$; remarcăm faptul că $a=x^2$ și $b=1$, $n=22$

De exemplu, ne interesează, pentru acest binom, termenul al 12-lea al dezvoltării, pentru aceasta scriem următoarele:

$$T_{12} = C_{22}^{11} (x^2)^{22-11} \cdot 1^{11} = C_{22}^{11} (x^2)^{11} = C_{22}^{11} x^{22}$$

Exemple

Binomul lui
Newton

$$(a + b)^n = C_n^0 a^n b^0 + C_n^1 a^{n-1} b^1 + \dots + C_n^n$$

$$T_{k+1} = C_n^k a^{n-k} b^k$$

Formula
termenului
general

2. Să se calculeze binomul:

$(2ab^2 - 1)^{20} = (2ab^2 + (-1))^{20}$; remarcăm că $a = 2ab^2$;
 $b = -1$; $n = 20$. Calculați $T_{10} = ?$

$$T_{10} = C_{20}^9 (2ab^2)^{20-9} \cdot (-1)^9 = - C_{20}^9 (2ab^2)^{11} = - C_{20}^{11} 2^{11} \cdot a^{11} \cdot b^{22}$$

Exemple

Binomul lui
Newton

$$(a + b)^n = C_n^0 a^n b^0 + C_n^1 a^{n-1} b^1 + \dots + C_n^n$$

$$T_{k+1} = C_n^k a^{n-k} b^k$$

Formula
termenului
general

3. Să se calculeze binomul:

$$(\sqrt{3} + \sqrt{2})^{10}$$

$T_7 = ?$

MULTUMIM PENTRU ATENȚIE!