Поиск в Libre Office

① Обозначим x/y и &n поразрядную конъюнкцию неотриц. целых чисел x и n.
Для какого min неотриц. целого числа A формула:

$$\neg(((x\,\&\,42 \neq 0) \wedge (x\,\&\,35 = 0)) \wedge (x\,\&\,A = 0))$$

тождественно истина

Например: $14\,\&\,5 = 1110_2\,\&\,0101_2 = 0100_2 = 4$

Решение:

Функция all возвращ. знач. True для выражения, иначе False

```
1 print(#15)
2 FOR A in range(77):
3     B=TRUE
4     FOR X in range(77):
5         if not(((X&42!=0) and (X&35==0)) and (X&A==0):
6             B= False
7     if B:
8         print(A)
9         break
```

Ответ: 8

② Демо 2024
Для какого min целого неотриц-го числа A выражение

$$(x+2y < A) \vee (y > x) \vee (x > 60)$$

тождественно истинно, т.е. принимает знач. 1 при любых неотриц. x и y.

Решение:

```
for a in range(1000):
    if all((x+2*y<a) or (y>x) or (x>60) for x in
    range(1000) for y in range(1000)):
        print(a)
        break
```

Ответ: 181

③ Дано: P=[10,29] Найти: max A диапазон. $(x \in A) \to (x \in P) \vee (x \in Q)$ истино
Q=[13,18]

Решение:

```
P=[int(i) for i in range(10,30)]
Q=[int(i) for i in range(13,19)]
a=[int(i) for i in range(10,30)]
for x in range(1,100):
    if not(((x in a)<=(x in P)) or (x in Q)):
        a.remove(x) #находит значение x и удаляет его
print(len(a)-1)
```

④ Обозначим ч/з $ДЕЛ(n,m)$ утверждение «нат. число n делится без остатка на нат. число m». Для какого max нат. числа A формула

$$(ДЕЛ(x,36) \wedge ДЕЛ(x,42)) \to ДЕЛ(x,A) \wedge (A\cdot(A-25) < 25\cdot(A+200))$$

тождеств. истина.

Решение:

```
def f(x,a):
    return (((x%36==0) and (x%42==0))<=(x%a==0))
            and (a*(a-25)<25*(a+200))
for a in range(1,1001):
    fl=True
    for x in range(1,1001):
        if not(f(x,a)):
            fl=False
            break
    if fl:
        print(a)
```

Ответ 84

⑤ Обозначим ч/з $ДЕЛ(n,m)$ утверждение «нат. число n делится без остатка на нат. m». Для какого max A

$$(\neg ДЕЛ(x,A) \wedge ДЕЛ(x,21)) \to \neg ДЕЛ(x,14)$$

тождественно истина

Решение:

```
def f(x,a):
    return (x%A!=0)and(x%21==0))<=not(x%14==0)
for a in range(1,1001):
    fl=True
    for x in range(1,1001):
        if not(f(x,a)):
            fl=False
            break
if fl:
    print(a)
```

Ответ 32 – ?

⑥ Введем вопрос. М&К обозначают поразрядную конъюнкцию М и К. Определите то и нат. число А, такое что

$$(x\,\&\,13=0) \to ((x\,\&\,40\neq 0) \to (x\,\&\,A \neq 0))$$

тождественно истинно.

Поиск в Libre Office

Решение:

```
def f(x, y, a):
    return (x%13==0)<=((x%40!=0)<=(x%a!=0))
for a in range(1, 1001):
    fl=True
    for x in range(1, 1001):
        if not(f(x, a)):
            fl=False
            break
    if fl:
        print(a)
        break
```

Ответ 32

(7) Для какого min A выражение истинно

$((x-30<A) \wedge (15-y<A)) \vee (x\cdot(y+3)>60)$

Решение:

```
def f(x,y,a):
    return((x-30<a)and((15-y)<a)or(x*(y+3)>60)
for a in range(1,1001):
    fl=True
    for x in range(1,1001):
        for y in range(1,1001):
            if not(f(x,y,a)):
                fl=False
                break
        if fl==False:
            break
    if fl:
        print(a)
        break
```

Ответ 15

(8) $Del(A,9) \wedge (PE \wedge (280,x) \rightarrow (\neg DE \wedge (A,x) \rightarrow \neg PE \wedge (730,x)))$ истинно

Решение:

```
def f(x,a):
    return(a%9==0)and((280%x==0)<=((a%x!=0)<=
        (730%x!=0)))
k=0
for a in range(1,1001):
    fl=True
    for x in range(1,1001):
        if not(f(x,a)):
            fl=False
            break
    if fl:
        k+=1
print(k)
```

Ответ 11

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

(9) Демо 2023

Обозначим через **ДЕЛ(*n*, *m*)** утверждение «натуральное число *n* делится без остатка на натуральное число *m*».

Для какого наибольшего натурального числа *A* формула

ДЕЛ(120, *A*) ∧ (¬ДЕЛ(*x*, *A*) → (ДЕЛ(*x*, 18) → ¬ДЕЛ(*x*, 24)))

тождественно истинна (то есть принимает значение 1 при любом натуральном значении переменной *x*)?

Решение. Рассмотрим такие *x*, при которых скобка (ДЕЛ(*x*, 18) → ¬ДЕЛ(*x*, 24)) будет ложной. Это *x*, которые одновременно делятся без остатка на 18 и на 24. Наименьшее общее кратное этих чисел равно 72.

Следовательно, для x = 72 выражение ¬ДЕЛ(*x*, A) должно быть ложным, то есть число 72 должно делиться на *A*, также на *A* должно делиться число 120. Наибольшим таким *A* является число 24. Это и будет ответ.

Ответ: 24.

Приведём другое решение на языке Python.

```
for A in range(100, 0, -1):
    k = 0
    for x in range(1, 1000):
        if (120 % A == 0) and ((x % A != 0) <= ((x % 18 == 0) <= (x % 24 != 0))):
            k += 1
    if k == 999:
        print(A)
        break
```

Ответ: 24

(10) Какое кол-во нат. чисел удв. условию

$\neg(x^2 \geq 9) \vee \neg((x < 7) \vee (x \geq 10))$

Решение (1) Питон

```
for x in range(1,1000):
    if not(x**2 >= 9) or not((x < 7) or (x >= 10)):
        k = k + 1
print(k)
```

ответ 5

(10) Решение (2) $\neg(x^2 \geq 9) \vee \neg((x < 7) \vee (x \geq 10))$

$x^2 < 9 \vee \neg((x < 7) \vee (x \geq 10))$

↓ Формула де Моргана

$\neg(A \vee B) = \neg A \wedge \neg B$

$\neg(A \wedge B) = \neg A \vee \neg B$

$x^2 < 9 \vee \neg(x < 7) \wedge \neg(x \geq 10)$

$x^2 < 9 \vee (x \geq 7) \wedge (x < 10) \Rightarrow x = 7, 8, 9$

⇓

$x = 1, 2$ $\quad x = 1, 2$ и $x = 7, 8, 9$ всего 5 чисел

Ответ 5

Поиск в Libre Office Калькулятор

(11) Обозначим т/з m&n поразрядную конъюнкцию натуральных целых чисел m и n. Так, напр 14&5 = 1110₂ & 0101₂ = 0100₂ = 4.
Для какого max целого положительного числа A верна

$$(x\,\&\,A=0)\vee\neg(x\,\&\,37=0)\vee\neg(x\,\&\,12=0)$$

тождественно истинно, т.е. принимает знач. 1 при любых целых неотрицат. x

Решение:

```
for A in range(1,1001):
    y=TRUE
    for x in range(1,1000):
        R=(x&A==0) or (x&37!=0) or (x&12!=0)
        if R==0:
            y=False
            break
    if y==TRUE:
        print(A)
```

Ответ: 245

(12) Обозначим т/з DEL(n,m) утверждение "натур. число n делится без остатка на натур. m"
Для какого max натур. числа A ложно верно

$$\neg DEL(x,A)\to(DEL(x,28)\to\neg DEL(x,49))$$

истинно (т.е. прин. 1) при любом x?

Решение:

```
for A in range(1,1000):
    y=TRUE
    for x in range(1,500):
        R=(x%A!=0)<=((x%28==0)<=(x%49!=0))
        if R==0:
            y=False
            break
    if y==TRUE
        print(A)
```

Ответ: 196

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

(13) Функция через НОД (n, m) утверждение "наибольший делитель чисел n и m равен k. Сколько существует натуральных знач. A на отрезке [1; 1000] для которых формула

$$НОД(A, 420, 2) \vee (\neg НОД(A, x, 12) \Rightarrow \neg НОД(110, x, 11))$$

тождественно истина (т.е. принимает знач. 1 при любом наборе значений переменной x)

Решение:

```
def nod(n, m, k):
    while n!=m:
        if n>m:
            n-=m
        else:
            m-=n
    return m==k

c=0
for A in range(1,1001):
    1=TRUE
    for x in range(1,500):
        R = nod(A, 420, 2) or ((not nod(A, x, 12))<=(not nod(
                                                    11)))
        if R==0:
            1=false
            break
    if 1==True:
        c+=1
print(c)
```

(14) Функции

На числовой прямой даны два отрезка P=[0,22] и Q=[30,36]. Укажите наименьшую возм. длину отрезка A, при кот

$$(X \in P) \Rightarrow (\neg(X \in Q) \vee (X \in A))$$

тождеств истинно

Решение:

```
p = list(range(0, 22+1))
q = list(range(30, 36+1))
a = []
for x in range(1, 10000):
    if ((x in p)<=((x not in q) or (x in a))):
                                        False:
        a.append(x)

print(a)
```

08.06.24 (б.1)

Для какого наименьшего натурального числа A логическое выражение истинно при любом целом положительном значении переменной x.

$$(\text{ДЕЛ}(x, 2) \to \overline{\text{ДЕЛ}(x, 5)}) \vee (x + A >= 70)$$

ответ 60

решение:

```
for A in range(1, 1000):
    flag = 1
    for x in range(1, 10000):
        F = ((x%2 == 0) <= (x%5 != 0)) or (x+A >= 70)
        if not F:
            flag = 0
            break
    if flag == 1:
        print(A)
        break
```

08.06.24 (б.2)

Для какого наибольшего натурального числа Логическое выражение истинно при любом целом положительном значении переменной x, если B = [70, 90].

$$\text{ДЕЛ}(x, A) \vee ((x \in B) \to \overline{\text{ДЕЛ}(x, 27)})$$

ответ 81

решение:

```
B = list(range(70, 90+1))
for A in range(1, 1000):
    flag = 1
    for x in range(1, 10000):
        F = (x%A == 0) or ((x in B) <= (not(x%27 == 0)))
        if not F:
            flag = 0
            break
    if flag == 1:
        print(A)
```

08.06.24 (б.3)

Для какого наибольшего натурального числа Логическое выражение истинно при любом целом положительном значении переменной x, если B = [70, 90].

$$\text{ДЕЛ}(x, A) \vee ((x \in B) \to \overline{\text{ДЕЛ}(x, 22)})$$

ответ: 88

Решение:

```
B = list(range(70, 90+1))
for A in range(1, 1000):
    flag = 1
    for x in range(1, 10000):
        F = (x%A == 0) or ((x in B) <= (not(x%22 == 0)))
        if not F:
            flag = 0
            break
    if flag == 1:
        print(A)
```

Демо 2025 (сделать)

На числовой прямой даны два отрезка: P = [15; 40] и Q = [21; 63]. Укажите наименьшую возможную длину такого отрезка A, для которого логическое выражение

$$(x \in P) \to (((x \in Q) \wedge \neg(x \in A)) \to \neg(x \in P))$$

ответ: 19

истинно (т.е. принимает значение 1) при любом значении переменной x.

решение ↓

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
F1

Решение:


1) перепишем выражение избавившись от $\rightarrow$

$P \rightarrow ((Q \wedge \bar{A}) \rightarrow \bar{P}) = \bar{P} \vee (Q \wedge \bar{A}) \vee \bar{P} =$

$= \bar{P} \vee \bar{Q} \vee A = 1$

$A \rightarrow B = \bar{A} \vee B$

$\overline{A \wedge B} = \bar{A} \vee \bar{B}$



$A = 40 - 21 = 19$