



Лекция 4

Произведения ПЛФ

Содержание лекции:

В лекции рассматривается операция произведения двух ПЛФ и ее алгебраические свойства, вводится определение новой структуры - внешней алгебры ПЛФ. Широкое практическое приложения имеет алгебра антисимметричных форм, однако введенная операция произведения ПЛФ не сохраняет антисимметричность результата. В связи с этим вводится операция внешнего произведения антисимметричных форм, которая индуцирует новую алгебраическую структуру - алгебру Грассмана.

Ключевые слова:

Произведение ПЛФ, свойства произведения ПЛФ, внешняя алгебра форм, внешнее произведение антисимметричных ПЛФ, свойства внешнего произведения, алгебра антисимметричных форм, алгебра Грассмана.

Авторы курса:

Трифанов А. И.

Москаленко М. А.

Ссылка на ресурсы:

mathdep.ifmo.ru/geolin

4.1 Произведение ПЛФ

Пусть $U \in \Omega_{q_1}^{p_1}(\mathbb{K})$ и $V \in \Omega_{q_2}^{p_2}(\mathbb{K})$. Отображение $W = U \cdot V$ называется **произведением** ПЛФ U на ПЛФ V , если

$$W(x_1, x_2, \dots, x_{p_1}, x_{p_1+1}, \dots, x_{p_1+p_2}; y^1, y^2, \dots, y^{q_1}, y^{q_1+1}, \dots, y^{q_1+q_2}) = \\ U(x_1, x_2, \dots, x_{p_1}; y^1, y^2, \dots, y^{q_1}) \cdot V(x_1, x_2, \dots, x_{p_2}; y^1, y^2, \dots, y^{q_2})$$

Лемма 4.1. Отображение W - ПЛФ, причем $W \in \Omega_{q_1+q_2}^{p_1+p_2}(\mathbb{K})$.



Очевидно. ◀

Свойства произведения ПЛФ

1. Некоммутативность: $U \cdot V \neq V \cdot U$:

$$W_1(x_1, x_2) = (f^1 \cdot f^2)(x_1, x_2) = f^1(x_1)f^2(x_2), \\ W_2(x_1, x_2) = (f^2 \cdot f^1)(x_1, x_2) = f^2(x_1)f^1(x_2).$$

2. Ассоциативность: $U \cdot (V \cdot W) = (U \cdot V) \cdot W = U \cdot V \cdot W$;

3. Дистрибутивность по сумме: $U \cdot (V + W) = U \cdot V + U \cdot W$;

4. Нуль-форма: $U \cdot \Theta_{\Omega_{q_2}^{p_2}} = \Theta_{\Omega_{q_1}^{p_1}} \cdot V = \Theta_{\Omega_{q_1+q_2}^{p_1+p_2}}$;

5. Дистрибутивность по произведению: $(\alpha \cdot U) \cdot V = U \cdot (\alpha \cdot V)$;

6. Пусть $U \in \Omega_0^p$, тогда набор

$$^{s_1, s_2, \dots, s_p} W = f^{s_1} \cdot f^{s_2} \cdot \dots \cdot f^{s_p},$$

образует базис в Ω_0^p , если $\{f^k\}_{k=1}^n$ образует базис в X^* .



Для произвольного набора векторов $\{x_i\}_{i=1}^p$ имеем:

$$^{s_1, s_2, \dots, s_p} W(x_1, x_2, \dots, x_p) = \xi_1^{s_1} \xi_2^{s_2} \dots \xi_p^{s_p} = \\ f^{s_1}(x_1) \cdot f^{s_2}(x_2) \cdot \dots \cdot f^{s_p}(x_p) = (f^{s_1} \cdot f^{s_2} \cdot \dots \cdot f^{s_p})(x_1, x_2, \dots, x_p).$$



Nota bene Пусть $\{f^k\}_{k=1}^n$ - базис X^* и $\{\hat{x}_j\}_{j=1}^n$ - дуальный базис X^{**} , тогда базис $\Omega_q^p(\mathbb{K})$ образуют ПЛФ вида

$$^{s_1, s_2, \dots, s_p}_{t_1, t_2, \dots, t_q} W = f^{s_1} \cdot f^{s_2} \cdot \dots \cdot f^{s_p} \cdot \hat{x}_{t_1} \cdot \hat{x}_{t_2} \cdot \dots \cdot \hat{x}_{t_q}.$$

7. Пусть $U \in \Omega^p$ и $V \in \Omega^q$, тогда

$$\begin{aligned}\text{Sym}(U \cdot V) &= \text{Sym}(\text{Sym } U \cdot V) = \text{Sym}(U \cdot \text{Sym } V), \\ \text{Asym}(U \cdot V) &= \text{Asym}(\text{Asym } U \cdot V) = \text{Asym}(U \cdot \text{Asym } V).\end{aligned}$$



Докажем данное свойство для операции Asym :

$$\begin{aligned}\text{Asym}(\text{Asym } U \cdot V) &= \\ \text{Asym} \left[\frac{1}{p!} \cdot \sum_{\sigma} (-1)^{[\sigma]} U(x_{\sigma(1)}, x_{\sigma(2)}, \dots, x_{\sigma(p)}) \cdot V(x_{p+1}, x_{p+2}, \dots, x_{p+q}) \right] &= \\ \frac{1}{p!} \cdot \sum_{\sigma} (-1)^{[\sigma]} \text{Asym} [U(x_{\sigma(1)}, x_{\sigma(2)}, \dots, x_{\sigma(p)}) \cdot V(x_{p+1}, x_{p+2}, \dots, x_{p+q})] &.\end{aligned}$$

В силу антисимметричности формы имеем

$$\begin{aligned}\text{Asym} [U(x_{\sigma(1)}, x_{\sigma(2)}, \dots, x_{\sigma(p)}) \cdot V(x_{p+1}, x_{p+2}, \dots, x_{p+q})] &= \\ = (-1)^{[\sigma]} \text{Asym} [U(x_1, x_2, \dots, x_p) \cdot V(x_{p+1}, x_{p+2}, \dots, x_{p+q})] &,\end{aligned}$$

и тогда получаем

$$\frac{1}{p!} \cdot \sum_{\sigma} \text{Asym} [U(x_1, x_2, \dots, x_p) \cdot V(x_{p+1}, x_{p+2}, \dots, x_{p+q})] = \text{Asym}(U \cdot V).$$



4.2 Внешнее произведение ПЛФ

Внешним произведением ПЛФ $U \in \Lambda^p$ на ПЛФ $V \in \Lambda^r$ называется отображение

$$U \wedge V = \frac{(p+r)!}{p! \cdot r!} \text{Asym}(U \cdot V).$$

Лемма 4.2. Отображение $U \wedge V$ - антисимметричная ПЛФ, причем

$$U \wedge V \in \Lambda^{p+r}.$$



Очевидно. ◄

Nota bene Имеет место следующее свойство:

$$p+r > n = \dim X \quad \Rightarrow \quad U \wedge V = \Theta.$$

Свойства внешнего произведения

1. Антикоммутативность:

$$U \wedge V = (-1)^{pr} V \wedge U$$



Имеет место:

$$(U \wedge V)(x_1, \dots, x_p, x_{p+1}, \dots, x_{p+r}) = \frac{(p+r)!}{p! \cdot r!} \sum_{\sigma} (-1)^{[\sigma]} U(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(p)}) \cdot V(x_{\sigma(p+1)}, \dots, x_{\sigma(p+r)})$$

Хотим получить:

$$(\sigma(1), \dots, \sigma(p), \sigma(p+1), \dots, \sigma(p+r)) \rightarrow (\sigma(p+1), \dots, \sigma(p+r), \sigma(1), \dots, \sigma(p))$$

для этого необходимо

$$p + p + p + \dots + p = p \cdot r$$

транспозиций. И значит

$$(U \wedge V)(x_1, \dots, x_p, x_{p+1}, \dots, x_{p+r}) = (-1)^{p \cdot r} (V \wedge U)(x_1, \dots, x_p, x_{p+1}, \dots, x_{p+r}).$$



2. Вынесение скаляра:

$$(\alpha U) \wedge V = U \wedge (\alpha V) = \alpha (U \wedge V).$$



Очевидно. ◀

3. Ассоциативность:

$$U \wedge (V \wedge W) = (U \wedge V) \wedge W = U \wedge V \wedge W = \frac{(p+r+s)!}{p! \cdot r! \cdot s!} \text{Asym}(U \cdot V \cdot W).$$



По определению:

$$\begin{aligned} (U \wedge V) \wedge W &= \left(\frac{(p+r)!}{p! \cdot r!} \text{Asym}(U \cdot V) \right) \wedge W = \\ &= \frac{((p+r)+s)!}{(p+r)! \cdot s!} \text{Asym} \left(\frac{(p+r)!}{p! \cdot r!} \text{Asym}((U \cdot V) \cdot W) \right) = \\ &= \frac{(p+r+s)!}{p! \cdot r! \cdot s!} \text{Asym}(\text{Asym}(U \cdot V) \cdot W) = \frac{(p+r+s)!}{p! \cdot r! \cdot s!} \text{Asym}(U \cdot V \cdot W). \end{aligned}$$



4. Дистрибутивность:

$$U \wedge (V + W) = U \wedge V + U \wedge W.$$



Следует из дистрибутивности умножения и линейности Asym. ◀

5. Нуль-форма:

$$U \wedge \Theta = \Theta \wedge V = \Theta.$$

6. Пусть $\{f^i\}_{i=1}^n$ базис X^* , тогда

$${}^{i_1, i_2, \dots, i_p} F = f^{i_1} \wedge f^{i_2} \wedge \dots \wedge f^{i_p}, \quad 1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n$$



Из определения следует:

$$\begin{aligned} {}^{i_1, i_2, \dots, i_p} F &= p! \operatorname{Asym} ({}^{i_1, i_2, \dots, i_p} W) = p! \operatorname{Asym} (f^{i_1} \cdot f^{i_2} \cdot \dots \cdot f^{i_p}) = \\ p! \operatorname{Asym} (\operatorname{Asym} (f^{i_1} \cdot f^{i_2}) \cdot \dots \cdot f^{i_p}) &= \frac{p!}{2!} \operatorname{Asym} (f^{i_1} \wedge f^{i_2} \cdot \dots \cdot f^{i_p}) = \\ \frac{p!}{2!} \operatorname{Asym} (\operatorname{Asym} (f^{i_1} \wedge f^{i_2} \cdot f^{i_3}) \cdot \dots \cdot f^{i_p}) &= \\ \frac{p!}{3!} \operatorname{Asym} (f^{i_1} \wedge f^{i_2} \wedge f^{i_3} \cdot \dots \cdot f^{i_p}) &= \dots = \\ \operatorname{Asym} (f^{i_1} \wedge f^{i_2} \wedge \dots \wedge f^{i_p}) &= f^{i_1} \wedge f^{i_2} \wedge \dots \wedge f^{i_p}. \end{aligned}$$

