Calculus

Elementary Derivatives

f	C	x^n	$\sin x$	$\cos x$	a^x	$\ln x$
f'	0	nx^{n-1}	$\cos x$	$-\sin x$	$a^x \ln a$	$\frac{1}{x}$

Composition Laws

Let f and g be differentiable functions over x.

The $'$ mark denotes the derivative with respect to x, so $f' = \dfrac{df}{dx}$ and $g' = \dfrac{dg}{dx}$.

The $\circ$ symbol denotes function composition, so $(f \circ g)(x) = f(g(x))$.

$$(f \pm g)' = f' \pm g'$$

$$(fg)' = fg' + f'g$$

$$(f \circ g)' = (f' \circ g)g'$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

Trigonometry

Definitions



$$\tan\theta \equiv \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$$

$$\sec\theta \equiv \frac{1}{\cos\theta}$$

$$\operatorname{cosec}\theta \equiv \frac{1}{\sin\theta}$$

$$\cot\theta \equiv \frac{1}{\tan\theta} \equiv \frac{\cos\theta}{\sin\theta}$$

Identities

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta \equiv 1 \qquad 1 + \tan^2\theta \equiv \sec^2\theta \qquad 1 + \cot^2\theta \equiv \operatorname{cosec}^2\theta$$

$$\sin(\alpha+\beta) \equiv \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta \qquad \sin(\alpha-\beta) \equiv \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta$$

$$\cos(\alpha+\beta) \equiv \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta \qquad \cos(\alpha-\beta) \equiv \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$$

$$\tan(\alpha+\beta) \equiv \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha\tan\beta} \qquad \tan(\alpha-\beta) \equiv \frac{\tan\alpha - \tan\beta}{1 + \tan\alpha\tan\beta}$$

$$\sin 2\theta \equiv 2\sin\theta\cos\theta$$

$$\begin{aligned} \cos 2\theta &\equiv \cos^2\theta - \sin^2\theta \\ &\equiv 2\cos^2\theta - 1 \\ &\equiv 1 - 2\sin^2\theta \end{aligned}$$

$$\tan 2\theta \equiv \frac{2\tan\theta}{1 - \tan^2\theta}$$

Calculus

$$\frac{d}{dx}\sin x = \cos x \qquad \int \sin x \; dx = -\cos x + C$$

$$\frac{d}{dx}\cos x = -\sin x \qquad \int \cos x \; dx = \sin x + C$$

$$\frac{d}{dx}\tan x = \sec^2 x \qquad \int \tan x \; dx = \ln|\sec x| + C$$

$$\frac{d}{dx}\sec x = \sec x \tan x \qquad \int \sec x \; dx = \ln|\tan x + \sec x| + C$$

$$\frac{d}{dx}\operatorname{cosec} x = -\operatorname{cosec} x \cot x \qquad \int \operatorname{cosec} x \; dx = -\ln|\cot x + \operatorname{cosec} x| + C$$

$$\frac{d}{dx}\cot x = -\operatorname{cosec}^2 x \qquad \int \cot x \; dx = \ln|\sin x| + C$$

$$\frac{d}{dx}\arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \qquad \int \arcsin x \; dx = x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C$$

$$\frac{d}{dx}\arccos x = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \qquad \int \arccos x \; dx = x \arccos x - \sqrt{1-x^2} + C$$

$$\frac{d}{dx}\arctan x = \frac{1}{x^2+1} \qquad \int \arctan x \; dx = x \arctan x - \frac{\ln(x^2+1)}{2} + C$$

Graphs

$y = \sin(x)$



$y = \text{cosec}(x)$



$y = \cos(x)$



$y = \sec(x)$



$y = \tan(x)$



$y = \cot(x)$