

Определения по матану, семестр 4

7 июня 2018 г.

Содержание

1	Свойство, выполняющееся почти везде	5
2	Сходимость почти везде	5
3	Сходимость по мере	5
4	Теорема Егорова о сходимости почти везде и почти равномерной сходимости	5
5	Интеграл ступенчатой функции	5
6	Интеграл неотрицательной измеримой функции	6
7	Суммируемая функция	6
8	Интеграл суммируемой функции	7
9	Произведение мер	7
10	Теорема Фубини	7
11	Образ меры при отображении	8
12	Взвешенный образ меры	8

13	Плотность одной меры по отношению к другой	9
14	Заряд, множество положительности	9
14.1	Заряд	9
14.2	Множество положительности	9
15	Сферические координаты в R^3 и в R^m , их Якобианы	9
16	Интегральные неравенства Гельдера и Минковского	10
16.1	Неравенство Гельдера	10
16.2	Неравенство Минковского	10
17	Интеграл комплекснозначных функции	11
18	Пространство $L_p(E, \mu)$, $1 \leq p < +\infty$	11
19	Пространство $L_\infty(E, \mu)$	12
20	Существенный супремум	12
21	Фундаментальная последовательность, полное пространство	12
22	Плотное множество	12
23	Финитная функция	13
24	Мера Лебега-Стилтьеса	13
25	Функция распределения	13
26	Измеримое множество на простой двумерной поверхности в \mathbb{R}^3	13
27	Мера Лебега на простой двумерной поверхности в \mathbb{R}^3	14
28	Поверхностный интеграл первого рода	14

29 Кусочно-гладкая поверхность в \mathbb{R}^3	14
30 Гильбертово пространство	14
31 Ортогональный ряд	14
32 Сходящийся ряд в Гильбертовом пространстве	14
33 Ортогональное семейство векторов	15
34 Ортонормированное семейство векторов	15
35 Коэффициенты Фурье	15
36 Ряд Фурье в Гильбертовом пространстве	15
37 Базис, полная, замкнутая ОС	15
38 Сторона поверхности	16
39 Задание стороны поверхности с помощью касательных реперов	16
40 Интеграл II рода	16
41 Ориентация контура, согласованная со стороной поверхности	17
42 Тригонометрический ряд	17
43 Коэффициенты Фурье функции	18
44 Ядро Дирихле и Фейера	18
44.1 Ядро Дирихле	18
44.2 Ядро Фейера	18
45 Ротор, дивергенция векторного поля	18

46	Соленоидальное векторное поле	19
47	Бескоординатное определение ротора и дивергенции	19
48	Свертка	19
49	Аппроксимативная единица. TODO	19
50	Усиленная аппроксимативная единица. TODO	19
51	Метод суммирования средними арифметическими. TODO	20
52	Суммы Фейера. TODO	20
53	Преобразование Фурье. TODO	20
54	Свертка в $L^1(\mathbb{R}^m)$. TODO	20
55	Интеграл Фурье, частичный интеграл Фурье. TODO	20
56	Несобственный интеграл по мере Deprecated	20
57	L_{loc} Deprecated	21

1 Свойство, выполняющееся почти везде

$\langle X, \mathbb{A}, \mu \rangle$ - пространство с мерой, и $\omega(x)$ – утверждение, зависящее от точки x .

$E := \{x : \omega(x) \text{ — ложно}\}$ и $\mu E = 0$. Тогда говорят, что $\omega(x)$ верно при почти всех (п.в.) x .

2 Сходимость почти везде

$\langle X, \mathbb{A}, \mu \rangle$ - пространство с мерой, и $f_n, f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$.

Говорим, что $f_n \rightarrow f(x)$ почти везде, если $\{x : f_n(x) \not\rightarrow f(x)\}$ измеримо и имеет меру 0.

3 Сходимость по мере

$\langle X, \mathbb{A}, \mu \rangle$ - пространство с мерой

$f_n, f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ - п.в. конечны, измеримы

Говорят, что f_n сходится к f по мере μ (при $n \rightarrow +\infty$) (обозначается $f_n \xrightarrow{\mu} f$) если $\forall \epsilon > 0 \mu(X(|f_n - f| > \epsilon)) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

4 Теорема Егорова о сходимости почти везде и почти равномерной сходимости

$\langle X, \mathbb{A}, \mu \rangle$ - пространство с мерой, $\mu(X) < +\infty$

$f_n, f : X \rightarrow \mathbb{R}$ - п.в. конечны, измеримы

$f_n \rightarrow f$ почти всюду.

Тогда $\forall \epsilon > 0 \exists X_\epsilon \subset X, \mu(X \setminus X_\epsilon) < \epsilon, f_n$ равномерно сходится к f на X_ϵ

5 Интеграл ступенчатой функции

$\langle X, \mathbb{A}, \mu \rangle$ - пространство с мерой.

$f = \sum_{k=1}^n (\lambda_k \cdot \chi_{E_k})$ - ступенчатая функция, E_k - измеримые дизъюнктные множества, $f \geq 0$.

Интегралом ступенчатой функции f на множестве X назовём

$$\int_X f d\mu := \sum_{k=1}^n \lambda_k \cdot \mu E_k$$

Будем считать, что $[0 \cdot \infty = 0]$.

6 Интеграл неотрицательной измеримой функции

$\langle X, \mathbb{A}, \mu \rangle$ - пространство с мерой.

f - измеримо, $f \geq 0$, её интегралом на множестве X назовём

$$\int_X f d\mu := \sup \left(\int_X g d\mu \right)$$

по всем g : $0 \leq g \leq f$, g -ступенчатая.

7 Суммируемая функция

$\langle X, \mathbb{A}, \mu \rangle$ - пространство с мерой.

f -измерима, $\int_X f^+$ или $\int_X f^-$ конечен (хотя бы один из них).

Тогда интегралом f на X назовём

$$\int_X f d\mu := \int_X f^+ - \int_X f^-$$

Если конечен $\int_X f$ (то есть конечны интегралы по обеим срезкам), то f называют суммируемой.

8 Интеграл суммируемой функции

$\langle X, \mathbb{A}, \mu \rangle$ - пространство с мерой.

f — измерима, $E \in \mathbb{A}$.

Тогда интегралом f на множестве E назовём

$$\int_E f d\mu := \int_X f \cdot \chi(E) d\mu$$

f суммируемая на E , если $\int_X f^+ \chi(E)$ и $\int_X f^- \chi(E)$ конечны.

9 Произведение мер

$\langle X, \mathbb{A}, \mu \rangle, \langle Y, \mathbb{B}, \nu \rangle$ - пространства с мерой.

μ, ν - σ -конечные меры.

$$\mathbb{A} \times \mathbb{B} = \{A \times B \subset X \times Y : A \in \mathbb{A}, B \in \mathbb{B}\}$$

$$m_0 : \mathbb{A} \times \mathbb{B} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$$

$$m_0(A \times B) = \mu A \cdot \nu B$$

m - называется произведением мер μ и ν , если m - мера, которая является Лебеговским продолжением m_0 с полукольца $\mathbb{A} \times \mathbb{B}$ на некоторую σ -алгебру $\mathbb{A} \otimes \mathbb{B}$.

$m = \mu \times \nu$ - обозначение.

$\langle X \times Y, \mathbb{A} \otimes \mathbb{B}, \mu \times \nu \rangle$ - произведение пространств с мерой.

10 Теорема Фубини

$\langle X, \mathbb{A}, \mu \rangle, \langle Y, \mathbb{B}, \nu \rangle$ - пространства с мерой,

μ, ν — σ -конечные и полные,

$$m = \mu \times \nu,$$

f — суммируемая на $X \times Y$ по m .

Тогда:

- при почти всех x функция $f_x \in L(Y, \nu)$, то есть суммируема на Y по ν

при почти всех y функция $f^y \in L(X, \mu)$

•

$$x \mapsto \phi(x) \mid \phi(x) = \int_Y f_x d\nu \in L(X, \mu)$$

$$y \mapsto \psi(y) \mid \psi(y) = \int_X f^y d\mu \in L(Y, \nu)$$

Эти функции суммируемы (по μ в X и по ν в Y соответственно).

•

$$\int_{X \times Y} f dm = \int_X \phi(x) d\mu = \int_X \left(\int_Y f d\nu \right) d\mu$$

$$\int_{X \times Y} f dm = \int_Y \psi(y) d\nu = \int_Y \left(\int_X f d\mu \right) d\nu$$

11 Образ меры при отображении

$\langle X, \mathbb{A}, \mu \rangle$ — пространство с мерой, $\langle Y, \mathbb{B}, \nu \rangle$ — пространство с σ -алгеброй.

$\Phi : X \rightarrow Y$, $\Phi^{-1}(\mathbb{B}) \subset \mathbb{A}$ (прообраз любого множества из \mathbb{B} лежит в \mathbb{A}).

Пусть для $\forall E \in \mathbb{B}$ $\nu(E) = \mu(\Phi^{-1}(E))$.

ν является мерой на Y и называется образом меры μ при отображении Φ .

12 Взвешенный образ меры

$\langle X, \mathbb{A}, \mu \rangle$ — пространство с мерой, $\langle Y, \mathbb{B}, \nu \rangle$ — пространство с σ -алгеброй.

$\Phi : X \rightarrow Y$, $\Phi^{-1}(\mathbb{B}) \subset \mathbb{A}$ (прообраз любого множества из \mathbb{B} лежит в \mathbb{A}).

$\omega : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}, \omega \geq 0$ — измеримая.

Пусть для $E \in \mathbb{B}$ $\nu(E) = \int_{\Phi^{-1}(E)} \omega d\mu$.

ν является мерой на Y и называется взвешенным образом меры μ .

При $\omega \equiv 1$ взвешенный образ меры является обычным образом меры.

13 Плотность одной меры по отношению к другой

$\langle X, \mathbb{A}, \mu \rangle$ — пространство с мерой.

$\omega : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}, \omega \geq 0$ — измеримая.

$\nu(E) = \int_E \omega(x) d\mu$. ν — мера на X .

ω называется плотностью ν относительно μ .

14 Заряд, множество положительности

14.1 Заряд

$\langle X, \mathbb{A}, _ \rangle$ — пространство с σ -алгеброй.

$\phi : \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{R}$ (конечная, не обязательно неотрицательная).

ϕ счётно аддитивна.

Тогда ϕ — заряд.

14.2 Множество положительности

$A \subset X$ — множество положительности, если $\forall B \subset A, B$ измеримо:
 $\phi(B) \geq 0$.

15 Сферические координаты в R^3 и в R^m , их Якобианы

$$x_1 = r \cdot \cos \phi_1$$

$$x_2 = r \cdot \sin \phi_1 \cdot \cos \phi_2$$

$$1 \leq i \leq m-2 : \phi_i \in [0, \pi]$$

$$i = m-1 : \phi_i \in [0, 2\pi]$$

$$\begin{aligned}
x_3 &= r \cdot \sin \phi_1 \cdot \sin \phi_2 \cdot \cos \phi_3 \\
&\vdots \\
x_{m-2} &= r \cdot \sin \phi_1 \cdot \sin \phi_2 \cdots \sin \phi_{n-3} \cdot \cos \phi_{n-2} \\
x_{m-1} &= r \cdot \sin \phi_1 \cdot \sin \phi_2 \cdots \sin \phi_{n-2} \cdot \cos \phi_{n-1} \\
x_m &= r \cdot \sin \phi_1 \cdot \sin \phi_2 \cdots \sin \phi_{n-2} \cdot \sin \phi_{n-1}
\end{aligned}$$

$$\mathcal{J} = r^{n-1} \cdot (\sin \phi_1)^{n-2} \cdot (\sin \phi_2)^{n-3} \cdots (\sin \phi_{n-2})^1 \cdot (\sin \phi_{n-1})^0$$

Что тут происходит идейно. Сначала мы проецируем наш m -мерный вектор на нормаль к $(m-1)$ -мерной гиперплоскости. Потом рассматриваем проекцию на эту гиперплоскость и в ней рекурсивно повторяем процедуру, пока не дойдём до нашего любимого \mathbb{R}^2 . Уже в нём рассматриваем обычные полярные координаты (отсюда и другие ограничения на размер угла).

16 Интегральные неравенства Гельдера и Минковского

$\langle X, \mathbb{A}, \mu \rangle$; $f, g : E \subset X \rightarrow \mathbb{C}$ (E - изм.) — заданы п.в, измеримы.

16.1 Неравенство Гельдера

$$p, q > 1 : \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1. \text{ Тогда: } \int_E |fg| d\mu \leq \left(\int_E |f|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_E |g|^q d\mu \right)^{\frac{1}{q}}$$

16.2 Неравенство Минковского

$$1 \leq p < +\infty. \text{ Тогда: } \left(\int_E |f + g|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_E |f|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_E |g|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}}$$

17 Интеграл комплекснозначных функции

(X, \mathbb{A}, μ) - пространство с мерой. $E \in \mathbb{A}$

$f : E \rightarrow \mathbb{C}$

f измерима (суммируема), если $Im(f)$ и $Re(f)$ измеримы (суммируема)

$$\int_E f = \int_E Re(f) + i \cdot \int_E Im(f)$$

18 Пространство $L_p(E, \mu)$, $1 \leq p < +\infty$

$\langle X, \mathbb{A}, \mu \rangle$, $E \in \mathbb{A}$.

$$L'_p(E, \mu) = \{f : \text{п.в. } E \rightarrow \mathbb{C}, \text{ изм.}, \int_E |f|^p d\mu < +\infty\}$$

Это линейное пространство (по нер-ву Минковского и линейности пространства измеримых функций).

У этого пространства есть дефект — если определить норму как $\|f\| =$

$\left(\int_E |f|^p\right)^{\frac{1}{p}}$, то будет сразу много нулей пространства (ненулевые функции, которые п.в. равны 0, будут иметь норму 0). Поэтому перейдем к фактор-множеству функций по отношению эквивалентности:

$f \sim g$, если $f = g$ п.в.

$$L_p(E, \mu) := L'_p(E, \mu) / \sim - \text{лин. норм. пр-во с нормой } \|f\| = \left(\int_E |f|^p\right)^{\frac{1}{p}}.$$

NB1: Его элементы — классы эквивалентности обычных функций. Будем называть их тоже функциями. Они не умеют вычислять значение в точке (т.к. можно всегда подменить значение на любое другое и получить представителя все того же класса эквивалентности), но зато их можно интегрировать!

NB2: также иногда будем обозначать $\|f\|_p$ за норму f в пространстве L_p .

19 Пространство $L_\infty(E, \mu)$

$$L_\infty(E, \mu) = \{f : \text{п.в. } E \rightarrow \mathbb{C}, \operatorname{ess\,sup}_E |f| < +\infty\}$$

NB1: $\|f\|_\infty = \operatorname{ess\,sup}_E |f|$.

NB2: Новый вид нер-ва Гельдера : $\|f \cdot g\|_1 \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q$ (причем можно брать $p = +\infty, q = 1$ или наоборот).

20 Существенный супремум

$\langle X, \mathbb{A}, \mu \rangle, E \subset X$ — изм., $f : \text{п.в. } E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$.

Тогда: $\operatorname{ess\,sup}_{x \in E} f(x) = \inf\{A \in R : f(x) \leq A \text{ при п.в. } x\}$.

В этом определении A - существенная верхняя граница.

Свойства:

1. $\operatorname{ess\,sup}_E f \leq \sup_E f$
2. $f(x) \leq \operatorname{ess\,sup}_E f$ при п.в. $x \in E$.
3. $\int_E |fg| d\mu \leq \operatorname{ess\,sup}_E |g| \cdot \int_E |f| d\mu$.

21 Фундаментальная последовательность, полное пространство

21.1 Фундаментальная последовательность

X - метрическое пространство. $\{f\}_n$ - фундаментальная последовательность, если $|f_n - f_k| \rightarrow 0$ при $k, n \rightarrow 0$

21.2 Полное пространство

X - полное пространство, если любая фундаментальная последовательность в нём сходится.

22 Плотное множество

Множество A плотно во множестве B , если $\forall b \in B \forall \epsilon > 0$ верно, что $U_\epsilon(b) \cap A \neq \emptyset$.

23 Финитная функция

$\varphi : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$. \exists шар $B : \varphi \equiv 0$ вне B . Тогда φ — финитная.

Множество непрерывных финитных функций обозначаем как $C_0(\mathbb{R}^m)$.

24 Мера Лебега-Стилтьеса

\mathbb{P}^1 — полукольцо ячеек в \mathbb{R} .

$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна, монотонно возрастает.

$\mu[a, b) := g(b) - g(a)$ — σ -конечная мера на \mathbb{P}^1 .

NB1: g не обязательно непр., но должна возрастать.

Тогда $g(c \pm 0) = \lim_{x \rightarrow c \pm 0} g(x)$.

$\mu[a, b) := g(b - 0) - g(a - 0)$ — тоже σ -конечная мера (если g не непр. слева, то $\mu[a, b) := g(b) - g(a)$ — не мера (нет непр. слева)).

Тогда мерой Лебега-Стилтьеса будем называть меру μ_g , полученную из μ по теореме о лебеговском продолжении меры.

25 Функция распределения

$\langle X, \mathbb{A}, \mu \rangle$, $h : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ — измерима, п.в. конечна.

Пусть $\forall t \in \mathbb{R} \quad \mu X(h < t) < +\infty$.

Тогда $H(t) := \mu X(h < t)$ — это функция распределения функции h по мере μ .

26 Измеримое множество на простой двумерной поверхности в \mathbb{R}^3

TODO

27 Мера Лебега на простой двумерной поверхности в \mathbb{R}^3

TODO

28 Поверхностный интеграл первого рода

TODO

29 Кусочно-гладкая поверхность в \mathbb{R}^3

TODO

30 Гильбертово пространство

H — линейное пространство над \mathbb{R} или \mathbb{C} , в котором задано скалярное произведение, и полное относительно соответствующей нормы, называется Гильбертовым.

31 Ортогональный ряд

$x_k \in \mathbb{H}$, $\sum x_k$ называется ортогональным рядом, если $\forall k, l : k \neq l : x_k \perp x_l$.

32 Сходящийся ряд в Гильбертовом пространстве

$x_n \in \mathbb{H}$.

$\sum x_n$ сходится к x , если

$S_n := \sum_{k=1}^n x_k$, $S_n \rightarrow x$ (то есть, $|S_n - x| \rightarrow 0$ — сходимость по норме).

33 Ортогональное семейство векторов

$\{e_k\} \in \mathbb{H}$ - ортогональное семейство векторов, если $\forall k \neq l : e_k \perp e_l$, $\forall k : e_k \neq 0$.

34 Ортонормированное семейство векторов

$\{e_k\} \in \mathbb{H}$ - ортонормированное семейство векторов, если e_k — ортогональное семейство векторов, и $\forall k : |e_k| = 1$.

35 Коэффициенты Фурье

$\{e_k\}$ - ортонормированная система в \mathbb{H} , $x \in \mathbb{H}$.

$c_k(x) = \frac{\langle x, e_k \rangle}{|e_k|^2}$ называются коэффициентами Фурье вектора x по ортогональной системе $\{e_k\}$.

36 Ряд Фурье в Гильбертовом пространстве

$\sum c_k(x) \cdot e_k$ называется рядом Фурье вектора x по ортогональной системе $\{e_k\}$.

37 Базис, полная, замкнутая ОС

$\{e_k\}$ — ортогональная система в \mathbb{H} .

1. $\{e_k\}$ — **базис**, если $\forall x \in \mathbb{H} : \exists c_k$, что $x = \sum_{k=1}^{+\infty} c_k \cdot e_k$
2. $\{e_k\}$ — **полная** О.С., если $(\forall k : z \perp e_k) \Rightarrow z = 0$.
3. $\{e_k\}$ — **замкнутая** О.С., если $\forall x \in \mathbb{H} : \sum_{k=1}^{+\infty} |c_k(x)|^2 \cdot \|e_k\|^2 = \|x\|^2$.

38 Сторона поверхности

Сторона (простой) гладкой двумерной поверхности — непрерывное поле единичных нормалей. Поверхность, для которой существует сторона, называется двусторонней. Если же стороны не существует, она называется односторонней.

39 Задание стороны поверхности с помощью касательных реперов

F_1, F_2 — два касательных векторных поля к поверхности M .

$\forall p \in M \quad F_1(p), F_2(p)$ — Л.Н.З. касательные векторы.

Тогда поле нормалей стороны определяется, как $n := F_1 \times F_2$

Репер — пара векторов из $F_1 \times F_2$.

40 Интеграл II рода

M — простая гладкая двусторонняя двумерная поверхность в \mathbb{R}^3 .

n_0 — фиксированная сторона (одна из двух).

$F : M \rightarrow \mathbb{R}^3$ — векторное поле.

Тогда интегралом II рода назовем $\int_M \langle F, n_0 \rangle ds$

Замечания

1. Смена стороны эквивалентна смене знака.
2. Не зависит от параметризации.
3. $F = (P, Q, R)$.


Тогда интеграл имеет вид $\iint P dydz + Q dzdx + R dx dy$.

NB: $Q dx dz = -Q dz dx$.

41 Ориентация контура, согласованная со стороной поверхности

Ориентация контура согласована со стороной поверхности, если она задает эту сторону.

Пояснение: Рассмотрим некоторый контур (замкнутую петлю) и точку на нем. Построим два касательных вектора к контуру в этой точке: первый — снаружи от контура (задает направление «движения» по петле), второй — внутри контура. Тогда будем называть такую ориентацию согласованной со стороной, если направление векторного произведения первого и второго векторов в точке совпадает с направлением нормали к поверхности.



42 Тригонометрический ряд

•

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos kx + b_k \sin kx$$

(где a_i, b_i – коэффициенты ряда).

• Другая форма:

$$\sum_{k=\mathbb{Z}} c_k e^{ikx}$$

Тогда $S_n := \sum_{k=-N}^N c_k e^{ikx}$.

43 Коэффициенты Фурье функции

•

$$a_k(f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx \, dx$$

•

$$b_k(f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx \, dx$$

•

$$c_k(f) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} \, dx$$

44 Ядро Дирихле и Фейера

44.1 Ядро Дирихле

$$D_n(t) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kt \right)$$

44.2 Ядро Фейера

$$\Phi_n(t) = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n D_k(t)$$

45 Ротор, дивергенция векторного поля

$F = (P, Q, R)$ — векторное поле в \mathbb{R}^3 .

$(P, Q, R) \rightarrow (R'_y - Q'_z, P'_z - R'_x, Q'_x - P'_y)$. Такое преобразование называется ротором или вихрем. Обозначается как $rot F$.

$div F = P'_x + Q'_y + R'_z$. Многомерный случай определяется аналогично.

46 Соленоидальное векторное поле

Векторное поле A — соленоидальное, если \exists векторное поле $B : rot B = A$. Тогда B называется векторным потенциалом поля A .

47 Бескоординатное определение ротора и дивергенции

$rot F$ — это такое векторное поле, что $\forall a \forall n_0 (rot F(a))_{n_0} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \int_{\partial B_r} F_l dl$

$$div F(a) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\lambda_3(B(a,r))} \iiint_{B(a,r)} div F_l dx dy dz =$$
$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\lambda_3(B(a,r))} \iint_{\partial B(a,r)} \langle F, n_0 \rangle dS$$

48 Свертка

$$(f * K)(x) = \int_{-\pi}^{\pi} f(x - t)K(t)dt$$

где $f, K \in L_1([-\pi, \pi])$.

49 Аппроксимативная единица. TODO

TODO

50 Усиленная аппроксимативная единица. TODO

TODO

51 Метод суммирования средними арифметическими. TODO

TODO

52 Суммы Фейера. TODO

TODO

53 Преобразование Фурье. TODO

TODO

54 Свертка в $L^1(\mathbb{R}^m)$. TODO

TODO

55 Интеграл Фурье, частичный интеграл Фурье. TODO

TODO

56 Несобственный интеграл по мере Deprecated

$$\int_a^{\rightarrow b} f d\lambda_1 = \lim_{B \rightarrow b-0} \int_a^B f d\lambda_1$$

где f - локально суммируемая (т. е. $\forall [a, B] \subset [a, b)$ f — сумм. на $[a, B]$)

57 L_{loc} Deprecated

$$f : X \times Y \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$$

(X, \mathbb{A}, μ) — пространство с мерой.

Y — метрическое пространство (или метризуемое).

$\forall y$ $f^y(x) = f(x, y)$ — суммируема на X .

f удовлетворяет L_{loc} ($f \in (L_{loc})$) если:

- $\exists g : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ — суммируема.
- $\exists U(a) \forall y \in \dot{U}(a)$ при п. в. $x \in \mathbb{X}$ $|f(x, y)| \leq g(x)$