



# ПРЕПАРАТИ І СТРОКИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ НА ЯЧМЕНІ

0,75-1,0 л/т	Сажкові хвороби (летюча, чорна летюча і тверда сажки ячменю), кореневі гнилі, зокрема пітюзні, пліснявіння насіння, гельмінтоспориози
1,5-2,0 л/т	Пліснявіння насіння, фузаріозно-гельмінтоспориозні кореневі гнилі, сажкові хвороби (летюча, покриті), снігова пліснява, гельмінтоспориози
1,5-2,0 л/т	Сажкові хвороби, фузаріозні й гельмінтоспориозні кореневі гнилі, темно-бура плямистість, ранні прояви листостеблових хвороб, пітїум
1,5-2,0 л/т	Сажкові хвороби, фузаріозно-гельмінтоспориозні кореневі гнилі, септоріоз, фузаріоз, Шкідники: хлібна жужелиця та хлібні блішки, цикадки, попелиці, злакові мухи
1,5-2,0 л/т	Сажкові хвороби, фузаріозно-гельмінтоспориозні кореневі гнилі, ризокторіозна прикоренева гниль, септоріоз, фузаріоз, Шкідники: хлібна жужелиця та хлібні блішки, цикадки, попелиці, злакові мухи
0,05-0,07 л/га	Однорічні й окремі багаторічні дводольні бур'яни, серед них підмаренник чіпкий на пізніх стадіях
0,015-0,02 кг/га	Однорічні і багаторічні дводольні бур'яни, падалиця соняшнику й ріпаку
1,0 л/га	Однорічні злакові бур'яни
0,5 л/га	Однорічні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д, МЦПА, та деякі багаторічні дводольні бур'яни
0,7 л/га	Однорічні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д, МЦПА, та багаторічні дводольні бур'яни
0,4-0,6 л/га	Однорічні й окремі багаторічні дводольні бур'яни
0,3-0,5 л/га	Однорічні й окремі багаторічні дводольні бур'яни, березка польова
0,4-0,8 л/га	Підвищення урожайності, покращення зимівлі, протидія вилігання
0,5 л/га	Гельмінтоспориози, іржа, септоріоз, борошниста роса
0,8-1,0 л/га	Борошниста роса, плямистість листя, іржа, гельмінтоспориози, ринхоспориоз, фузаріоз, септоріоз
1,5-2,0 л/га	Гельмінтоспориози, борошниста роса, септоріоз
0,4-0,5 л/га	Бура іржа, борошниста роса, гельмінтоспориози, септоріоз, фузаріоз, альтернاریоз
1,0-1,2 л/га	Борошниста роса, септоріоз листя і колосу, іржа, гельмінтоспориози
0,5-0,75 л/га	Борошниста роса, сітчаста, темно-бура, смугаста, облямівкова плямистості, септоріоз
0,4-0,8 л/га	Фузаріоз листя і колосу, альтернاریоз, септоріоз, чорний зародок
0,18-0,22 л/га	Попелиці, хлібні клопи, п'явиці, блішки, трипси, цикадки, ячмінний мінер, хлібні жуки
0,5-0,75 л/га	П'явиці, хлібний турун, озима совка
16 мл/т	Незавантажені складські приміщення, обробка продовольчого, насінневого й фуражного зерна вологим способом
0,5 мл/м²	
1,5-2,0 л/га	Десикація та знищення бур'янів

ПРОТРУЙНИК

ГЕРБІЦИД

ІНСЕКТИЦИД

ФУНГІЦИД

РЕТАРДАНТ