

ПРЕПАРАТИ І СТРОКИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ НА ВИНОГРАДНИКАХ



Однорічні злакові та дводольні бур'яни	1,3-1,7 л/га
Однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур'яни	2,0-4,0 л/га
Багаторічні злакові бур'яни	2,0 л/га
Однорічні злакові та дводольні бур'яни	3,5-4,0 л/га
Оїдіум	0,15-0,25 л/га
Оїдіум, чорна гниль, краснуха	0,6-0,7 л/га
Мільдью	2,0-3,0 кг/га
Мільдью	2,5 кг/га
Мільдью, антракноз	4,0-5,0 кг/га
Оїдіум, павутинні кліщі	5,0-8,0 кг/га
Мільдью, оїдіум, сіра гниль, чорна плямистість, інфекційне засихання	0,8 л/га
Сіра та інші види гнилі, мільдью. Хвороби після пошкодження градом	0,75-1,0 кг/га
Мільдью, оїдіум, сіра гниль	0,5-0,7 кг/га
Комплекс шкідників	0,3-0,5 л/га
Гронова листовійка	1,0 л/га
	1,0 л/га
Листовійки, ріпаківий квіткоїд	0,15-0,2 л/га
Кліщі, зудень, трипси, листова філоксера	1,0 л/га
Кліщі, попелиці (розпукування бруньок та після збирання врожаю)	1,5-2,0 л/га
Гронова листовійка	0,3-0,4 л/га
Листкова філоксера, багатоїдний трубокрут, скосар кримський	0,18 л/га
Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — перед цвітінням)	2,0-3,0 л/га

