



ПРЕПАРАТИ І СТРОКИ  
ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ  
НА КУКУРУДЗІ

1,0 л/т	Стеблові і кореневі гнилі
1,0 л/т	Стеблові і кореневі гнилі, пліснявіння насіння, гельмінтоспоріоз
4 мл/80 тис. нас.	Ризоктоніоз, гельмінтоспоріоз
24 мл/80 тис. нас.	Летюча сажка
6,0-9,0 л/т	Дротяники, несправжні дротяники, чорниші, шведські мухи, попелиці, блішки, західний кукурудзяний жук (діабротика)
5,0-6,0 л/т	
2,5-3,5 л/га	Однорічні злакові та дводольні бур'яни
4,0-4,5 л/га	
3,5-4,0 л/га	Однорічні злакові та дводольні бур'яни, деякі багаторічні дводольні бур'яни
0,4-0,6 л/га	Однорічні і багаторічні дводольні бур'яни
0,5-0,7 л/га	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни, в т. ч. осоти та падалиця соняшнику (IMI- та сульфостійка)
0,5-0,6 л/га	Однорічні й деякі багаторічні дводольні бур'яни, в т. ч. березка польова
0,015-0,02 кг/га при pH ≤ 7	Однорічні дводольні та деякі багаторічні дводольні бур'яни (у т. ч. стійкі до 2,4-Д і МЦПА), а також падалиця соняшнику й ріпаку
0,16-0,2 л/га + ПАР*	Однорічні й багаторічні злакові (у т. ч. сорго та пирій) і деякі однорічні дводольні бур'яни
0,2-0,25 л/га + ПАР*	Однорічні і багаторічні дводольні бур'яни
1,25-2,0 л/га	Однорічні і багаторічні злакові і дводольні бур'яни (у т. ч. ваточник сирійський)
0,2-0,3 л/га	Стебловий кукурудзяний метелик, західний кукурудзяний жук
0,2-0,3 л/га	Бавовникова совка і кукурудзяний стебловий метелик
0,5-0,75 л/га	Фузаріоз, гельмінтоспоріоз та інші плямистості

ПРОТРУЙНИК

ГЕРБІЦИД

ІНСЕКТИЦИД

ФУНГІЦИД

\* Обов'язково.