



ПРЕПАРАТИ І СТРОКИ
ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
НА ПШЕНИЦІ

0,5 л/га	Темно-бура плямистість, іржа (бура, стеблова, жовта), септоріоз, борошниста роса
0,8-1,0 л/га	Борошниста роса, плямистість листя, іржа, гельмінтоспориози, піренофороз, ринхоспориоз, фузаріоз, септоріоз
0,4-0,5 л/га	Бура іржа, борошниста роса, гельмінтоспориози, септоріоз, піренофороз і фузаріоз
0,5-0,75 л/га	Борошниста роса, темно-бура плямистість, фузаріоз листя, облямівкова плямистість, септоріоз
1,0-1,2 л/га	Борошниста роса, фузаріоз листя, септоріоз листя і колосу, іржа, гельмінтоспориози
0,4-0,6 л/га	Борошниста роса, септоріоз, темно-бура плямистість, піренофороз, іржа
1,0 л/га	Фузаріоз листя і колосу, альтернاریоз, септоріоз, піренофороз, іржа бура, жовта і стеблова
0,15-0,30 л/га	Хлібні жуки, блішки, трипси, п'явиці, клоп шкідлива черепашка, попелиці, озима совка, злакові мухи
0,18 л/га	Клоп шкідлива черепашка, трипси, попелиці, цикадки, злакові мухи, блішки, п'явиці
0,25-0,4 л/га	Хлібний турун
0,75-1,0 л/га	П'явиці, хлібний турун, озима совка
16 мл/т	Незавантажені складські приміщення, обробка продовольчого, насіннєвого й фуражного зерна вологим способом
0,5 мл/м²	
1,5-2,0 л/га	Десикація та знищення бур'янів