

6. domaća zadaća iz Neizrazitog, evolucijskog i neuroračunarstva

Dominik Špiljak

Izvod postupka učenja

Prolaz unaprijed kroz mrežu:

$$\alpha_i^{(x)} = \frac{1}{1 + e^{b_i^{(x)} \cdot (x - a_i^{(x)})}} \quad \alpha_i^{(y)} = \frac{1}{1 + e^{b_i^{(y)} \cdot (y - a_i^{(y)})}} \quad \alpha_i = \alpha_i^{(x)} \cdot \alpha_i^{(y)}$$
$$o_k = \frac{\sum_{i=1}^m \alpha_i \cdot (p_i \cdot x_k + q_i \cdot y_k + r_i)}{\sum_{j=1}^m \alpha_j} \quad E_k = \frac{1}{2} \cdot (z_k - o_k)^2$$

Gradijent za p_i :

$$\frac{\partial E_k}{\partial p_i} = \frac{\partial E_k}{\partial o_k} \cdot \frac{\partial o_k}{\partial p_i} \quad \frac{\partial E_k}{\partial o_k} = -(z_k - o_k) \quad \frac{\partial o_k}{\partial p_i} = \frac{\alpha_i \cdot x_k}{\sum_{j=1}^m \alpha_j}$$
$$\frac{\partial E_k}{\partial p_i} = -(z_k - o_k) \cdot \frac{\alpha_i \cdot x_k}{\sum_{j=1}^m \alpha_j}$$

Gradijent za q_i :

$$\frac{\partial E_k}{\partial q_i} = \frac{\partial E_k}{\partial o_k} \cdot \frac{\partial o_k}{\partial q_i} \quad \frac{\partial o_k}{\partial q_i} = \frac{\alpha_i \cdot y_k}{\sum_{j=1}^m \alpha_j} \quad \frac{\partial E_k}{\partial q_i} = -(z_k - o_k) \cdot \frac{\alpha_i \cdot y_k}{\sum_{j=1}^m \alpha_j}$$

Gradijent za r_i :

$$\frac{\partial E_k}{\partial r_i} = \frac{\partial E_k}{\partial o_k} \cdot \frac{\partial o_k}{\partial r_i} \quad \frac{\partial o_k}{\partial r_i} = \frac{\alpha_i}{\sum_{j=1}^m \alpha_j} \quad \frac{\partial E_k}{\partial r_i} = -(z_k - o_k) \cdot \frac{\alpha_i}{\sum_{j=1}^m \alpha_j}$$

Ažuriranje parametara p_i, q_i, r_i :

	Koristeći pravi gradijent	Koristeći stohastičku varijantu
p	$p_i(t+1) = p_i(t) + \eta \sum_{k=1}^N (z_k - o_k) \cdot \frac{\alpha_i \cdot x_k}{\sum_{j=1}^m \alpha_j}$	$p_i(t+1) = p_i(t) + \eta (z_k - o_k) \cdot \frac{\alpha_i \cdot x_k}{\sum_{j=1}^m \alpha_j}$
q	$q_i(t+1) = q_i(t) + \eta \sum_{k=1}^N (z_k - o_k) \cdot \frac{\alpha_i \cdot y_k}{\sum_{j=1}^m \alpha_j}$	$q_i(t+1) = q_i(t) + \eta (z_k - o_k) \cdot \frac{\alpha_i \cdot y_k}{\sum_{j=1}^m \alpha_j}$
r	$r_i(t+1) = r_i(t) + \eta \sum_{k=1}^N (z_k - o_k) \cdot \frac{\alpha_i}{\sum_{j=1}^m \alpha_j}$	$r_i(t+1) = r_i(t) + \eta (z_k - o_k) \cdot \frac{\alpha_i}{\sum_{j=1}^m \alpha_j}$

Gradijent za $a_i^{(x)}$:

$a_i^{(x)}$ utječe na $\alpha_i^{(x)}$, $\alpha_i^{(x)}$ utječe na α_i , α_i utječe na o_k

• stoga $a_i^{(x)} \Rightarrow \alpha_i^{(x)} \Rightarrow \alpha_i \Rightarrow o_k$

$$\frac{\partial E_k}{\partial a_i^{(x)}} = \frac{\partial E_k}{\partial o_k} \cdot \frac{\partial o_k}{\partial \alpha_i} \cdot \frac{\partial \alpha_i}{\partial \alpha_i^{(x)}} \cdot \frac{\partial \alpha_i^{(x)}}{\partial a_i^{(x)}}$$

$$\frac{\partial o_k}{\partial \alpha_i} = \frac{\sum_{j=1, j \neq i}^m \alpha_j \cdot ((p_i \cdot x_k + q_i \cdot y_k + r_i) - (p_j \cdot x_k + q_j \cdot y_k + r_j))}{\left(\sum_{j=1}^m \alpha_j\right)^2} \quad \frac{\partial \alpha_i}{\partial \alpha_i^{(x)}} = \alpha_i^{(y)}$$

$$\frac{\partial \alpha_i^{(x)}}{a_i^{(x)}} = b_i^{(x)} \cdot (1 - \alpha_i^{(x)}) \cdot \alpha_i^{(x)}$$

$$\frac{\partial E_k}{\partial a_i^{(x)}} = -(z_k - o_k) \cdot \frac{\sum_{j=1, j \neq i}^m \alpha_j \cdot ((p_i \cdot x_k + q_i \cdot y_k + r_i) - (p_j \cdot x_k + q_j \cdot y_k + r_j))}{\left(\sum_{j=1}^m \alpha_j\right)^2} \cdot \alpha_i^{(y)} \cdot b_i^{(x)} \cdot (1 - \alpha_i^{(x)}) \cdot \alpha_i^{(x)}$$

Gradijent za $b_i^{(x)}$:

$$\frac{\partial E_k}{\partial b_i^{(x)}} = \frac{\partial E_k}{\partial o_k} \cdot \frac{\partial o_k}{\partial \alpha_i} \cdot \frac{\partial \alpha_i}{\partial \alpha_i^{(x)}} \cdot \frac{\partial \alpha_i^{(x)}}{\partial b_i^{(x)}} \quad \frac{\partial \alpha_i^{(x)}}{b_i^{(x)}} = -(x - a_i^{(x)}) \cdot \alpha_i^{(x)} \cdot (1 - \alpha_i^{(x)})$$

$$\frac{\partial E_k}{\partial b_i^{(x)}} = -(z_k - o_k) \cdot \frac{\sum_{j=1, j \neq i}^m \alpha_j \cdot ((p_i \cdot x_k + q_i \cdot y_k + r_i) - (p_j \cdot x_k + q_j \cdot y_k + r_j))}{\left(\sum_{j=1}^m \alpha_j\right)^2} \cdot \alpha_i^{(y)} \cdot -(x - a_i^{(x)}) \cdot \alpha_i^{(x)} \cdot (1 - \alpha_i^{(x)})$$

Gradijent za $a_i^{(y)}$:

$$\frac{\partial E_k}{\partial a_i^{(y)}} = \frac{\partial E_k}{\partial o_k} \cdot \frac{\partial o_k}{\partial \alpha_i} \cdot \frac{\partial \alpha_i}{\partial a_i^{(y)}} \cdot \frac{\partial a_i^{(y)}}{\partial \alpha_i^{(y)}} \quad \frac{\partial \alpha_i}{\partial \alpha_i^{(x)}} = \alpha_i^{(y)} \quad \frac{\partial a_i^{(y)}}{a_i^{(y)}} = b_i^{(y)} \cdot (1 - \alpha_i^{(y)}) \cdot \alpha_i^{(y)}$$

$$\frac{\partial E_k}{\partial a_i^{(y)}} = -(z_k - o_k) \cdot \frac{\sum_{j=1, j \neq i}^m \alpha_j \cdot ((p_i \cdot x_k + q_i \cdot y_k + r_i) - (p_j \cdot x_k + q_j \cdot y_k + r_j))}{(\sum_{j=1}^m \alpha_j)^2} \cdot \alpha_i^{(x)} \cdot b_i^{(y)} \cdot (1 - \alpha_i^{(y)}) \cdot \alpha_i^{(y)}$$

Gradijent za $b_i^{(y)}$:

$$\frac{\partial E_k}{\partial b_i^{(y)}} = \frac{\partial E_k}{\partial o_k} \cdot \frac{\partial o_k}{\partial \alpha_i} \cdot \frac{\partial \alpha_i}{\partial \alpha_i^{(x)}} \cdot \frac{\partial \alpha_i^{(x)}}{\partial b_i^{(x)}} \quad \frac{\partial \alpha_i^{(y)}}{b_i^{(y)}} = -(x - a_i^{(y)}) \cdot \alpha_i^{(y)} \cdot (1 - \alpha_i^{(y)})$$

$$\frac{\partial E_k}{\partial b_i^{(y)}} = -(z_k - o_k) \cdot \frac{\sum_{j=1, j \neq i}^m \alpha_j \cdot ((p_i \cdot x_k + q_i \cdot y_k + r_i) - (p_j \cdot x_k + q_j \cdot y_k + r_j))}{(\sum_{j=1}^m \alpha_j)^2} \cdot \alpha_i^{(x)} \cdot -(y - a_i^{(y)}) \cdot \alpha_i^{(y)} \cdot (1 - \alpha_i^{(y)})$$

	Koristeći pravi gradijent
$a_i^{(x)}$	$a_i^{(x)}(t+1) = a_i^{(x)}(t) + \eta \cdot \sum_{k=1}^N (z_k - o_k) \cdot \frac{\sum_{j=1, j \neq i}^m \alpha_j \cdot ((p_i \cdot x_k + q_i \cdot y_k + r_i) - (p_j \cdot x_k + q_j \cdot y_k + r_j))}{(\sum_{j=1}^m \alpha_j)^2} \cdot \alpha_i^{(y)} \cdot b_i^{(x)} \cdot (1 - \alpha_i^{(x)}) \cdot \alpha_i^{(x)}$
$a_i^{(x)}$	$b_i^{(x)}(t+1) = b_i^{(x)}(t) + \eta \cdot \sum_{k=1}^N (z_k - o_k) \cdot \frac{\sum_{j=1, j \neq i}^m \alpha_j \cdot ((p_i \cdot x_k + q_i \cdot y_k + r_i) - (p_j \cdot x_k + q_j \cdot y_k + r_j))}{(\sum_{j=1}^m \alpha_j)^2} \cdot \alpha_i^{(y)} \cdot -(x - a_i^{(x)}) \cdot \alpha_i^{(x)} \cdot (1 - \alpha_i^{(x)})$
$a_i^{(y)}$	$a_i^{(y)}(t+1) = a_i^{(y)}(t) + \eta \cdot \sum_{k=1}^N (z_k - o_k) \cdot \frac{\sum_{j=1, j \neq i}^m \alpha_j \cdot ((p_i \cdot x_k + q_i \cdot y_k + r_i) - (p_j \cdot x_k + q_j \cdot y_k + r_j))}{(\sum_{j=1}^m \alpha_j)^2} \cdot \alpha_i^{(x)} \cdot b_i^{(y)} \cdot (1 - \alpha_i^{(y)}) \cdot \alpha_i^{(y)}$
$b_i^{(y)}$	$b_i^{(y)}(t+1) = b_i^{(y)}(t) + \eta \cdot \sum_{k=1}^N (z_k - o_k) \cdot \frac{\sum_{j=1, j \neq i}^m \alpha_j \cdot ((p_i \cdot x_k + q_i \cdot y_k + r_i) - (p_j \cdot x_k + q_j \cdot y_k + r_j))}{(\sum_{j=1}^m \alpha_j)^2} \cdot \alpha_i^{(x)} \cdot -(y - a_i^{(y)}) \cdot \alpha_i^{(y)} \cdot (1 - \alpha_i^{(y)})$

	Koristeći stohastičku varijantu
$a_i^{(x)}$	$a_i^{(x)}(t+1) = a_i^{(x)}(t) + \eta \cdot (z_k - o_k) \cdot \frac{\sum_{j=1, j \neq i}^m \alpha_j \cdot ((p_i \cdot x_k + q_i \cdot y_k + r_i) - (p_j \cdot x_k + q_j \cdot y_k + r_j))}{(\sum_{j=1}^m \alpha_j)^2} \cdot \alpha_i^{(y)} \cdot b_i^{(x)} \cdot (1 - \alpha_i^{(x)}) \cdot \alpha_i^{(x)}$
$b_i^{(x)}$	$b_i^{(x)}(t+1) = b_i^{(x)}(t) + \eta \cdot (z_k - o_k) \cdot \frac{\sum_{j=1, j \neq i}^m \alpha_j \cdot ((p_i \cdot x_k + q_i \cdot y_k + r_i) - (p_j \cdot x_k + q_j \cdot y_k + r_j))}{(\sum_{j=1}^m \alpha_j)^2} \cdot \alpha_i^{(y)} \cdot -(x - a_i^{(x)}) \cdot \alpha_i^{(x)} \cdot (1 - \alpha_i^{(x)})$
$a_i^{(y)}$	$a_i^{(y)}(t+1) = a_i^{(y)}(t) + \eta \cdot (z_k - o_k) \cdot \frac{\sum_{j=1, j \neq i}^m \alpha_j \cdot ((p_i \cdot x_k + q_i \cdot y_k + r_i) - (p_j \cdot x_k + q_j \cdot y_k + r_j))}{(\sum_{j=1}^m \alpha_j)^2} \cdot \alpha_i^{(x)} \cdot b_i^{(y)} \cdot (1 - \alpha_i^{(y)}) \cdot \alpha_i^{(y)}$
$b_i^{(y)}$	$b_i^{(y)}(t+1) = b_i^{(y)}(t) + \eta \cdot (z_k - o_k) \cdot \frac{\sum_{j=1, j \neq i}^m \alpha_j \cdot ((p_i \cdot x_k + q_i \cdot y_k + r_i) - (p_j \cdot x_k + q_j \cdot y_k + r_j))}{(\sum_{j=1}^m \alpha_j)^2} \cdot \alpha_i^{(x)} \cdot -(y - a_i^{(y)}) \cdot \alpha_i^{(y)} \cdot (1 - \alpha_i^{(y)})$