



Control 1 Cálculo III
Grupo 2, versión A
29 de septiembre de 2022

Problema 1. Considerar las siguientes rectas en \mathbb{R}^3 :

- $\mathcal{L}_1 = \{(2, -1, 1) + t(1, 2, 1) : t \in \mathbb{R}\}$
- $\mathcal{L}_2 = \{(1, 0, 3) + t(2, 1, -1) : t \in \mathbb{R}\}$
- $\mathcal{L}_3 = \{(-1, 2, 7) + t(-4, 1, 5) : t \in \mathbb{R}\}$

Probar que las tres rectas se encuentran en un mismo plano

Solución. Si existiese dicho plano, un vector normal a dicho plano debería ser perpendicular a los tres vectores direccionales. En particular $\vec{n} := (1, 2, 1) \times (2, 1, -1) = (-3, 3, -3)$ sería un vector normal a dicho plano. Y cualquier punto de esas rectas pertenecería a dicho plano, por ejemplo $(2, -1, 1)$. Entonces la ecuación normal de dicho plano debería ser:

$\mathcal{P} : \langle (-3, 3, -3), (x, y, z) - (2, -1, 1) \rangle = 0$, operando:

$$\mathcal{P} : x - y + z = 4$$

Para verificar que las rectas son subconjuntos de dicho plano:

- Sea $p \in \mathcal{L}_1$, luego existe $t \in \mathbb{R}$ tal que $p = (2, -1, 1) + t(1, 2, 1) = (2+t, -1+2t, 1+t)$, entonces evaluamos p en la expresión que define a \mathcal{P} : $(2+t) - (-1+2t) + (1+t) = 4$, luego $p \in \mathcal{P}$. Así se probó que $\mathcal{L}_1 \subset \mathcal{P}$.
- Sea $p \in \mathcal{L}_2$, luego existe $t \in \mathbb{R}$ tal que $p = (1, 0, 3) + t(2, 1, -1) = (2t+1, t, 3-t)$, entonces evaluamos p en la expresión que define a \mathcal{P} : $(2t+1) - (t) + (3-t) = 4$, luego $p \in \mathcal{P}$. Así se probó que $\mathcal{L}_2 \subset \mathcal{P}$.
- Sea $p \in \mathcal{L}_3$, luego existe $t \in \mathbb{R}$ tal que $p = (-1, 2, 7) + t(-4, 1, 5) = (-4t-1, t+2, 5t+7)$, entonces evaluamos p en la expresión que define a \mathcal{P} : $(-4t-1) - (t+2) + (5t+7) = 4$, luego $p \in \mathcal{P}$. Así se probó que $\mathcal{L}_3 \subset \mathcal{P}$.

□

Problema 2. Sea la función $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, dada por:

$$f(x, y, z) = \begin{cases} \frac{xyz}{x^2 + y^2 + z^2} & ; (x, y, z) \neq (0, 0, 0) \\ 0 & ; (x, y, z) = (0, 0, 0). \end{cases}$$

Demuestre que esta función es continua en \mathbb{R}^3 .

Solución. Para $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$ tenemos que la función f es continua, por álgebra de funciones continuas.

Para $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ tenemos que demostrar que $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} f(x, y, z) = 0$. Primero tenemos que $|x| \leq \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, $|y| \leq \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ y $|z| \leq \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, (**2 puntos**) entonces:

$$\begin{aligned} \left| \frac{xyz}{x^2 + y^2 + z^2} - 0 \right| &= \left| \frac{xyz}{x^2 + y^2 + z^2} \right| \\ &= \frac{|xyz|}{x^2 + y^2 + z^2} \\ &= \frac{|x| |y| |z|}{x^2 + y^2 + z^2} \\ &\leq \frac{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}{x^2 + y^2 + z^2} \\ &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \end{aligned}$$

y usando el teorema del sándwich, tenemos que $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xyz}{x^2 + y^2 + z^2} = 0$, por lo que la función es continua en $(0, 0, 0)$.

O sea que f es continua en todo $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

□

Problema 3. Considerar la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x) = \begin{cases} x, & |x| \leq \pi \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

a) Calcular la integral de Fourier y analizar la convergencia.

b) Usar lo anterior para calcular el valor de $\int_0^\infty \left(\frac{1 - \cos(2t) - t \sin(2t)}{t^2} \right) dt$
(sugerencia: $\sin(2\theta) = 2 \sin(\theta) \cos(\theta)$, $1 - \cos(2\theta) = 2 \sin^2(\theta)$)

Solución.

a) La función f es impar, entonces $A(\omega) = 0$, $\forall \omega \geq 0$ y

$$\begin{aligned} B(\omega) &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x \sin(x\omega) dx \\ &= -\frac{2x \cos(x\omega)}{\pi\omega} + \frac{2 \sin(x\omega)}{\pi\omega^2} \Big|_{x=0}^{x=\pi} \end{aligned}$$

$$= -\frac{2\pi \cos(\pi\omega)}{\pi\omega} + \frac{2 \sin(\pi\omega)}{\pi\omega^2}$$

$$B(\omega) = -\frac{2 \cos(\pi\omega)}{\omega} + \frac{2 \sin(\pi\omega)}{\pi\omega^2}$$

Como la función f es absolutamente integrable y es continua , por el teorema de convergencia se tiene que:

$$f(x) = \int_0^\infty \left(-\frac{2 \cos(\pi\omega)}{\omega} + \frac{2 \sin(\pi\omega)}{\pi\omega^2} \right) \sin(x\omega) d\omega$$

b) De lo anterior:

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{2} &= \int_0^\infty \underbrace{\left(-\frac{2 \cos(\pi\omega)}{\omega} + \frac{2 \sin(\pi\omega)}{\pi\omega^2} \right) \sin(\pi\omega)}_{t:=\pi\omega} d\omega \\ &= \frac{f(\pi^+) + f(\pi^-)}{2} = \int_0^\infty \left(-\frac{2 \cos(t)}{t/\pi} + \frac{2 \sin(t)}{\pi t^2/\pi^2} \right) \sin(t) \frac{dt}{\pi} \\ &= \pi \int_0^\infty \left(\frac{-t \sin(2t) + 1 - \cos(2t)}{t^2} \right) \frac{dt}{\pi} \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\int_0^\infty \left(\frac{1 - \cos(2t) - t \sin(2t)}{t^2} \right) dt = \frac{\pi}{2}$$

□