



Formalismo Lagrangiano da teoria Gravitoeletromagnética

Lucas Evangelista Alves de Souza
Orientador: Alesandro Ferreira dos Santos

Programa de Pós-Graduação em Física
Universidade Federal de Mato Grosso

- 1 Resumo
- 2 Introdução
- 3 Descrição do campo gravitoeletromagnético
- 4 Formulação de um tensor energia-momento para a GEM
- 5 Algumas aplicações
- 6 Conclusão e Perspectivas

- Formulação Lagrangiana para a GEM;

- Formulação Lagrangiana para a GEM;
- A aproximação é análoga àquela feita em eletromagnetismo;

- Formulação Lagrangiana para a GEM;
- A aproximação é análoga àquela feita em eletromagnetismo;
- O tensor gravitoeletromagnético é definido em termos de um potencial tensor de segunda ordem;

- Formulação Lagrangiana para a GEM;
- A aproximação é análoga àquela feita em eletromagnetismo;
- O tensor gravitoeletromagnético é definido em termos de um potencial tensor de segunda ordem;
- Tensor energia-momento simétrico;

- Formulação Lagrangiana para a GEM;
- A aproximação é análoga àquela feita em eletromagnetismo;
- O tensor gravitoeletromagnético é definido em termos de um potencial tensor de segunda ordem;
- Tensor energia-momento simétrico;
- A Lagrangiana descreve interação entre férmions, fótons e grávitons;

- Formulação Lagrangiana para a GEM;
- A aproximação é análoga àquela feita em eletromagnetismo;
- O tensor gravitoeletromagnético é definido em termos de um potencial tensor de segunda ordem;
- Tensor energia-momento simétrico;
- A Lagrangiana descreve interação entre férmions, fótons e grávitons;

- O que é Gravitoeletromagnetismo (GEM)?

- O que é Gravitoeletromagnetismo (GEM)?
- De que maneira podemos abordar essa teoria?

- O que é Gravitoeletromagnetismo (GEM)?
- De que maneira podemos abordar essa teoria?
 - Similaridade entre as equações linearizadas de Einstein e Maxwell;
 - Decomposição dos tensores de curvatura de Weyl;

- O que é Gravitoeletromagnetismo (GEM)?
- De que maneira podemos abordar essa teoria?
 - Similaridade entre as equações linearizadas de Einstein e Maxwell;
 - Decomposição dos tensores de curvatura de Weyl;
- Qual a motivação em estudar a GEM?

- O que é Gravitoeletromagnetismo (GEM)?
- De que maneira podemos abordar essa teoria?
 - Similaridade entre as equações linearizadas de Einstein e Maxwell;
 - Decomposição dos tensores de curvatura de Weyl;
- Qual a motivação em estudar a GEM?
 - Interação entre o gráviton e partículas, tais como férmions e fótons;
 - Pode nos levar a questões quânticas da gravidade;

Partindo das equações de Campo de Einstein e das identidades de Bianchi é possível escrever o tensor de curvatura de Weyl como

$$C_{\alpha\beta\mu\nu}{}^{;\nu} = 4\pi G(-T_{\mu\beta;\alpha} + T_{\mu\alpha;\beta} + \frac{1}{3}T_{,\alpha}g_{\mu\beta} - \frac{1}{3}T_{,\beta}g_{\mu\alpha}).$$

A vantagem de utilizar o tensor de Weyl está em suas propriedades. Com isso em mente, o mesmo pode ser decomposto em dois tensores simétricos, definidos como

Tensor gravitoeletrico

$$\mathbf{E}_{ij} = -C_{0i0j}$$

Tensor gravitomagnético

$$\mathbf{B}_{ij} = \frac{1}{2}\epsilon_{ikl}C_{0j}^{kl}$$

onde $i, j, k, \dots = 1, 2, 3$.

Para construir uma teoria gravitoeletromagnética, partimos das equações tipo-Maxwell em espaço-tempo plano para sistemas com fonte

$$\partial^i \mathbf{E}^{ij} = 4\pi G \rho^j, \quad (1)$$

$$\partial^i \mathbf{B}^{ij} = 0, \quad (2)$$

$$\varepsilon^{\langle ikl} \partial^k \mathbf{B}^{lj} \rangle - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}^{ij}}{\partial t} = \frac{4\pi G}{c} \mathbf{J}^{ij}, \quad (3)$$

$$\varepsilon^{\langle ikl} \partial^k \mathbf{E}^{lj} \rangle + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}^{ij}}{\partial t} = 0, \quad (4)$$

onde \mathbf{E}^{ij} e \mathbf{B}^{ij} são rank-2 STT, ρ^j é o vetor densidade de massa e J^{ij} é a densidade de corrente de massa. Para os campos \mathbf{E} e \mathbf{B} temos que

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= -grad \varphi - \frac{1}{c} \frac{\partial \tilde{A}}{\partial t} \\ \mathbf{B} &= curl \tilde{A}, \end{aligned} \quad (5)$$

Como \tilde{A} é STT, então os elementos diagonais da matriz satisfazem

$$A^{11} + A^{22} + A^{33} = 0,$$

que de forma análoga se aplica ao tensor $grad\varphi$ onde

$$\partial^1\varphi^1 + \partial^2\varphi^2 + \partial^3\varphi^3 = 0.$$

Logo, em termos de componentes temos que

$$\mathbf{E}^{ij} = - \begin{pmatrix} \partial^1\varphi^1 & \partial^1\varphi^2 & \partial^1\varphi^3 \\ \partial^1\varphi^2 & \partial^2\varphi^2 & \partial^2\varphi^3 \\ \partial^1\varphi^3 & \partial^2\varphi^3 & \partial^3\varphi^3 \end{pmatrix} - \frac{1}{c} \partial_t \begin{pmatrix} A^{11} & A^{12} & A^{13} \\ A^{12} & A^{22} & A^{23} \\ A^{13} & A^{23} & A^{33} \end{pmatrix},$$

e

$$\mathbf{B}^{ij} = \varepsilon^{\langle ikl} \partial^k A^{lj} \rangle.$$

Os campos \mathbf{E} e \mathbf{B} são elementos de uma tensor de terceira ordem chamado de tensor gravitoeletromagnético \mathbf{F} , definido como

$$\mathbf{F}^{\mu\nu\alpha} = \partial^\mu A^{\nu\alpha} - \partial^\nu A^{\mu\alpha}, \quad (6)$$

onde $\mu, \nu, \alpha = 0, 1, 2, 3$. Além disso, é possível escrever os elementos do tensor simétrico $A^{\mu\nu}$ como

$$A = \begin{pmatrix} A^{00} & A^{01} & A^{02} & A^{03} \\ A^{10} & A^{11} & A^{12} & A^{13} \\ A^{20} & A^{21} & A^{22} & A^{23} \\ A^{30} & A^{31} & A^{32} & A^{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varphi^0 & \varphi^1 & \varphi^2 & \varphi^3 \\ \varphi^1 & A^{11} & A^{12} & A^{13} \\ \varphi^2 & A^{21} & A^{22} & A^{23} \\ \varphi^3 & A^{31} & A^{32} & A^{33} \end{pmatrix}.$$

$A^{\mu\nu}$ está conectada diretamente com a descrição do campo gravitacional no espaço-tempo plano, diferente de $h_{\mu\nu}$

O campo da GEM é antissimétrico, ou seja

$$\mathbf{F}^{\mu\nu\alpha} = -\mathbf{F}^{\nu\mu\alpha},$$

e o mesmo obedece à identidade cíclica

$$\mathbf{F}^{\mu\nu\alpha} + \mathbf{F}^{\nu\alpha\mu} + \mathbf{F}^{\alpha\mu\nu} = 0.$$

As componentes não-nulas de \mathbf{F} são definidas como

$$\mathbf{F}^{0ij} = \mathbf{E}^{ij}, \quad \mathbf{F}^{ijk} = \epsilon^{ijl} \mathbf{B}^{lk}.$$

Note que as componentes $\mathbf{F}^{100}, \mathbf{F}^{200}, \mathbf{F}^{300}, \mathbf{F}^{010}, \mathbf{F}^{020}$ e \mathbf{F}^{030} são nulas e nos levam a seguinte condição: $\nabla\varphi^0 + \frac{1}{c} \frac{\partial\varphi^i}{\partial t} = 0$.

Definimos então o *tensor dual gravitoeletromagnético* \mathbf{G}

$$\mathbf{G}^{\mu\nu\alpha} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\gamma\sigma}\eta^{\alpha\beta}\mathbf{F}_{\gamma\sigma\beta},$$

onde

$$\mathbf{F}_{\gamma\sigma\beta} = \eta_{\gamma\mu}\eta_{\sigma\nu}\eta_{\beta\alpha}\mathbf{F}^{\mu\nu\alpha}.$$

Portanto, reescrevendo as Eqs. tipo-Maxwell na forma covariante, temos

$$\begin{aligned}\partial_\mu \mathbf{F}^{\mu\nu\alpha} &= -\frac{4\pi G}{c}\mathcal{J}^{\nu\alpha} \\ \partial_\mu \mathbf{G}^{\mu\langle\nu\alpha\rangle} &= 0,\end{aligned}\tag{7}$$

onde $\mathcal{J}^{\nu\alpha}$ é um tensor de segunda ordem que depende de $c\rho^i$ e \mathbf{J}^{ij} . Assim, a lagrangiana da GEM pode ser escrita como

$$\boxed{\mathcal{L}_{GEM} = -\frac{1}{16\pi}\mathbf{F}_{\mu\nu\alpha}\mathbf{F}^{\mu\nu\alpha} - G\mathcal{J}^{\nu\alpha}A_{\nu\alpha}},\tag{8}$$

onde G é a constante gravitacional.

Formulação de um tensor energia-momento para a GEM

Vamos começar primeiro com a definição usual da Lagrangiana livre associada a GEM, que é escrita como

$$\mathcal{L}_G = -\frac{1}{16\pi G} \mathbf{F}_{\rho\sigma\theta} \mathbf{F}^{\rho\sigma\theta}.$$

Por definição, temos que o tensor-energia momento é escrito como segue

$$T_G^{\mu\nu} = \eta^{\mu\nu} \mathcal{L}_G - \frac{\partial \mathcal{L}_G}{\partial (\partial_\mu A^{\alpha\beta})} (\partial^\nu A^{\alpha\beta}),$$

onde a partir do mesmo obtemos para a GEM

$$T_G^{\mu\nu} = \eta^{\mu\nu} \mathcal{L}_G + \frac{1}{4\pi G} \eta^{\gamma\mu} \mathbf{F}_{\gamma\alpha\beta} (\partial^\nu A^{\alpha\beta}).$$

O tensor energia-momento simétrico é

$$\Theta_G^{\mu\nu} = -\frac{1}{4\pi G} [\eta^{\gamma\mu} \mathbf{F}_{\gamma\alpha\beta} \mathbf{F}^{\alpha\nu\beta} + \frac{1}{4} \eta^{\mu\nu} \mathbf{F}_{\rho\sigma\theta} \mathbf{F}^{\rho\sigma\theta}].$$

com $\partial_\mu \Theta_G^{\mu\nu} = 0$.

■ Espalhamento Compton gravitacional




Figura: Diagrama de Feynman para o espalhamento Compton gravitacional

■ Espalhamento Möller gravitacional




Figura: Diagrama de Feynman para o espalhamento Möller gravitacional

■ Fotoprodução gravitacional




Figura: Fotoprodução gravitacional: Diagrama de Born

- A formulação lagrangiana da GEM nos permite descrever interações entre o gráviton e outras partículas;
- A decomposição dos tensores de Weyl nos permite descrever um tensor simétrico $A^{\mu\nu}$;
- A formulação do tensor $A^{\mu\nu}$ nos permite descrever partículas de spin 2;
- É possível aplicar esse formalismo a processos físicos conhecidos;

Fim!

