

$$\frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{c_1} v Z f_1(x, H) \gamma_{1,0,1} = 0$$

c_1 , v , Z and $\gamma_{1,0,1}$ are independent from x .

Therefore,

$$f_1(x, H) = \frac{c_1}{v Z \gamma_{1,0,1}} A$$

A is constant.

$$v Z \frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{c_1} f_0(x, H) \gamma_{0,1,1} = -Z \frac{f_1(x, H)}{\tau}$$

$$f_0(x, H) = \frac{c_1^2}{\tau v^2 Z \gamma_{1,0,1} \gamma_{0,1,1}} Bx + C$$

B and C are constant

We can calculate $\gamma_{1,0,1}$, $\gamma_{0,1,1}$ and c_1 .

$$\gamma_{1,0,1} = \gamma_{0,1,1} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$$

$$c_1 = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$$

Finally,

$$f_0(x, H) = \frac{2}{\tau v^2 Z} Bx + C$$

$$f_1(x, H) = \frac{\sqrt{2}}{v Z} A$$

Graphene

$$Z = \frac{1}{(2\pi)^2} \frac{\varepsilon}{(\hbar v_F)^2}$$

$$f_0(x, H) = \frac{8\hbar^2 \pi^2}{\varepsilon \tau} Bx + C$$

$$f_1(x, H) = \frac{4\sqrt{2} \pi^2 \hbar^2 v_F}{\varepsilon} A$$

Parabolic

$$Z = \frac{1}{(2\pi)^2} \frac{m}{\hbar^2}$$

$$f_0(x, H) = \frac{8\hbar^2\pi^2}{mv^2\tau} Bx + C = \frac{4\hbar^2\pi^2}{\varepsilon\tau} Bx + C$$

$$f_1(x, H) = \frac{4\sqrt{2}\pi^2\hbar^2}{mv} A = \frac{4\sqrt{2}\pi^2\hbar}{k} A = \frac{4\pi^2\hbar^2}{\sqrt{m\varepsilon}} A$$