

Ma trận của ánh xạ tuyến tính

Nguyễn Hoàng Thạch

nhthach@math.ac.vn

19/05/2020

Tóm tắt

1 Ma trận của ánh xạ tuyến tính

2 Ma trận đồng dạng

Tóm tắt

1 Ma trận của ánh xạ tuyến tính

2 Ma trận đồng dạng

Ma trận chính tắc

Xét ánh xạ tuyến tính $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Gọi $B = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ và $B' = \{\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_m\}$ tương ứng là các cơ sở chính tắc của \mathbb{R}^n và \mathbb{R}^m .

Định nghĩa

Ma trận chính tắc của T là ma trận $A \in M_{m,n}$ gồm n cột $T(\mathbf{e}_1), T(\mathbf{e}_2), \dots, T(\mathbf{e}_n)$. Cụ thể, $A = (a_{ij})$ sao cho

$$T(\mathbf{e}_j) = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix},$$

với mọi $j = 1, 2, \dots, n$.

Nhận xét: Nếu A là ma trận chính tắc của ánh xạ tuyến tính $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ thì với mọi $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, $T(\mathbf{v}) = A\mathbf{v}$

Ma trận của ánh xạ tuyến tính

Thí dụ: $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ sao cho $T(x, y, z) = (x - 2y, 2x + y)$

Ta có:

$$T(\mathbf{e}_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, T(\mathbf{e}_2) = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}, T(\mathbf{e}_3) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

do đó ma trận chính tắc của T là:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Hợp thành của hai ánh xạ tuyến tính

Định nghĩa

Cho $T_1 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ và $T_2 : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$ là các ánh xạ tuyến tính. **Ánh xạ hợp thành** của T_1 và T_2 , ký hiệu là $T_2 \circ T_1$, là một ánh xạ $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ được định nghĩa bởi

$$(T_2 \circ T_1)(\mathbf{v}) = T_2(T_1(\mathbf{v})).$$

Định lý

Nếu T_1 và T_2 là các ánh xạ tuyến tính thì $T_2 \circ T_1$ cũng là một ánh xạ tuyến tính. Nếu A_1 và A_2 là các ma trận chính tắc của T_1 và T_2 thì ma trận chính tắc của $T_2 \circ T_1$ là $A_2 A_1$.

Thí dụ: $T_1 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T_1(x, y, z) = (2x + y, 0, x + z)$, $T_2 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$,
 $T_2(x, y, z) = (x - y, z, y)$.
 $(T_2 \circ T_1)(x, y, z) = (2x + y, x + z, 0)$
 $(T_1 \circ T_2)(x, y, z) = (2x - 2y + z, 0, x)$

Ánh xạ tuyến tính khả nghịch

Định nghĩa

Nếu các ánh xạ tuyến tính $T_1 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ và $T_2 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ thỏa mãn $T_2 \circ T_1 = T_1 \circ T_2 = id$ thì ta nói rằng T_1 **khả nghịch** và T_2 là **ánh xạ nghịch đảo** của T_1 .

Nhận xét:

- Nếu $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ khả nghịch thì $m = n$.
- Nếu T là một ánh xạ tuyến tính khả nghịch thì ánh xạ nghịch đảo của nó là duy nhất và được ký hiệu là T^{-1} .

Định lý

Cho ánh xạ tuyến tính $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ với ma trận chính tắc A . Các khẳng định sau là tương đương:

- 1 T là khả nghịch.
- 2 T là một đẳng cấu.
- 3 A là khả nghịch.

Hơn nữa, nếu T là khả nghịch thì ma trận chính tắc của T^{-1} là A^{-1} .

Ảnh xạ tuyến tính khả nghịch

Thí dụ: $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ sao cho

$$T(x, y, z) = (2x + 3y + z, 3x + 3y + z, 2x + 4y + z).$$

Ma trận chính tắc của T là $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$.

Ma trận này khả nghịch và $A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 6 & -2 & -3 \end{pmatrix}$

Từ đó, T là khả nghịch và $T^{-1}(x, y, z) = (-x + y, -x + z, 6x - 2y - 3z)$.

Không gian và cơ sở bất kỳ

Cho V, W là các không gian vector hữu hạn chiều. Giả sử $B = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ và $B' = \{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m\}$ tương ứng là cơ sở của V và W .

Định nghĩa

Ma trận của T trong cặp cơ sở B, B' là ma trận $A = (a_{ij}) \in M_{m,n}$ sao cho với mọi $j = 1, \dots, n$:

$$[T(\mathbf{v}_j)]_{B'} = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}.$$

Mệnh đề

Nếu A là ma trận của ánh xạ tuyến tính $T : V \rightarrow W$ trong cặp cơ sở B, B' thì với mọi $\mathbf{v} \in V$,

$$[T(\mathbf{v})]_{B'} = A[\mathbf{v}]_B.$$

Không gian và cơ sở bất kỳ

Thí dụ: $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (x + y, 2x - y)$.

$B = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\} = \{(1, 2), (-1, 1)\}$, $B' = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$.

Ta có:

$$T(\mathbf{u}_1) = (3, 0) = 3\mathbf{e}_1 + 0\mathbf{e}_2$$

$$T(\mathbf{u}_2) = (0, -3) = 0\mathbf{e}_1 - 3\mathbf{e}_2$$

Từ đó, ma trận của T trong cặp cơ sở B, B' là $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$.

Ma trận của ánh xạ hợp thành

Cho U, V, W là các không gian vector hữu hạn chiều và B, B', B'' tương ứng là cơ sở của U, V, W .

Định lý

Nếu $T_1 : U \rightarrow V$ và $T_2 : V \rightarrow W$ là các ánh xạ tuyến tính thì $T_2 \circ T_1$ cũng là một ánh xạ tuyến tính.

Hơn nữa, nếu A_1 là ma trận của T_1 trong cặp cơ sở B, B' và A_2 là ma trận của T_2 trong cặp cơ sở B', B'' thì $A_2 A_1$ là ma trận của $T_2 \circ T_1$ trong cặp cơ sở B, B'' .

Ma trận của ánh xạ khả nghịch

Định nghĩa

Một ánh xạ tuyến tính $T_1 : V \rightarrow V$ là **khả nghịch** nếu tồn tại một ánh xạ tuyến tính $T_2 : V \rightarrow V$ sao cho $T_1 \circ T_2 = T_2 \circ T_1 = id$.

Khi đó, T_2 được gọi là **ánh xạ nghịch đảo** của T_1 .

Mệnh đề

Nếu $T : V \rightarrow V$ là khả nghịch thì ánh xạ nghịch đảo của nó là duy nhất. Khi đó, ánh xạ nghịch đảo của T được ký hiệu là T^{-1} .

Định lý

Cho ánh xạ tuyến tính $T : V \rightarrow V$ với ma trận A trong cơ sở B . Các khẳng định sau là tương đương:

- 1 T là khả nghịch.
- 2 T là một đẳng cấu.
- 3 A là khả nghịch.

Hơn nữa, nếu T là khả nghịch thì ma trận của T^{-1} trong cơ sở B là A^{-1} .

Tóm tắt

1 Ma trận của ánh xạ tuyến tính

2 Ma trận đồng dạng

Chuyển cơ sở

Cho V là một không gian tuyến tính hữu hạn chiều, B và B' là hai cơ sở của V và $T : V \rightarrow V$ là một ánh xạ tuyến tính.

Gọi A (tương ứng, A') là ma trận của T trong cơ sở B (tương ứng, B'). Gọi P là ma trận chuyển cơ sở từ B sang B' .

Định lý

$$A' = P^{-1}AP.$$

Chứng minh: Với mọi $\mathbf{v} \in V$, ta có $[T(\mathbf{v})]_B = A[\mathbf{v}]_B$; $[T(\mathbf{v})]_{B'} = A'[\mathbf{v}]_{B'}$; $[\mathbf{v}]_B = P[\mathbf{v}]_{B'}$; $[T(\mathbf{v})]_{B'} = P^{-1}[T(\mathbf{v})]_B$.

Kết hợp lại:

$$[T(\mathbf{v})]_{B'} = P^{-1}[T(\mathbf{v})]_B = P^{-1}A[\mathbf{v}]_B = P^{-1}AP[\mathbf{v}]_{B'}.$$

Suy ra $P^{-1}AP$ cũng là ma trận của T trong cơ sở B' , do đó $P^{-1}AP = A'$.

Chuyển cơ sở

Thí dụ: $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (2x - 2y, -x + 3y)$, B là cơ sở chính tắc và $B' = \{(1, 0), (1, 1)\}$.

Ta có $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Từ đó $A' = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$

Ma trận đồng dạng

Định nghĩa

Hai ma trận vuông cấp n A và A' được gọi là **đồng dạng** với nhau nếu tồn tại một ma trận khả nghịch P (cấp n) sao cho $A' = P^{-1}AP$.

Định lý

Cho các ma trận vuông cùng cấp A, B, C . Khi đó:

- 1 A đồng dạng với chính nó.
- 2 Nếu A đồng dạng với B thì B đồng dạng với A .
- 3 Nếu A đồng dạng với B và B đồng dạng với C thì A đồng dạng với C .

Nhận xét: Hai ma trận của cùng một ánh xạ tuyến tính trong hai cơ sở khác nhau là hai ma trận đồng dạng với nhau.