

A close-up photograph of a dental wax block being shaped by a metal dental instrument. The wax is translucent and yellowish, and the instrument is a polished metal. The background is blurred, showing other dental models.

Odontologie Restauratrice - Séance 1

Enseignements pratiques - DFGSO2

19/09/2022

-
- ❖ Polycopié de TP en ligne
 - ❖ Les présentations seront mise en ligne au fur et à mesure
 - ❖ Veuillez à respecter les règles de bienséances (cf Poly TP)
 - ❖ Planning et roulement de TP (cf Poly TP)

Les instruments d'Examens

Miroir

- ➡ voir
- ➡ transmettre la lumière
- ➡ écarter les tissus mous : joues, langue



Les instruments d'Examens

Les sondes



Sonde n° 6 :

Recherche de cavités de carie sur les surfaces occlusales



DG 16:

Recherche des entrées canales en endodontie
TP D1



Sonde n° 17 :

Recherche de cavités de carie inter-proximal
Mise en évidence des surplombs cavitaires




Sonde parodontale :

Mesure des poches parodontales
En TP : mesure de la profondeur des cavités

Les instruments d'Examens

Les précelles



Elles sont le prolongement des doigts du praticien dans la bouche du patient

Elles servent à transporter en bouche rouleaux, boulettes de coton, coins interdentaires, etc...

Les instruments de préparation manuelle

L'excavateur



Curetage de la dentine ramollie

Les instruments de préparation rotative

Les rotatifs et les fraises



Turbine :

150 000 à 300 000 t/min

➡ Fraises diamantées :

Boules, cylindriques

Préparation cavitaire



Contre-angle bague bleue :

15 000 à 30 000 t/min

➡ Fraises carbure de tungstène :

Curetage carieux



Les instruments d'obturation

Les spatules



Spatule à insérer ou spatule de bouche :

transport en bouche et application de divers matériaux




Spatule à malaxer :

sert à la préparation extra-buccale de divers matériaux.

Ne doit jamais entrer en bouche.

Le champ opératoire



Pince d'Ainsworth



Pince de Brewer



Cadre à digne

Crampons



Classification des lésions carieuses

- Classification de Black
 - Classification SiSta
 - Classification ICDAS

Classification des lésions carieuses

Classification de Black

Classification **topographique** de Black (1904)

5 classes, en fonction du site de la lésion carieuse

Ne tient pas compte du **stade d'évolution** de la lésion carieuse

Class I



Class II



Class III



Class IV



Class V



Classification des lésions carieuses

Classification SiSta

Concept SiSta (2000) – Pr Lasfargues

Guide thérapeutique d'odontologie préventive, adhésive et restauratrice

SiSta = **Site** et **Stade**

Diagnostic des lésions carieuses en fonction :

- ➡ du site de cariosusceptibilité
- ➡ du stade évolutif de la lésion

3 Sites

5 Stades

Classification des lésions carieuses

3 Sites

Classification SiSta

➡ Site 1 = Occlusal

Lésions carieuses initiées au niveau des **puits, sillons, fosses, cingulum** et autres **défauts coronaires des faces occlusales**. *Remplace la Classe I de Black*



➡ Site 2 = Proximal

Lésions carieuses initiées au niveau des aires de contact entre les dents adjacentes antérieures et postérieures. *Remplace les Classes II, III et IV de Black*



➡ **Site 3 = Cervical** Les lésions initiées au niveau du tiers cervical de la couronne. Toute lésion au voisinage du rebord gingival sur toute la circonférence de la dent, au niveau coronaire/ radiculaire. *Remplace la Classe V de Black*



Classification des lésions carieuses

5 Stades

Classification SiSta

	Stade 0	Lésion initiale active, superficielle, sans cavitation	Traitement préventif non invasif
	Stade 1	Lésion avec micro-cavitations de surface dans le 1/3 externe de la dentine	Intervention restauratrice <i>a minima</i>
	Stade 2	Lésion cavitaire de taille modérée jusqu'au 1/3 médian dentinaire sans affaiblissement cuspidien	
	Stade 3	Lésion cavitaire étendue jusqu'au 1/3 dentinaire profond avec affaiblissement cuspidien	Comblement & Renforcement des structures résiduelles
	Stade 4	Lésion atteignant les zones para-pulpaire et destruction d'une partie des cuspides	Recouvrement coronaire partiel ou total

Classification des lésions carieuses

Classification ICDAS


ICDAS (2001) – Dr Pitts et Ismail

International Caries Detection and Assessment System
Outil d'aide à la détection et à l'évaluation des lésions carieuses


Utilisable en recherche comme en pratique clinique

Système de détection fondé sur les **signes visuels objectivables** lors de l'**inspection visuelle** des **surfaces dentaires nettoyées et séchées**.




Indicateur des **lésions cavitaires ET non cavitaires**
Aide au choix thérapeutique

Critères de détection visuelle des lésions	Code ICDAS II	Sévérité de la lésion rapprochement histologique	Illustration clinique	Options thérapeutiques
Surface dentaire saine	0	Absence de modification histopathologique		Conseils préventifs
Premier changement visuel de l'émail détectable par séchage 1w (<i>white spot</i>) ou 1b (<i>brown spot</i>)	1	Déminéralisation $\leq 1/3$ externe de l'émail à la jonction amélo-dentinaire		Intervention <i>a minima</i> Soins non invasifs par procédés de reminéralisation et scellement (fluoruration et infiltration de résine)
Changement visuel nettement visible de l'émail sans séchage 2w (<i>white</i>) ou 2b (<i>brown</i>)	2	Déminéralisation $\leq 1/3$ interne de l'émail à la jonction amélo-dentinaire		Gestion des facteurs de risque, conseils préventifs
Rupture localisée de l'émail sans exposition dentinaire visible	3	Déminéralisation $\leq 1/3$ externe dentinaire		Intervention <i>a minima</i> Restauration adhésive ultra-conservatrice
Émail opaque grisâtre caractéristique d'une lésion dentinaire sous-jacente, avec ou sans cavitation amélaire	4	Déminéralisation $\leq 1/3$ médian dentinaire sans fragilisation des structures axiales coronaires		Gestion des facteurs de risque, conseils préventifs
Cavité amélo-dentinaire franche avec exposition de dentine cariée	5	Déminéralisation $\leq 1/3$ médian dentinaire avec fragilisation relative des structures axiales coronaires		Dentisterie opératoire Restauration coronaire fonctionnelle directe ou indirecte
Cavité amélo-dentinaire étendue et profonde avec exposition de dentine cariée	6	Déminéralisation $\geq 1/3$ interne dentinaire avec perte partielle des structures cuspidiennes coronaires		Gestion des facteurs de risque, conseils préventifs

Terminologie



Face mésiale




Terminologie

Faces ?

Dent n° ?

Parois ?




Terminologie

Faces :

- 1 Vestibulaire
- 2 Mésiale
- 3 Linguale
- 4 Distale

Dent n° 36



Parois :

- A Mésiale
- B Pulpaire
- C Cervicale

À réaliser au cours de la séance :

❖ Réalisation de **cavités de site 1** :

- ▶ 34 (pour la séance 3)
- ▶ 36 (pour la séance 4)
- ▶ 35 / 45 et 46 (pour la séance 5)

