

ターゼナを服用される方へ

監修：岩田広治 先生


名古屋市立大学大学院医学研究科 共同研究教育センター
臨床研究戦略部 特任教授

医療機関名

担当医名/緊急連絡先

かかりつけ薬局名

薬剤師名/緊急連絡先



はじめに ターゼナを服用される方へ

転移・再発乳がんにおける治療は、

- ・癌による症状の緩和
- ・癌による症状出現の先送り
- ・生存期間の延長

を念頭に、薬物療法などを行っていきます¹⁾。

「BRCA遺伝子変異陽性」乳がんの治療には、PARP阻害薬が有効にはたらく可能性があります。

PARP阻害薬ターゼナは、BRCA遺伝子変異陽性の進行乳がん*患者さんの治療選択肢の1つです。

この冊子では、ターゼナによる治療について知っていただき、服薬を続けられるように、服用方法や主な副作用とその対策、日常生活の注意点などについてまとめています。

- ▶ お薬の服用方法や副作用について理解することは、よりよい治療を行う上でとても大切なことです。
- ▶ わからないこと、詳しく知りたいこと、不安に思うことがあれば、担当医や看護師、薬剤師に相談してください。



下記の項目にあてはまる方は、あらかじめ担当医にお伝えください

- 市販されているものを含め、現在何らかのお薬を使用中の方
- 他の医師、歯科医師による治療を受けている、またはこれから受けようとしている方
- 以前にターゼナを服用し、アレルギー症状が出た方
- 以前に腎臓の機能低下を指摘されたことのある方
- 妊娠中または妊娠している可能性のある女性
- 授乳中の女性

1) 日本乳癌学会 編: 乳癌診療ガイドライン 2022年版, 金原出版, 2022
* がん化学療法歴のあるBRCA遺伝子変異陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌

目次

▶ ターゼナのはたらき	5
▶ ターゼナについて	6
▶ ターゼナの服用について	8
▶ ターゼナの副作用	10
• 骨髄抑制	
貧血(赤血球の減少)	11
感染症(好中球の減少)	12
出血(血小板の減少)	12
• 間質性肺疾患	13
• 血栓塞栓症	13
• 二次性悪性腫瘍	14
• その他の主な副作用	
(疲労／倦怠感、食欲減退／吐き気、脱毛)	14
▶ 日常生活のアドバイスと副作用対策Q&A	16
▶ ターゼナによる治療のサポートツール	18
▶ 療養生活で困ったときには	19


ターゼナのはたらき

- ▶ 遺伝子を構成しているDNAは、日常的にさまざまな原因で傷つきますが、傷を修復して生き残るためのシステムが備わっています。
- ▶ この修復をサポートしているのが、PARPとBRCAという2つのたんぱくです。

P PARPたんぱく B BRCAたんぱく

1


BRCA遺伝子変異陽性乳がん細胞では、BRCAによる修復はうまくはたかりませんが、PARPによって遺伝子が修復されて生き残ります。



2

ターゼナを服用することで

ターゼナはPARPのはたらきを妨げます。BRCAがはたらかないがん細胞に作用すると、DNA損傷は修復されず、がん細胞は死に至ります。



ターゼナについて

どのようなお薬ですか？

▶ターゼナは、カプセルの飲み薬でブリストアシート(下の写真)に封入されています。

▶ターゼナを取り出すときの注意点 詳しくはP9

ターゼナの剤形(実物大)



ターゼナカプセル 1mg



ターゼナカプセル 0.25mg

ターゼナのブリストアシート



こういった患者さんに使われるお薬ですか？

ターゼナは、**BRCA遺伝子変異陽性**の進行乳がんを治療するためのお薬*です。また、前立腺がんの患者さんにも使われています。



*がん化学療法歴のあるBRCA遺伝子変異陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌

治療に関する注意点

▶ターゼナは決められたスケジュールで正しく服用しないと、十分な効果が得られなくなる可能性があります。ご自身の判断でターゼナの服用をやめたり、服用する量を加減したりせず、必ず担当医または薬剤師の指示どおりに服用してください。

詳しくはP8

▶ターゼナを服用すると、ご自身では気づかない副作用(血液細胞が減少するなど)があらわれる可能性があります。治療中は、こうした副作用があらわれていないかどうかを血液検査で定期的にチェックします。担当医から指示された検査は必ず受けるようにしてください。

詳しくはP10

保管に関する注意点



高温な場所には置かない



衝撃を与えない



子どもの手が届く場所には置かない

ターゼナの服用について

ご自身の判断で服用を中止したり、服用する量を加減したりせず、必ず担当医や薬剤師の指示どおりに服用してください。

服用について

ターゼナは、**1日1回 毎日服用**するお薬です。
(食事の前や後に服用する等の決まりはなく、ご自身で服用する時間帯を設定してください)



飲み忘れた場合の対応：

- 気づいた時に1回分を服用してください。ただし、次の服用時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分を服用します。
- 決して、1日に2回分を服用しないでください。

例：1回分
のとき




**誤って多く服用してしまった場合は、
速やかに担当医や看護師、薬剤師に連絡してください**


服用に関する注意点

- ▶ お薬の破損を防ぐため、ブリスターシート裏側のアルミをはがして取り出して服用してください。


《正しい取り出し方法》



切り取り線に沿ってブリスターシートを折り曲げる




ブリスターシートを1カプセル分にちぎる



裏側のアルミを矢印の方向にはがして取り出す



《誤った取り出し方法》



無理に押し出さないでください

アルミをはがさず、ブリスターシートから薬を押し出すと、カプセルが破損する可能性があります

- ▶ ブリスターシートごと服用しないでください。
- ▶ 以下のお薬をターゼナと一緒に服用すると、ターゼナの副作用が強くなる場合があります。服用している方は、必ず医師または薬剤師に伝えてください。

■ イトラコナゾール、クラリスロマイシン、ラパチニブ など

ターゼナの副作用

- ▶ ターゼナは、がん細胞だけでなく、正常な細胞にも影響を及ぼして何らかの副作用をおこす可能性があります。
- ▶ 副作用には、ご自身で気づく症状(自覚症状)と、医療機関での検査や診察などからわかる症状(他覚症状)があります。
- ▶ ここに記載した副作用はターゼナによる副作用のすべてではありません。

いつもと違った症状や体調の変化などを感じたときは、すぐに担当医や看護師、薬剤師に相談してください。

特に注意していただきたい副作用

● 骨髄抑制

- 貧血(赤血球の減少) 詳しくは P11
- 感染症(好中球の減少) 詳しくは P12
- 出血(血小板の減少) 詳しくは P12

● 間質性肺疾患 詳しくは P13

● 血栓塞栓症 詳しくは P13

● 二次性悪性腫瘍 詳しくは P14

その他の主な副作用

● 疲労／倦怠感、食欲減退／吐き気、脱毛 詳しくは P14,15

骨髄抑制① 貧血(赤血球の減少)

骨髄機能が抑制されることがあり、赤血球、白血球、血小板などの正常な血液細胞数が減少する可能性があります。

骨髄機能の状態を確認するため、血液検査を行います。

担当医から指示された検査は、必ず受けるようにしてください。

赤血球は全身に酸素を運ぶはたらきがあります。

赤血球の数が減少すると貧血になり、以下のような症状があらわれることがあります。場合によっては、輸血が必要になることがあります。




めまい



動悸、息切れ



ふらつき



体がだるい



頭痛、耳鳴り

ターゼナの有効性と安全性を検討した臨床試験では、約50～69%の患者さんに貧血がみられました^{1, 2)}。

気分が悪いと感じたとき、めまいを感じたときは、その場にすぐに座るか横になってください。その後、急に立ち上がらないでください。
また、疲れを感じたら、無理をせずこまめに休むように心がけましょう。

1) ターゼナ®カプセル 電子化された添付文書 17.1.2 国内第Ⅰ相試験(C3441030試験) 2024年1月(第1版)

2) ターゼナ®カプセル 電子化された添付文書 17.1.3 海外第Ⅲ相試験(EMBRACA試験) 2024年1月(第1版)

骨髄抑制② 感染症(好中球の減少)

白血球のなかでも好中球が減少すると、病原体への抵抗力が低下して、感染症にかかりやすくなります。

感染症では、以下の症状がみられることがあります。



発熱



寒気



のどの痛み

ターゼナの有効性と安全性を検討した臨床試験では、約26～64%の患者さんに好中球数減少症がみられました^{1, 2)}。

骨髄抑制③ 出血(血小板の減少)

骨髄でつくられる血液成分のひとつである血小板は、出血時の止血など、血液を固める役割があります。

血小板が少なくなることによって、以下のような症状がみられます。



血が
止まりにくい



手足に点状出血、
青あざ



鼻血、
歯ぐきの出血

ターゼナの有効性と安全性を検討した臨床試験では、約32%の患者さんに血小板数減少症がみられました¹⁾。

間質性肺疾患

肺にある「肺胞(空気を取り入れる袋)」の壁が厚くなって、酸素を取りこみにくくなり、間質性肺疾患が疑われる場合は、以下の症状がみられます。



息切れ

坂道や階段を
上がった後、
少し無理をし
たりすると息
切れがする



息苦しさ

安静時でも息
苦しさを感
じるようになる



咳

から咳(乾い
た咳)、痰の出
ない咳



発熱

血栓塞栓症

血管の中に血のかたまり(血栓)ができ、それにより血管がつまる病気です。血が届かなくなった部位や臓器は障害を受けます(壊死)。血栓塞栓症が疑われる場合は、部位によってさまざまな症状があらわれます。

肺塞栓症: 息切れ、
胸部の痛み、
胸がドキドキする など



深部静脈血栓症: 手足の腫れ
(痛みを伴う場合もある)、
まひ、しびれ、発赤、熱感 など



1) ターゼナ®カプセル 電子化された添付文書 17.1.2 国内第I相試験(C3441030試験) 2024年1月(第1版)
2) ターゼナ®カプセル 電子化された添付文書 17.1.3 海外第III相試験(EMBRACA試験) 2024年1月(第1版)

二次性悪性腫瘍

骨髄異形成症候群(MDS)、急性骨髄性白血病(AML)などが報告されています。

骨髄異形成症候群(MDS) : 血液細胞のうち、赤血球、白血球、血小板すべてが減る場合と、いずれかが減る場合がある

*急性骨髄性白血病(AML)に移行することもあります。

急性骨髄性白血病(AML) : 赤血球、白血球、血小板が減少する

*進行が速く、急に症状があらわれることが多いです。

症状は「骨髄抑制①～③」を参照ください。

その他の主な副作用

疲労／倦怠感

「だるい」「からだが重い」「疲れやすい」といった疲労感(倦怠感)を感じることがあります。

ターゼナの有効性と安全性を検討した臨床試験では、約27～40%の患者さんに倦怠感および疲労がみられました^{1, 2)}。

日常生活の工夫

- ▶ 睡眠や休養を十分にとりましょう。
- ▶ 無理をせず、自分のペースで行動しましょう。

食欲減退／吐き気

吐き気・嘔吐から、食欲低下などの症状があらわれる場合があります。

ターゼナの有効性と安全性を検討した臨床試験では、約37%の患者さんに悪心がみられました²⁾。

日常生活の工夫

- ▶ 吐き気があるときは、体を締めつける衣服は避けるようにしましょう。
- ▶ 嘔吐が続く場合は、食事を少し控えるとともに、水分の補給を行い、脱水症状をおこさないようにしましょう。

脱毛

髪の毛が抜けやすくなるなど、脱毛の症状があらわれる場合があります。

ターゼナの有効性と安全性を検討した臨床試験では、約25～32%の患者さんに脱毛症がみられました^{1, 2)}。

日常生活の工夫

- ▶ 洗髪するときは強くこすらない、洗髪した後は自然に乾燥させる、ブラッシングの回数を減らすなど、髪に刺激を与えないようにしましょう。
- ▶ 抜け毛が気になる場合は、髪型を変えたりしてみましょう。

**以上のような症状や、いつもと違う症状に気づいたら、
担当医や看護師、薬剤師にご連絡ください。**

1)ターゼナ®カプセル 電子化された添付文書 17.1.2 国内第I相試験(C3441030試験) 2024年1月(第1版)

2)ターゼナ®カプセル 電子化された添付文書 17.1.3 海外第III相試験(EMBRACA試験) 2024年1月(第1版)

日常生活のアドバイスと 副作用対策Q&A

Q. 日常生活で気を付けることはありますか？

A. ターゼナの副作用として、骨髄の機能が低下して、白血球などの血液細胞の数が減少することがあります(P11、12)。

血液細胞の状態は、自覚症状では把握できないため、血液検査をして確認する必要があります。担当医に指示された検査は必ず受けるようにしてください。

特に、白血球の中でも好中球の数が減少すると、病原菌への抵抗力が低下して感染症にかかりやすくなります。感染症の予防では、細菌やウイルスなどの病原体をからだの中に入れないことが重要です。

- ▶ 外出から帰ったときや、食事前、トイレの後は手をよく洗いましょう。また、こまめなうがいも心がけましょう。
- ▶ 歯をみがくときは、やわらかく清潔な歯ブラシを使ってやさしくみがきましょう。
- ▶ 爪は短く切りましょう。皮膚の乾燥も防ぎましょう。



Q. 一緒に飲んではいけないお薬はありますか？

A. ターゼナと一緒に服用すると、ターゼナの副作用が強くなるお薬があります。詳しくは、P9をご参照ください。

ターゼナ以外のお薬(市販薬を含む)を服用している場合、必ず担当医や看護師、または薬剤師に伝えてください。

Q. 医療費が高額になった場合、助成制度はありますか？

A. 1か月間(同じ月の1日～末日)に医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が一定額(自己負担限度額)を超えた場合は、「高額療養費制度」によってその超えた金額が支給されます。

- ▶ 保険適用される診療に対して支払った自己負担額が対象となります。(差額ベッド代などは保険適用外になります)
- ▶ 高額療養費の自己負担限度額は、年齢や年収により異なります。高額療養費制度の詳細については、ご自身が加入されている公的医療保険や医療機関の相談窓口などでご相談、ご確認ください(ご自身がどの公的医療保険に加入しているかは、保険証に記載されています)。

ターゼナによる治療のサポートツール

ターゼナによる治療をサポートする資料をご紹介します。

服薬日誌：ターゼナを服用される方へ

- ▶ 毎日の生活でいつもと違った症状や体調の変化、担当医に相談したいことなどを記録していただくための手帳です。
- ▶ 通院時には、持参して担当医や看護師、薬剤師に見せるようにしてください。



療養生活で困ったときには

担当医や看護師、薬剤師に相談を

療養生活においては、時にさまざまな疑問や不安や悩みが生じることがあります。そうした場合は一人で悩み過ぎずに、担当医や看護師、薬剤師に相談してみてください。

ウェブサイト「がんを学ぶ」もご参照ください

ファイザーのウェブサイト「がんを学ぶ」では、次のようなコンテンツを公開しています。併せてご参照ください。

▶ ひとりで、迷わないで。 MY CHOICE PROGRAM

正しい情報から生活のヒントなど、総合的な情報を提供することで、患者さんをサポートするサイトです。

🔍 <https://www.mychoiceprogram.jp>



▶ 乳がんを学ぶ

乳がんの症状や検診の方法、手術や放射線治療、薬物療法などの治療法についての情報を提供しています。

🔍 <https://www.ganclass.jp/kind/breast>



▶ 治療費と生活の支援制度

患者さんやそのご家族をサポートするさまざまな制度、窓口などを紹介しています。

🔍 <https://www.ganclass.jp/support>



▶ がん治療のサポート

通院治療や在宅療養に活用できる制度や施設、がん治療中の患者さんとの接し方、アピアランス（外見）に関する悩みなどについて解説しています。

🔍 https://www.ganclass.jp/support/gan_support

