

服薬日誌

ターゼナを服用される方へ

監修：岩田広治 先生

名古屋市立大学大学院医学研究科 共同研究教育センター
臨床研究戦略部 特任教授

医療機関名

担当医名/緊急連絡先

かかりつけ薬局名

薬剤師名/緊急連絡先



ターゼナは1日1回 毎日服用するお薬です

- 食事の前や後に服用する等の決まりはなく、ご自身で服用する時間帯を設定してください。
- ターゼナの服用量については、担当医の指示に従ってください。

飲み忘れた場合の対応：

- 気づいた時に1回分を服用してください。ただし、次の服用時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分を服用します。
- 決して、1日に2回分を服用しないでください。


例：1回分

のとき



- ターゼナは、カプセルの飲み薬で、ブリスターシートに封入されています。
- お薬の破損を防ぐため、ブリスターシート裏側のアルミをはがして取り出して服用してください。


《正しい取り出し方法》



切り取り線に沿ってブリスターシートを折り曲げる



ブリスターシートを1カプセル分にちぎる



裏側のアルミを矢印の方向にはがして取り出す

ターゼナ服用時の血液検査について

- ターゼナ服用により、血液細胞の数が減少することがあります。
- 血液細胞の状態は、定期的に血液検査を行って確認します。
- 血液検査のタイミングは、患者さんの状態によって異なります。担当医の指示に従い、指定された検査は必ず受けるようにしましょう。



患者さんの状態(症状や副作用など)により、1回あたりの服用量を減らすことがあります。お薬の服用方法は、担当医の指示に従ってください。

服薬日誌をつけましょう： 日誌の書き方(例)

ターゼナの服用状況、毎日の体調の変化、担当医や看護師、
薬剤師に伝えたいことなどを記録しましょう。

1 第 3 週

日付(曜日)	5/1 (水)	5/2 (木)	5/3 (金)
ターゼナの服用 ☒	☒	☒	☒
体温・体重	37.0℃/55.0kg	36.5℃/55.3kg	36.6℃/55.1kg
体調の変化	(あり) なし	(あり) なし	あり (なし)
症状 体調変化などを 感じたときは記入し、 受診のときに 担当医に相談しましょう。 <例> ・発熱 ・だるい ・咳、息切れ ・疲れやすい ・頭痛、胸痛 ・身に覚えのないあざ ・鼻血 ・歯ぐきからの出血 ・吐き気、嘔吐 ・食欲がない など	朝から 微熱が ある 少しだるい	昼ぐらいから 熱は下がり おちついた 食欲もある	
メモ 仕事・家事・ 趣味・運動など 暮らしの状況や、 食事・睡眠・ 気持ちの変化など 記入しましょう。	5/1、5/2 あまりよく ねむれなかった	5/3 家族と久しぶりに 外食をした	

1 ターゼナを服用しはじめて、何週目かを記入しましょう。

2 日付を記入しましょう。

3 その日ターゼナを服用したら、☒をつけましょう。

4 毎日決まった時間に体温・体重を測定し、記録しましょう。

5 体調の変化について「あり」か「なし」に○をつけ、該当する症状
の程度について自由に記入しましょう。

6 上記症状のほかにも日々の暮らしや気持ちの変化を自由に記入
しましょう。担当医などの医療スタッフに伝えたいことや気にな
ることは忘れないように、日付とともにメモしましょう。

■ この服薬日誌は、ターゼナによる治療を受ける患者さんに、その
日お薬を服用したかどうか、ご自身の体調や気になる症状
などを記録していただくためのものです。

■ この服薬日誌に記録された内容は担当医などの医療スタッフに
とっても、より安全に治療を進める上で重要になります。

■ 通院時には、持参して担当医などの医療スタッフに見せるよう
にしてください。

第 週

日付(曜日)	() / ()	() / ()	() / ()	() / ()	() / ()	() / ()	() / ()
ターゼナの服用 ☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
体温、体重	℃ / kg	℃ / kg	℃ / kg	℃ / kg	℃ / kg	℃ / kg	℃ / kg
体調の変化	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし
症状 体調変化などを 感じたときは記入し、 受診のときに 担当医に相談しましょう。 〈例〉 ・発熱 ・だるい ・咳、息切れ ・疲れやすい ・頭痛、胸痛 ・身に覚えのないあざ ・鼻血 ・歯ぐきからの出血 ・吐き気、嘔吐 ・食欲がない など							
メモ 仕事・家事・ 趣味・運動など 暮らしの状況や、 食事・睡眠・ 気持ちの変化など 記入しましょう。							

副作用があらわれたときなどは、医師の判断によりターゼナの服用量を減らしたり、

服用を中断することがあります。このような場合は、担当医の指示に従ってください。

第 週

日付(曜日)	() / ()	() / ()	() / ()	() / ()	() / ()	() / ()	() / ()
ターゼナの服用 ☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
体温、体重	℃ / kg	℃ / kg	℃ / kg	℃ / kg	℃ / kg	℃ / kg	℃ / kg
体調の変化	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし
症状 体調変化などを 感じたときは記入し、 受診のときに 担当医に相談しましょう。 〈例〉 ・発熱 ・だるい ・咳、息切れ ・疲れやすい ・頭痛、胸痛 ・身に覚えのないあざ ・鼻血 ・歯ぐきからの出血 ・吐き気、嘔吐 ・食欲がない など							
メモ 仕事・家事・ 趣味・運動など 暮らしの状況や、 食事・睡眠・ 気持ちの変化など 記入しましょう。							

副作用があらわれたときなどは、医師の判断によりターゼナの服用量を減らしたり、

服用を中断することがあります。このような場合は、担当医の指示に従ってください。

第 週

日付(曜日)	() / ()	() / ()	() / ()	() / ()	() / ()	() / ()	() / ()
ターゼナの服用 ☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
体温、体重	℃ / kg	℃ / kg	℃ / kg	℃ / kg	℃ / kg	℃ / kg	℃ / kg
体調の変化	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし
症状 体調変化などを 感じたときは記入し、 受診のときに 担当医に相談しましょう。 〈例〉 ・発熱 ・だるい ・咳、息切れ ・疲れやすい ・頭痛、胸痛 ・身に覚えのないあざ ・鼻血 ・歯ぐきからの出血 ・吐き気、嘔吐 ・食欲がない など							
メモ 仕事・家事・ 趣味・運動など 暮らしの状況や、 食事・睡眠・ 気持ちの変化など 記入しましょう。							

副作用があらわれたときなどは、医師の判断によりターゼナの服用量を減らしたり、

服用を中断することがあります。このような場合は、担当医の指示に従ってください。

第 週

日付(曜日)	() / ()	() / ()	() / ()	() / ()	() / ()	() / ()	() / ()
ターゼナの服用 ☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
体温、体重	℃ / kg	℃ / kg	℃ / kg	℃ / kg	℃ / kg	℃ / kg	℃ / kg
体調の変化	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし
症状 体調変化などを 感じたときは記入し、 受診のときに 担当医に相談しましょう。 〈例〉 ・発熱 ・だるい ・咳、息切れ ・疲れやすい ・頭痛、胸痛 ・身に覚えのないあざ ・鼻血 ・歯ぐきからの出血 ・吐き気、嘔吐 ・食欲がない など							
メモ 仕事・家事・ 趣味・運動など 暮らしの状況や、 食事・睡眠・ 気持ちの変化など 記入しましょう。							

副作用があらわれたときなどは、医師の判断によりターゼナの服用量を減らしたり、

服用を中断することがあります。このような場合は、担当医の指示に従ってください。

第 週

日付(曜日)	() / ()	() / ()	() / ()	() / ()	() / ()	() / ()	() / ()
ターゼナの服用 ☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
体温、体重	℃ / kg	℃ / kg	℃ / kg	℃ / kg	℃ / kg	℃ / kg	℃ / kg
体調の変化	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし
症状 体調変化などを 感じたときは記入し、 受診のときに 担当医に相談しましょう。 〈例〉 ・発熱 ・だるい ・咳、息切れ ・疲れやすい ・頭痛、胸痛 ・身に覚えのないあざ ・鼻血 ・歯ぐきからの出血 ・吐き気、嘔吐 ・食欲がない など							
メモ 仕事・家事・ 趣味・運動など 暮らしの状況や、 食事・睡眠・ 気持ちの変化など 記入しましょう。							

副作用があらわれたときなどは、医師の判断によりターゼナの服用量を減らしたり、

服用を中断することがあります。このような場合は、担当医の指示に従ってください。

第 週

日付(曜日)	() / ()	() / ()	() / ()	() / ()	() / ()	() / ()	() / ()
ターゼナの服用 ☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
体温、体重	℃ / kg	℃ / kg	℃ / kg	℃ / kg	℃ / kg	℃ / kg	℃ / kg
体調の変化	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし
症状 体調変化などを 感じたときは記入し、 受診のときに 担当医に相談しましょう。 〈例〉 ・発熱 ・だるい ・咳、息切れ ・疲れやすい ・頭痛、胸痛 ・身に覚えのないあざ ・鼻血 ・歯ぐきからの出血 ・吐き気、嘔吐 ・食欲がない など							
メモ 仕事・家事・ 趣味・運動など 暮らしの状況や、 食事・睡眠・ 気持ちの変化など 記入しましょう。							

副作用があらわれたときなどは、医師の判断によりターゼナの服用量を減らしたり、

服用を中断することがあります。このような場合は、担当医の指示に従ってください。

第 週

日付(曜日)	() / ()	() / ()	() / ()	() / ()	() / ()	() / ()	() / ()
ターゼナの服用 ☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
体温、体重	℃ / kg	℃ / kg	℃ / kg	℃ / kg	℃ / kg	℃ / kg	℃ / kg
体調の変化	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし
症状 体調変化などを 感じたときは記入し、 受診のときに 担当医に相談しましょう。 〈例〉 ・発熱 ・だるい ・咳、息切れ ・疲れやすい ・頭痛、胸痛 ・身に覚えのないあざ ・鼻血 ・歯ぐきからの出血 ・吐き気、嘔吐 ・食欲がない など							
メモ 仕事・家事・ 趣味・運動など 暮らしの状況や、 食事・睡眠・ 気持ちの変化など 記入しましょう。							

副作用があらわれたときなどは、医師の判断によりターゼナの服用量を減らしたり、

服用を中断することがあります。このような場合は、担当医の指示に従ってください。

第 週

日付(曜日)	() / ()	() / ()	() / ()	() / ()	() / ()	() / ()	() / ()
ターゼナの服用 ☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
体温、体重	℃ / kg	℃ / kg	℃ / kg	℃ / kg	℃ / kg	℃ / kg	℃ / kg
体調の変化	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし	あり・なし
症状 体調変化などを 感じたときは記入し、 受診のときに 担当医に相談しましょう。 〈例〉 ・発熱 ・だるい ・咳、息切れ ・疲れやすい ・頭痛、胸痛 ・身に覚えのないあざ ・鼻血 ・歯ぐきからの出血 ・吐き気、嘔吐 ・食欲がない など							
メモ 仕事・家事・ 趣味・運動など 暮らしの状況や、 食事・睡眠・ 気持ちの変化など 記入しましょう。							

副作用があらわれたときなどは、医師の判断によりターゼナの服用量を減らしたり、

服用を中断することがあります。このような場合は、担当医の指示に従ってください。

MEMO

MEMO