

Dr. Winfried Teschers  
Anton-Günther-Straße 26c  
91083 Baiersdorf  
winfried.teschers@t-online.de

## Projektdokument

# ASBA

## Axiome, Sätze, Beweise und Auswertungen

Projekt zur maschinellen Überprüfung von mathematischen **Beweisen** und deren  
Ausgabe in lesbarer Form

Winfried Teschers

16. März 2018

Es wird ein Programmsystem beschrieben, das zu eingegebenen **Axiomen**, **Sätzen** und **Beweisen** letztere prüft, Auswertungen generiert und unter Zuhilfenahme gegebener **Ausgabeschemata** eine Ausgabe im  $\text{\LaTeX}$ -Format in mathematisch üblicher Schreibweise mit **Formeln** erstellt.

Copyright © 2018 Winfried Teschers

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You should have received a copy of the GNU Free Documentation License along with this document. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort</b>	<b>4</b>
<b>1. Analyse</b>	<b>5</b>
1.1. Fragen	5
1.2. Eigenschaften	6
1.3. Ziele	7
1.4. Zusammenfassung	9
1.5. Die Umgebung von ASBA	10
1.6. Basis von Beweisen	11
<b>2. Mathematische Grundlagen</b>	<b>13</b>
2.1. Metasprache	13
2.1.1. Aussagen	14
2.1.2. Aussagen und Metaoperationen	15
2.1.3. Mit Gleichheit verwandte Relationen	16
2.1.3.1. Vergleichbar	16
2.1.3.2. Vergleiche	16
2.1.3.3. Definitionen	17
2.2. Notationen	17
2.2.1. Bezeichnungen	17
2.2.2. Quotierung	18
2.2.3. Weitere Bezeichnungen	18
2.2.4. Relationen und Operationen	20
2.2.5. Prioritäten	21
2.3. Beweise in ASBA	23
2.3.1. Definitionen und Verabredungen	23
2.3.2. Formeln und Ableitungen	23
2.3.3. Schlussregeln	25
2.3.4. Beweise	26
2.3.5. Beispiel für einen Beweis	27
2.3.6. Beweisschritte	27
2.4. Aussagenlogik	28
2.4.1. Konstante und Operationen	28
2.4.2. Formalisierung	28
2.4.2.1. Bausteine der aussagenlogischen Sprache	28
2.4.2.2. Aussagenlogische Formeln	30
2.4.3. Definition von Junktoren durch andere	31
2.4.4. Aussagenlogisches Axiomensystem	32
2.5. Prädikatenlogik	33
2.6. Mengenlehre	33
<b>3. Ideen</b>	<b>34</b>
3.1. Schlussregeln	34
3.1.1. Basisregeln	34
3.1.2. Identitätsregeln	35
3.1.3. Weitere Schlussregeln	36

3.1.4. Beispiel einer Ableitung . . . . .	37
<b>4. Design</b>	<b>42</b>
4.1. Anforderungen . . . . .	42
4.2. Axiome . . . . .	43
4.3. Beweise . . . . .	43
4.4. Datenstruktur . . . . .	43
4.5. Bausteine . . . . .	43
<b>A. Anhang</b>	<b>44</b>
A.1. Werkzeuge . . . . .	44
A.2. Offene Aufgaben . . . . .	45
<b>B. Verzeichnisse</b>	<b>47</b>
Tabellenverzeichnis . . . . .	47
Abbildungsverzeichnis . . . . .	47
Literaturverzeichnis . . . . .	48
Index . . . . .	51
Symbole . . . . .	53
Glossar . . . . .	58

# Vorwort

Schon während meiner aktiven Zeit habe ich davon geträumt, ein Programm zu erstellen, mit dem man mathematische **Sätze** und **Beweise** speichern und überprüfen kann. Es sollte auch statistische Auswertungen beherrschen und u. a. Fragen beantworten können wie z. B. „Welche **Axiome** sind zum **Beweis** eines bestimmten **Satz**s erforderlich?“ oder „Wie viele **Beweisschritte** erfordert ein bestimmter **Beweis** ?“. Ein **Beweis** mit weniger **Axiomen** und weniger **Beweisschritten** wäre dann vorzuziehen.

Einige Jahre nach meiner Pensionierung habe ich Ende 2016 endlich damit angefangen, das Projekt **ASBA** zu starten. Im Internet habe ich das Projekt „Hilbert II“ ([19]) gefunden, dass eine ähnliche Zielsetzung hat. Ich habe dann mit dem Projektleiter Michael Meyling Kontakt aufgenommen und war zuversichtlich, Synergien nutzen zu können. Leider hat sich dann herausgestellt, dass mein Ansatz viel umfangreicher und somit mit „Hilbert II“ wohl nicht kompatibel ist. Daher betreibe ich **ASBA** als ein Ein-Mann-Projekt und dies wird bis zur Fertigstellung der ersten Version dieses Dokuments wohl so bleiben müssen. Vielleicht ergibt sich dann ja eine Zusammenarbeit mit anderen Enthusiasten.

Da in diesem Dokument viele mathematische **Formeln** vorkommen und **ASBA** auch  $\text{\LaTeX}$ -Code generieren soll, ist es in  $\text{\LaTeX}$  verfasst. Dieses für mich neue Textsystem war eine große, spannende Herausforderung und ist einer der Gründe für die lange Dauer der Erstellung dieses Dokuments. Hinzu kommt, dass ich keinen Termindruck habe und endlich mal 100% versuchen kann – in meinem Job wurde ich daran aus verständlichen Gründen gehindert.

**ASBA** soll eine Basis für die Überprüfung und Archivierung mathematischer **Sätze** und **Beweise** sein. Daher halte ich es für unerlässlich, alle verwendeten Begriffe eindeutig genug zu spezifizieren (100%!). Natürlich will ich mich dabei an die übliche Nomenklatur halten. Aber was ist üblich? Steht  $\langle \subset \rangle$  für „Teilmenge“ oder „echte Teilmenge“? Ist 0 ein Element aus  $\mathbb{N}$  oder nicht? Daher habe ich versucht, alle wichtigen, verwendeten Begriffe der Mathematik, aber auch der **formalen Metasprache** streng zu definieren, normalerweise im Text, teilweise aber nur in einer Fußnote, auf jeden Fall aber im Glossar. Dort sind auch manche Begriffe aufgeführt, die im Text nicht definiert wurden.

Alle im Glossar und Symbolverzeichnis aufgeführten Begriffe werden bei der Definition **in dieser** und bei der Verwendung **in dieser** Schriftart ausgegeben. Zusätzlich sind die Begriffe und Symbole im PDF-Dokument mit einem Link ins Glossar bzw. Symbolverzeichnis versehen.

Fußnoten dienen nur zu weiteren Erläuterungen sowie Verweisen in dieses Dokument und in die Literatur. Daher können sie auch etwas „lascher“ formuliert sein. Für das Verständnis des Textes sollten sie nicht nötig sein, es reichen Grundkenntnisse der Mathematik.

Wenn im Text „wir“ verwendet wird, geht es um Definitionen, die von allgemein bekannten möglicherweise abweichen. „Wir“ und nicht „ich“, da ich den Leser einschließe und außer an dieser Einleitung in Zukunft möglicherweise auch andere Autoren an diesem Dokument beteiligt sein werden.

Baiersdorf, den 03. März 2018

Winfried Teschers

Dummy-Einträge: Text = **Dummy** , Symbol = **#**, gls-Index = Dummy, idx-Index = Dummy

Dummy-Einträge: Text = **Dummy** , Symbol = **#**, gls-Index = Dummy, idx-Index = Index-Dummy

PS: Texte, deren Bearbeitung zurückgestellt ist, sind in dieser Schriftfarbe geschrieben.

# 1. Analyse

In der Mathematik gibt es eine unüberschaubare Menge an [Axiomen](#), [Sätzen](#), [Beweisen](#), [Fachbegriffen](#)<sup>1)</sup> und [Fachgebieten](#)<sup>2)</sup>. Zu den meisten [Fachgebieten](#) gibt es noch ungelöste Probleme.

Es fehlt ein System, das einen Überblick bietet und die Möglichkeit, [Beweise](#) automatisch zu überprüfen. Außerdem sollte all dies in üblicher mathematischer Schreibweise ein- und ausgegeben werden können. In diesem Dokument werden die Grundlagen für das zu entwickelnde Programmsystem [ASBA](#) (ein Akronym für „[A](#)xiome, [S](#)ätze, [B](#)eweise und [A](#)uswertungen“) behandelt.

Ein Programmsystem mit ähnlicher Aufgabenstellung findet sich im GitHub Projekt *Hilbert II* ([19, 20]). Einige Ideen sind von dort übernommen worden.

## 1.1. Fragen

Einige der Fragen, die in diesem Zusammenhang auftauchen, werden nun formuliert:

1. **Grundlagen:** Was sind die Grundlagen? Z. B. welche [Logik](#) und welche [Mengenlehre](#).
2. **Basis:** Welche wichtigen [Axiome](#), [Sätze](#), [Beweise](#), [Fachbegriffe](#) und [Fachgebiete](#) gibt es? Welche davon sind Standard?
3. **Axiome:** Welche [Axiome](#) werden bei einem [Satz](#) oder [Beweis](#) vorausgesetzt? Allgemein anerkannte oder auch strittige, wie z. B. den [Satz vom ausgeschlossenen Dritten](#) (*tertium non datur*) oder das *Auswahlaxiom*.
4. **Beweis** : Ist ein [Beweis](#) fehlerfrei?
5. **Konstruktion:** Gibt es einen konstruktiven [Beweis](#) ?
6. **Vergleiche:** Welcher [Beweis](#) ist besser? Nach welchem Kriterium? Z. B. elegant, kurz, einsichtig oder wenige [Axiome](#). Was heißt eigentlich *elegant*?
7. **Definitionen:** Was ist mit einem [Fachbegriff](#) jeweils genau gemeint? Z. B. *Stetigkeit*, *Integral* und *Analysis*.
8. **Abhängigkeiten:** Wie heißt ein [Fachbegriff](#) in einer anderen Sprache? Ist wirklich dasselbe gemeint? Was ist mit [Fachbegriffen](#) in verschiedenen [Fachgebieten](#)?
9. **Überblick:** Ist ein [Axiom](#) , [Satz](#) , [Beweis](#) oder [Fachbegriff](#) schon einmal — ggf. abweichend — definiert, formuliert oder bewiesen worden?
10. **Darstellung:** Wie kann man einen [Satz](#) und den zugehörigen [Beweis](#) — ggf. auch spezifisch für ein [Fachgebiet](#) — darstellen?

<sup>1)</sup> [Fachbegriffe](#) sind Namen für mathematische Elemente und Konstruktionen, z. B. [Axiomen](#), [Sätzen](#), [Beweisen](#) und [Fachgebieten](#). [Symbole](#) können als spezielle [Fachbegriffe](#) aufgefasst werden.

<sup>2)</sup> Ein [Fachgebiet](#) ist ein Teil der Mathematik mit einer zugehörigen Basis an [Axiomen](#), [Sätzen](#), [Fachbegriffen](#) und Darstellungen, z. B. [Logik](#) und [Mengenlehre](#). Ein [Fachgebiet](#) kann sehr klein sein und im Extremfall bei [ASBA](#) kein einziges Element enthalten. *Umgebung* wäre eine bessere Bezeichnung, ist aber schon ein verbreiteter [Fachbegriff](#), so dass hier die Bezeichnung [Fachgebiet](#) verwendet wird.

Statt „[Fachgebiet](#)“ könnte man auch „Theorie“ nehmen. An *Theorien* (siehe [1] Kapitel 2.5, Seite 64) werden jedoch bestimmte Anforderungen gestellt, die vom hier behandelten Programmsystem aber nicht notwendigerweise überprüft werden sollen. Theorien sind allerdings i. Alg. auch [Fachgebiete](#).

11. **Forschung:** Welche Probleme gibt es noch zu erforschen.

## 1.2. Eigenschaften

ASBA soll ausgehend von den Fragen in Abschnitt 1.1 auf der vorherigen Seite entwickelt werden, und die folgenden Eigenschaften haben:

1. **Daten:** Axiome, Sätze, Beweise, Fachbegriffe und Fachgebiete können in formaler Form gespeichert werden — auch (noch) nicht oder unvollständig bewiesene Sätze. Dabei soll die übliche mathematische Schreibweise verwendet werden können.
2. **Definitionen:** Es können Fachbegriffe für Axiome, Sätze, Beweise und Fachgebiete — letztere mit eigenen Axiomen, Sätzen, Beweisen, Fachbegriffen und über- oder untergeordneten Fachgebieten — definiert werden. Die Definitionen dürfen wiederum an dieser Stelle schon bekannte Fachbegriffe und Fachgebiete verwenden.
3. **Prüfung:** Vorhandene Beweise können automatisch geprüft werden.
4. **Ausgaben:** Die Axiome, Sätze und Beweise können in üblicher Schreibweise — abhängig von Sprache und Fachgebiet — ausgegeben werden.
5. **Auswertungen:** Zusätzlich zur Ausgabe der gespeicherten Daten sind verschiedene Auswertungen möglich, unter anderem für die meisten der unter Abschnitt 1.1 auf der vorherigen Seite behandelten Fragen.

Damit ASBA nicht umsonst erstellt wird und möglichst breite Verwendung findet, werden noch zwei Punkte angefügt:

6. **Lizenz:** Die Software ist *Open Source*.
7. **Akzeptanz:** ASBA wird von Mathematikern akzeptiert und verwendet.

Tabelle 1.1 auf der nächsten Seite zeigt, wie sich die Eigenschaften zu den Fragen im Abschnitt 1.1 auf der vorherigen Seite verhalten. Mit einem X werden die Spalten einer Zeile markiert, deren zugehörige Eigenschaften zur Beantwortung der entsprechenden Frage beitragen sollen. Idealerweise sollte die Erfüllung aller angegebenen Eigenschaften alle gestellten Fragen beantworten, was allerdings illusorisch ist.

Frage \ Eigenschaft							
	1 Daten	2 Definitionen	3 Prüfung	4 Ausgaben	5 Auswertungen	6 Lizenz	7 Akzeptanz
1 Grundlagen	X	X	-	X	X	-	-
2 Basis	X	X	-	X	X	-	-
3 Axiome	X	X	-	X	X	-	-
4 Beweise	X	-	X	X	-	-	-
5 Konstruktion	X	-	-	X	-	-	-
6 Vergleiche	X	-	-	-	X	-	-
7 Definitionen	X	X	-	X	-	-	-
8 Abhängigkeiten	X	-	-	X	-	-	-
9 Überblick	X	-	-	-	X	-	-
10 Darstellung	-	X	-	X	-	-	-
11 Forschung	X	-	-	-	X	-	-

Tabelle 1.1.: Fragen (1.1) → Eigenschaften (1.2)

### 1.3. Ziele

Um die Eigenschaften von Abschnitt 1.2 auf der vorherigen Seite zu erreichen, werden für ASBA die folgenden Ziele<sup>3)</sup> gesetzt:

1. **Daten:** Die verteilte Datenbank von ASBA enthält möglichst viele wichtige Axiome, Sätze, Beweise, Fachbegriffe, Fachgebiete und Ausgabeschemata<sup>4)</sup>.
2. **Form:** Die Daten liegen in formaler, geprüfter Form vor.
3. **Eingaben:** Die Eingabe von Daten erfolgt in einer formalen Syntax unter Verwendung der üblichen mathematischen Schreibweise.
4. **Prüfung:** Beweise können automatisch geprüft<sup>5)</sup> werden.
5. **Ausgaben:** Die Ausgabe kann in einer eindeutigen, formalen Syntax gemäß vorhandener Ausgabeschemata erfolgen.
6. **Auswertungen:** Zusätzlich zur Ausgabe der Daten sind verschiedene Auswertungen möglich. Insbesondere kann zu jedem Beweis angegeben werden, wie lang er ist und welche Axiome und Sätze<sup>6)</sup> er benötigt.
7. **Anpassbarkeit:** Fachbegriffe und die Darstellung bei der Ausgabe können mit Hilfe von — gegebenenfalls unbenannten — untergeordneten Fachgebieten angepasst werden.
8. **Individualität:** Axiome und Sätze können für jeden Beweis individuell vorausgesetzt werden. Dabei sind fachgebietsspezifische Fachbegriffe erlaubt.

<sup>3)</sup> Es sind eigentlich Anforderungen. Dieser Begriff wird aber schon im Kapitel 4 auf Seite 42 verwendet.

<sup>4)</sup> Um den Punkt 4 von Abschnitt 1.2 auf der vorherigen Seite erfüllen zu können, werden noch fachgebietsspezifische Ausgabeschemata benötigt, welche die Art der Ausgaben beschreiben.

<sup>5)</sup> Hier soll ASBA soll keine Beweise finden — das ist Ziel von Punkt 17, sondern nur vorhandene prüfen.

<sup>6)</sup> Sätze, die quasi als Axiome verwendet werden.

9. **Internet:** Die Daten können auf mehrere Dateien verteilt sein. Ein Teil davon — oder sogar alle — können im Internet liegen.
10. **Kommunikation:** Die Kommunikation mit ASBA kann mit den Fachbegriffen der einzelnen Fachgebiete erfolgen.
11. **Zugriff:** Der Zugriff auf ASBA kann lokal und über das Internet erfolgen.
12. **Unabhängigkeit:** ASBA kann online und offline arbeiten.
13. **Rekursion:** Es kann rekursiv über alle verwendeten Dateien — auch solchen, die im Internet liegen — ausgewertet werden.
14. **Bedienbarkeit:** ASBA ist einfach zu bedienen.
15. **Lizenz:** Die Software ist *Open Source*.
16. **Zwischenspeicher:** Wichtige Auswertungen können an vorhandenen Dateien angehängt oder separat in eigenen Dateien gespeichert werden.
17. **Beweisunterstützung:** ASBA hilft bei der Erstellung von Beweisen.

Punkt 16 wurde noch angefügt, damit ASBA effizient arbeiten kann und um die Akzeptanz zu erhöhen. Um letzteres zu erreichen, dafür ist auch Punkt 17 nützlich. Es bietet sich ja auch an, die Fähigkeiten, die ASBA mit der Prüfung von Beweisen haben wird, auch auf die Erstellung von Beweisen anzuwenden. Die Reihenfolge der Ziele stellt noch keine Priorisierung fest.

Die Tabelle 1.2 zeigt wieder, wie sich die Ziele zu den Eigenschaften im Abschnitt 1.2 auf Seite 6 verhalten. Mit einem X werden wieder die Spalten einer Zeile markiert, deren zugehörige Ziele zur Sicherstellung der entsprechenden Eigenschaft beitragen sollen. Idealerweise sollte durch Erreichen aller aufgestellten Ziele ASBA alle angegebenen Eigenschaften aufweisen, was wahrscheinlich ebenfalls illusorisch ist.

Eigenschaft \ Ziel																	
	1 Daten	2 Form	3 Eingaben	4 Prüfung	5 Ausgaben	6 Auswertungen	7 Anpassbarkeit	8 Individualität	9 Internet	10 Kommunikation	11 Zugriff	12 Unabhängigkeit	13 Rekursion	14 Bedienbarkeit	15 Lizenz	16 Zwischenspeicher	17 Beweisunterstützung
1 Daten	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Definitionen	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Prüfung	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Ausgaben	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Auswertungen	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Lizenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
7 Akzeptanz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Tabelle 1.2.: Eigenschaften (1.2) → Ziele (1.3)



## 1.4. Zusammenfassung

Frage \ Ziel																	
	Daten 1	Form 2	Eingaben 3	Prüfung 4	Ausgaben 5	Auswertungen 6	Anpassbarkeit 7	Individualität 8	Internet 9	Kommunikation 10	Zugriff 11	Unabhängigkeit 12	Rekursion 13	Bedienbarkeit 14	Lizenz 15	Zwischenspeicher 16	Beweisunterstützung 17
1 Grundlagen	X	X	X	-	X	X	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Basis	X	X	X	-	X	X	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Axiome	X	X	X	-	X	X	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Beweis	X	X	X	X	X	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Konstruktion	X	X	X	-	X	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Vergleiche	X	X	X	-	-	X	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Definitionen	X	X	X	-	X	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Abhängigkeiten	X	X	X	-	X	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Überblick	X	X	X	-	-	X	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Darstellung	X	-	X	-	X	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Forschung	X	X	X	-	-	X	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Die nächsten beiden Punkte sind Eigenschaften aus Abschnitt 1.2 auf Seite 6:																	
6 Lizenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
7 Akzeptanz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Tabelle 1.3.: Fragen (1.1) → Ziele (1.3)

Die Tabelle 1.3 ist eine Kombination der Tabellen 1.1 und 1.2 und zeigt, wie sich die Ziele im Abschnitt 1.3 auf Seite 7 zu den Fragen im Abschnitt 1.1 auf Seite 5 verhalten. Auch hier werden mit einem X die Spalten einer Zeile markiert, deren zugehörige Ziele für die Beantwortung der entsprechenden Frage nötig sind. Mit einem kleinen x werden sie markiert, wenn sie zur Beantwortung der Fragen nicht nötig, aber von Interesse sind. Idealerweise sollte das Erreichen aller aufgestellten Ziele alle gestellten Fragen beantworten, was natürlich auch illusorisch ist.

## 1.5. Die Umgebung von ASBA

In der Abbildung 1.1 wird beschrieben, welche Interaktionen ASBA mit der Umgebung hat, d. h. welche Ein- und Ausgaben existieren und woher sie kommen bzw. wohin sie gehen.




Abbildung 1.1.: Die Umgebung von ASBA

In den in der Abbildung 1.1 abgebildeten Datenflüssen (1) bis (6) und (a) bis (e) werden die folgenden Daten übertragen:

- (1) **ASBA** → **Internet** Inhalte der Datenbank.  
**Internet** → **ASBA** Inhalte der externen Datenbank.
- (2) **Datenbank** → **ASBA** Inhalte der Datenbank und Antworten auf Datenbankanweisungen.  
**ASBA** → **Datenbank** Inhalte der Datei, der externen Datenbank und Datenbankanweisungen.
- (3) **Datei** → **ASBA** Inhalte der Datei.  
**ASBA** → **Datei** Die Datei wird um zusätzliche Auswertungen ergänzt, z. B. ob die **Beweise** korrekt sind, welche **Axiome** und **Sätze** — auch externe aus dem Internet — verwendet wurden, Länge des **Beweis es** usw.
- (4) **Terminal** → **ASBA** Anweisungen, Daten und Batchprogramme.  
**ASBA** → **Terminal** Antworten auf Anweisungen, Auswertungen usw.  
 Außerdem interaktive Ein- und Ausgabe durch einen Anwender, wie in (5) beschrieben.
- (5) **Anwender** ↔ **ASBA** Interaktive Ein- und Ausgaben durch einen Anwender mit Komponenten von (3), (4) und (6). — Die Kommunikation läuft i. Alg. über ein Terminal.
- (6) **ASBA** → **Ausgabe** Inhalte von Datei und Datenbank in lesbarer Form, u. a. mit Hilfe von **Ausgabeschemata** auch mit **Formeln**. Die Ausgabe kann auch in eine Datei erfolgen, z. B. im **L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X**-Format.
- (a) **Internet** → **externes ASBA** Inhalte der Datenbank.

**externes ASBA** → **Internet** Inhalte der externen Datenbank.

xiom

(b) **externe Datenbank** → **externes ASBA** Inhalte der externen Datenbank.

**externes ASBA** → **externe Datenbank** Inhalte der Datenbank.

(c) **Ausgabe** → **Anwender** Alle Daten der Ausgabe.

(d) **Anwender** ↔ **Terminal** Interaktive Ein- und Ausgabe durch einen Anwender, wie in (5) beschrieben.

(e) **Terminal** ↔ **Datei** Erstellen und Bearbeiten der Datei durch einen Anwender. — siehe (d)

Die Datenflüsse (a) bis (e) erfolgen außerhalb von **ASBA** und werden nicht weiter behandelt.

Die Datenbank und die Datei enthalten im Prinzip die gleichen Daten, wobei sie in der Datei im Textformat in lesbarer Form und in der Datenbank in einem internen Format vorliegen. Zudem enthält die Datenbank i. Alg. sehr viel mehr Daten. Es handelt sich dabei jeweils um die folgenden Daten:

**Axiome** Ein **Axiom** ist eine **Aussage**, die nicht aus anderen **Aussagen** abgeleitet werden kann. Es können wie bei **Sätzen Voraussetzungen** vorhanden sein, aber keine **Beweise**.

**Sätze** Ein **Satz** besteht aus einer Anzahl von **Voraussetzungen** und **Folgerungen** und einem **Beweis**, der die **Folgerungen** aus den **Voraussetzungen** ableitet. Letztere können **Axiome** und andere **Sätze** sein, auf die dann verwiesen wird.

**Beweise** Ein **Beweis** besteht aus einer Folge von **Beweisschritten**, die aus gegebenen **Voraussetzungen Folgerungen** ableitet.

**Fachbegriffe** Ein **Fachbegriff** ist ein Name für ein Objekt bzw. eine Eigenschaft in einem bestimmten **Fachgebiet**.

**Fachgebiete** Ein **Fachgebiet** ist ein Teil der Mathematik mit einer zugehörigen Basis aus **Axiomen**, **Sätzen**, **Fachbegriffen** und **Ausgabeschemata**, quasi eine untergeordnete Datenbank.

**Ausgabeschemata** Eine **Ausgabeschema** ist eine Beschreibung, wie ein bestimmtes mathematisches Objekt ausgegeben werden soll. Dies kann z. B. ein Stück **L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X**-Code mit entsprechenden Parametern sein.

**Auswertungen** Statistische und andere Auswertungen, die bestimmten Elementen der Datei bzw. Datenbank zugeordnet sind. Z. B. können zu einem **Satz** alle für einen **Beweis** notwendigen **Axiome** angegeben werden — als Verweise.

Die Daten können interne und externe Verweise enthalten.

## 1.6. Basis von Beweisen

Da ein Computerprogramm erstellt werden soll, muss die Grundstruktur des Vorgehens bei **Beweisen** definiert werden.<sup>7)</sup>

<sup>7)</sup> siehe [38]

Die **logische Darstellung** von mathematischen **Aussagen**, wozu auch **Axiome** und **Sätze** gehören, erfolgt, da es sich immer um **Formeln** handelt, an besten mit **Zeichenfolgen**<sup>8)</sup>, d. h. Folgen von Zeichen und Symbolen, in denen Zwischenraum — insbesondere Leerstellen — nicht zählen. Mehrdimensionale **Formeln**, wie z. B. Matrizen, Baumstrukturen, Funktionsschemata und anderes, können auch als (eindimensionale) Zeichenfolgen dargestellt werden.<sup>9)</sup> **Beweise** sind letztendlich nichts anderes, als erlaubte **Umwandlungen** dieser **Zeichenfolgen**.

**Baustein** sind Grundelemente, auch **Zeichen** oder **(Satz-)Buchstaben** genannt, aus denen die Zeichenfolgen bestehen dürfen, und müssen definiert werden.

**Formationsregel** dienen zur Festlegung, wie man aus den Bausteinen Ausdrücke erzeugen kann, und müssen ebenfalls definiert werden.

**Sätze** lassen sich als eine Menge von **Formeln**, den **Voraussetzungen**, wozu auch **Axiome** und andere **Sätze** gehören können, einer weiteren Menge von **Formeln** (**Zeichenfolgen**), den **Folgerungen**, und der Angabe eines **Beweises** darstellen.

**Beweise** zu gegebenen **Voraussetzungen** und **Folgerungen** lassen sich als **Folge** von **Umwandlungen**, beginnend mit den **Voraussetzungen** und endend mit den **Folgerungen**, darstellen.

**Umwandlungsregeln** definieren, welche **Umwandlungen** mit gegebenen **Formelmengen** zulässig sind.<sup>10)</sup>

<sup>8)</sup> Die interne Darstellung der **Zeichenfolgen** kann zur Optimierung des Programms von der logischen abweichen.

<sup>9)</sup> Z. B. könnte man eine  $2 \times 2$ -Matrix  $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$  auch darstellen als Folge von Zeilen:  $\langle \langle (a, b), (c, d) \rangle \rangle$ , oder noch einfacher:  $\langle \langle [a, b; c, d] \rangle \rangle$ . In **ASBA** wird die **L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X**-Syntax verwendet. Damit wird die soeben angegebene Matrix codiert durch  $\langle \langle \$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \$ \rangle \rangle$ .

<sup>10)</sup> siehe [1, 46, 48]

## 2. Mathematische Grundlagen

Die mathematischen Grundlagen werden einerseits gebraucht, um die erlaubten [Beweisschritte](#)<sup>1)</sup> zu definieren, andererseits dienen sie auch zum Testen von [ASBA](#). Daher werden sie in diesem Kapitel 2 ausführlicher behandelt, als für die Erstellung von [ASBA](#) erforderlich ist. Alle hier<sup>2)</sup> aufgeführten [Axiome](#), [Sätze](#) und [Beweise](#) sollen dazu kodiert und die [Beweise](#) dann von [ASBA](#) verifiziert werden.

Speziell in diesem Kapitel 2 wollen wir mit möglichst exakt definierten Notationen<sup>3)</sup> operieren. Wenn sie [in dieser](#) Schriftart erscheinen, gibt es eine Definition im Symbolverzeichnis oder Glossar<sup>4)</sup>, und diese Bedeutung ist dann gemeint. Gleichzeitig ist damit im PDF-Dokument ein Link dorthin verbunden. An Stellen, wo eine Notation definiert wird, wird sie [in dieser](#)<sup>5)</sup> Schriftart ausgegeben. Wird normale, schwarze Schrift verwendet, ist die alltägliche Bedeutung gemeint, die manchmal recht ungenau ist.

Sätze mit „wir“ bestimmen Notationen, die evtl. nur für dieses Dokument gelten. Bei allgemein bekannten Notationen wird „wir“ nicht verwendet. Die Verwendung von „wir“ ist allerdings möglicherweise nicht konsistent und soll nur als Hinweis dienen.

Wenn die genaue Bedeutung einer Notation bei ihrer Verwendung noch nicht definiert ist, ist sie an der entsprechenden Stelle noch nicht notwendig oder so bekannt und eindeutig, dass auf eine Definition verzichtet wird. In letzterem Fall findet sich aber oft dennoch eine Definition im Symbolverzeichnis ab Seite 53 oder Glossar ab Seite 58.

### 2.1. Metasprache

Wenn man über eine Sprache, die sogenannte [Objektsprache](#), spricht, braucht man eine zweite Sprache, die sogenannte [Metasprache](#), in der [Aussagen](#) über erstere getroffen werden können.<sup>6)</sup> Wenn die [Objektsprache](#) die der Mathematik ist, wählt man üblicherweise die natürliche Sprache als [Metasprache](#). Leider ist diese oft ungenau, nicht immer eindeutig und abhängig vom Zusammenhang, in dem sie gesprochen wird.<sup>7)</sup> Um diese Probleme in den Griff zu bekommen, kann die [Metasprache](#) auch formalisiert werden. Durch diese Formalisierung erinnert sie dann schon an mathematische [Formeln](#). Die Sprachebenen sollten aber sorgfältig unterschieden werden.

Wir unterscheiden hier drei [Sprachebenen](#):

[Metasprache](#) Die normale Umgangssprache.

<sup>1)</sup> siehe Abschnitt 2.3.6 auf Seite 27

<sup>2)</sup> Mit **hier** ist immer speziell dieses Dokument gemeint.

<sup>3)</sup> Dazu zählen wir auch Begriffe und [Symbole](#).

<sup>4)</sup> Möglicherweise steht dort statt einer Definition auch nur eine Referenz zur Definition im laufenden Text.

<sup>5)</sup> Für Symbole gilt dies leider nur für die Schriftfarbe.

<sup>6)</sup> Die beiden Sprachen können auch übereinstimmen, z. B. wenn man über die natürliche Sprache spricht.

<sup>7)</sup> Man betrachte die beiden [Aussagen](#) „Studenten und Rentner zahlen die Hälfte.“ und „Studenten oder Rentner zahlen die Hälfte.“, die beide das gleiche meinen. — Entnommen aus [1] Abschnitt 1.2 Bemerkung 1.

Ein weiteres Problem ist, dass man unauflösbare Widersprüche formulieren kann, z. B. „Der Barbier ist der Mann im Ort, der genau die Männer im Ort rasiert, die sich nicht selbst rasieren.“. Und der Barbier? Wenn er sich selbst rasiert, dann rasiert er sich nicht selbst, und wenn er sich nicht selbst rasiert, dann rasiert er sich selbst. Was denn nun? — Quelle unbekannt) – Das Problem ist verwandt mit dem Problem der „Menge aller Mengen, die sich nicht selbst enthalten“.

**formale Metasprache** Eine **Sprache**, die als Ausdrucksmittel nur **Metasymbole** verwendet. Die meisten der hier auftretenden **Formeln** sind in dieser Sprache formuliert, weswegen wir sie dann konsequenterweise als **Metaformeln** bezeichnen.

**Objektsprache** Unser Objekt ist die Mathematik, genauer mathematische **Formeln**, die wir dann entsprechend als **Objektformeln** bezeichnen.

Die genaue Definition der **formalen Metasprache** und der **Objektsprache** <sup>8)</sup> folgt noch.

### 2.1.1. Aussagen

Wir definieren jetzt einige Begriffe.

**Wahrheitswert** Wikipedia [51] schreibt dazu (Zitat ohne Verweise ins Internet):

Ein **Wahrheitswert** ist in Logik und Mathematik ein logischer Wert, den eine Aussage in Bezug auf Wahrheit annehmen kann.

Für die Darstellung der **Wahrheitswerte** abhängig von der Sprachebene und dem logischen Wert der Aussage definieren wir:

Sprachebene	Aussagewert		Symbolart
	wahr	falsch	
Metasprache	<i>wahr</i>	<i>falsch</i>	normaler Text
formale Metasprache	true	false	Metasymbol
Objektsprache	$\top$	$\perp$	Objektsymbol

**Tabelle 2.1.:** Darstellung der **Wahrheitswerte**

**Aussage** Wikipedia [34] schreibt dazu (Zitat ohne Verweise ins Internet):

Eine **Aussage** im Sinn der aristotelischen Logik ist ein sprachliches Gebilde, von dem es sinnvoll ist zu *fragen*, ob es wahr oder falsch ist (so genanntes Aristotelisches Zweitwertigkeitsprinzip). Es ist nicht erforderlich, *sagen* zu können, ob das Gebilde wahr oder falsch ist. Es genügt, dass die Frage nach Wahrheit („Zutreffen“) oder Falschheit („Nicht-Zutreffen“) sinnvoll ist, – was zum Beispiel bei Fragesätzen, Ausrufen und Wünschen nicht der Fall ist. Aussagen sind somit Sätze, die Sachverhalte beschreiben und denen man einen Wahrheitswert zuordnen kann.

Das entscheidende Kriterium ist, dass man einer **Aussage** zumindest im Prinzip einen **Wahrheitswert** zuordnen kann, ggf. nach Ersetzung von Parametern durch konkrete Argumente. Da man logischen Ausdrücken und **Relationen** mit Argumenten ebenfalls einen **Wahrheitswert** zuordnen kann, können wir sie stets auch als **Aussagen** behandeln.

Beispiele für **Aussagen** in **Metasprache** sind (a) „Morgen scheint die Sonne.“, (b) „Ich bin 1,83 m groß.“, (c) „Ich habe ein rotes Auto und das kann 200 km/h schnell fahren.“, usw. Wie Beispiel (c) zeigt, kann eine **Aussage** auch aus anderen **Aussagen** zusammengesetzt sein. Wir definieren daher:

**Unteraussage** Eine **Aussage** *A* heißt eine **Unteraussage** von einer **Aussage** *B*, wenn sie Teil von *A* ist. Man sagt dann auch, dass *B* die **Unteraussage** *A* enthält.

**echte Unteraussage** Eine **Unteraussage** *A* von *B* heißt **echte Unteraussage** von *B*, wenn *A* verschieden von *B* ist.

<sup>8)</sup> Es wird sogar verschiedene **Objektsprachen** geben.

**zerlegbare Aussage** Eine **Aussage** heißt **zerlegbar**<sup>9)</sup> wenn sie mindestens eine **echte Unteraussage** enthält.

**atomare Aussage** Eine **Aussage** heißt **atomar**<sup>10)</sup>, wenn sie nicht **zerlegbar** ist, d. h. wenn sie keine **echte Unteraussage** enthält.

Während die Beispiele (a) und (b) **atomare Aussagen** sind, ist Beispiel (c) **zerlegbar**. Für alle drei **Aussagen** ist es sinnvoll zu fragen, ob sie gelten oder nicht; für (a) allerdings nur im Nachhinein und für den zweiten Teil von (c) nur weil klar ist, worauf sich „das“ bezieht. Offensichtlich muss manchmal der Zusammenhang, in dem eine **Aussage** formuliert wird, bekannt sein. Z. B. ist die Bedeutung von „Ich“ nur dann bekannt, wenn man weiss, von wem die **Aussage** ist.

### 2.1.2. Aussagen und Metaoperationen

**Zerlegbare Aussagen** wie (c) können zum Teil formalisiert werden. Dies wird mit den folgenden Definitionen erreicht:<sup>11)</sup>

$\sim A$	$\Leftrightarrow$	$A$ gilt nicht.
$A \Rightarrow B$	$\Leftrightarrow$	Wenn $A$ gilt dann gilt auch $B$ .
$A \Leftarrow B$	$\Leftrightarrow$	$A$ gilt sofern $B$ gilt.
$A \Leftrightarrow B$	$\Leftrightarrow$	$A$ gilt genau dann wenn $B$ gilt.
$A \& B$	$\Leftrightarrow$	$A$ und $B$ .
$A \parallel B$	$\Leftrightarrow$	$A$ oder $B$ .

Offensichtlich sind das alles ebenfalls **Aussagen**, jetzt aber teilweise formalisiert. (c) lässt sich dann ausdrücken als „Ich habe ein rotes Auto' & ,das kann 200 km/h schnell fahren.'“.  $\langle\langle A \Leftarrow B \rangle\rangle$  ist nur eine andere Schreibweise für  $\langle\langle B \Rightarrow A \rangle\rangle$ . – Ein Symbol für „nicht“ wird hier nicht gebraucht.

Wir nennen **&** und **||** **Metaoperationen** und  $\Rightarrow$ ,  $\Leftarrow$  und  $\Leftrightarrow$  **Metarelationen**<sup>12)</sup>. Die damit gebildeten **Aussagen** können natürlich auch geklammert werden, um die Reihenfolge der Auswertung eindeutig zu machen. Für den Fall fehlender Klammern sind ihre Prioritäten in der Tabelle 2.3 auf Seite 22 angegeben.

Um Verwechslungen mit den **Junktoren** zu vermeiden, verwenden wir für die metasprachlichen **Operationen** „und“ und „oder“ die Symbole  $\langle\&\rangle$  und  $\langle\parallel\rangle$ .  $A$  und  $B$  können als Operanden von  $\langle\Rightarrow\rangle$ ,  $\langle\&\rangle$  und  $\langle\parallel\rangle$  vertauscht werden, ohne das Ergebnis zu ändern.<sup>13)</sup> Wird in einer (Teil-)**Aussage** nur eine der **Operationen** **&** oder **||** verwendet, können die Klammern dort weggelassen und die **Operationen** in beliebiger Reihenfolge ausgewertet werden, wiederum ohne das Ergebnis zu ändern.<sup>14)</sup> Zusammengefasst ist die Reihenfolge der **Operationen** und der Auswertung dort beliebig.

<sup>9)</sup> alternativ: **zusammengesetzt** — wir unterscheiden allerdings die beiden Begriffe. Aus **zerlegbar** folgt **zusammengesetzt**, aber nicht immer umgekehrt.

<sup>10)</sup> alternativ: **unzerlegbar**

<sup>11)</sup> Damit es nicht zu Verwechslungen führt, verwenden wir für die metasprachliche Negation nicht das logische Symbol  $\neg$ . Wegen (2.1) Seite 20 ist die Definition von  $\langle\Leftarrow\rangle$  überflüssig, wird wegen der angegebenen Sprechweise aber dennoch angegeben.

<sup>12)</sup> Man könnte **Metaoperationen** und **Metarelationen** auch als **Metajunktoren** bezeichnen. Zur Unterscheidung von **Operationen** und **Relationen** vergleiche aber auch die Fußnote 32 auf Seite 20.

<sup>13)</sup> D. h. die **Operationen**  $\langle\Rightarrow\rangle$ ,  $\langle\&\rangle$  und  $\langle\parallel\rangle$  sind *kommutativ*.

<sup>14)</sup> D. h. die **Operationen** **&** und **||** sind auch *assoziativ*. Bei den den logischen **Operationen**  $\wedge$  und  $\vee$  müssen Kommutativität und Assoziativität durch **Axiome** gefordert werden. Die Kommutativität von  $\Leftrightarrow$  kann abgeleitet werden.



### 2.1.3. Mit Gleichheit verwandte Relationen

#### 2.1.3.1. Vergleichbar

Zwei Objekte  $A$  und  $B$  sind **vergleichbar**, wenn beide von derselben **Objektart** sind, d. h. wenn z. B. jeweils beide Mengen, **Zeichenfolgen**, Zahlen, usw. sind. Dabei muss bei **Formeln** zwischen der **Formel** an sich und dem Ergebnis der **Formel** unterschieden werden. Siehe Beispiel (a).

Intuitiv scheint klar zu sein, was damit gemeint ist. Wenn aber entschieden werden muss, ob z. B. (a) „1+1“ gleich „2“ oder (b) „1+1“ gleich „1 + 1“ ist, muss man erst entscheiden, von welcher **Objektart** die beiden zu vergleichenden Ausdrücke sind, d. h. *wie* verglichen wird. Wenn sie als jeweiliges Ergebnis der beiden **Formeln**, verglichen werden, dann ist (a) richtig. Wenn sie als **Formeln**, d. h. als **Zeichenfolgen**, verglichen werden, ist (a) falsch. Wenn die Ausdrücke in (b) als **Zeichenfolgen** verglichen werden, dann ist (b) richtig. Wenn sie als **Zeichenketten** verglichen werden, ist (b) falsch.

Die folgende Tabelle fasst das zusammen:

$A$	$B$	Objektart	$A$ gleich $B$
$1 + 1$	$2$	Objekt	richtig
$\langle\langle 1 + 1 \rangle\rangle$	$\langle\langle 2 \rangle\rangle$	Formel	falsch
$\langle\langle 1 + 1 \rangle\rangle$	$\langle\langle 1 + 1 \rangle\rangle$	Zeichenfolge	richtig
„1+1“	„1 + 1“	Zeichenkette	falsch

#### 2.1.3.2. Vergleiche

$A$  und  $B$  seien **Objekte**. Dann definieren wir:

**= Gleichheit**  $\langle\langle A = B \rangle\rangle$  heißt, dass  $A$  und  $B$  in den **interessierenden Eigenschaften** für  $=$  übereinstimmen.<sup>15)</sup> Sprechweisen: „ $A$  ist *dasselbe* wie  $B$ “ oder „ $A$  ist *identisch* zu  $B$ “ — Inwieweit die Begriffe *Gleichheit* und *Identität* korrelieren, wird hier nicht erörtert.<sup>16)</sup>

**≠ Ungleichheit**  $\langle\langle A \neq B \rangle\rangle$  heißt, dass  $A$  und  $B$  in mindestens einer **interessierenden Eigenschaft** für  $=$  nicht übereinstimmen. Sprechweisen: „ $A$  ist *nicht dasselbe* wie  $B$ “ (aber vielleicht das gleiche; siehe  $\Leftrightarrow$ ) oder „ $A$  ist *nicht identisch* zu  $B$ “.

**≡ Äquivalenz**  $\langle\langle A \equiv B \rangle\rangle$  heißt, dass  $A$  und  $B$  in den **interessierenden Eigenschaften** für  $\equiv$  übereinstimmen. Sprechweisen: „ $A$  ist *das gleiche* wie  $B$ “ (aber nicht unbedingt dasselbe; siehe  $=$ ) oder „ $A$  ist *so wie*  $B$ “. — Es kann auch verschiedene Äquivalenzen geben, für die dann verschiedene Bezeichnungen verwendet werden.

**≠ Kontravalenz**  $\langle\langle A \not\equiv B \rangle\rangle$  heißt, dass  $A$  und  $B$  in mindestens einer **interessierenden Eigenschaft** für  $\equiv$  nicht übereinstimmen. Sprechweisen: „ $A$  ist *nicht das gleiche* wie  $B$ “ oder „ $A$  ist *nicht so wie*  $B$ “.

$=$ ,  $\neq$ ,  $\equiv$  und  $\not\equiv$  bezeichnen wir als **Gleichheitsrelationen**. Gleichheit und Äquivalenz sind **Äquivalenzrelationen**, d. h. sie sind *reflexiv* ( $a \sim a$ ), *transitiv* ( $((a \sim b) \& (b \sim c)) \Rightarrow (a \sim c)$ ) und *symmetrisch* ( $((a \sim b) \Rightarrow (b \sim a))$ ) — jeweils für alle zulässigen Objekte  $a$ ,  $b$  und  $c$ .

Jede **interessierende Eigenschaft** für  $\equiv$  oder eine andere **Äquivalenz** muss auch eine für  $=$  sein. Daraus folgt insbesondere, dass mit  $(A = B)$  auch  $(A \equiv B)$  und mit  $(A \neq B)$  auch  $(A \not\equiv B)$  gilt.

<sup>15)</sup> Z. B. sind zwei **Junktoren** üblicherweise dann gleich, wenn sie stets denselben **Wahrheitswert** liefern. Ihre Bezeichnungen oder **Symbole** können dabei durchaus verschieden sein, interessieren bei der Feststellung der **Gleichheit** aber nicht. Z. B. bezeichnen  $\langle\&\rangle$  und  $\langle|\rangle$  dieselbe **Operation**, haben aber verschiedene Priorität. — siehe Tabelle 2.3 auf Seite 22

<sup>16)</sup> siehe [36]



### 2.1.3.3. Definitionen

Seien  $A$  und  $B$  Aussagen bzw. Objekte<sup>17)</sup>.

$\Leftrightarrow$  **Metadefinition**  $\langle\langle A \Leftrightarrow B \rangle\rangle$  heißt, dass die Aussage  $A$  definitionsgemäß gleich der Aussage  $B$  ist. Gewissermaßen ist  $A$  nur eine andere Schreibweise für  $B$ . „ $A$  steht für  $B$ “;  $A$  und  $B$  können sich gegenseitig ersetzen.

$\coloneqq$  **Definition**  $\langle\langle A \coloneqq B \rangle\rangle$  heißt, dass das Objekt  $A$  definitionsgemäß gleich dem Objekt  $B$  ist. Gewissermaßen ist  $A$  nur eine andere Schreibweise für  $B$ . „ $A$  steht für  $B$ “;  $A$  und  $B$  können sich gegenseitig ersetzen.<sup>18)</sup>

Man beachte, dass  $\Leftrightarrow$  und  $\coloneqq$  verschiedene Sprachebenen sind.

## 2.2. Notationen

Damit definieren wir für Elemente  $a$  und Mengen  $A$  und  $B$ <sup>19)</sup>

$\mathbb{N}$	$\coloneqq$	die Menge der <b>natürlichen Zahlen</b> ohne 0
$\mathbb{N}_0$	$\coloneqq$	die Menge der <b>natürlichen Zahlen</b> (einschließlich 0)
$a \in A$	$\Leftrightarrow$	$a$ ist <b>Element aus</b> $A$
$A \subset B$	$\Leftrightarrow$	$A$ ist <b>echte Teilmenge von</b> $B$
$A \subseteq B$	$\Leftrightarrow$	$A$ ist <b>Teilmenge von</b> $B$

$\in$ ,  $\subset$  und  $\subseteq$  sind **Relationen**, genauer **Mengenrelationen**. Gemäß (2.1) Seite 20 sind  $\ni$ ,  $\supset$  und  $\supseteq$  die **Umkehrrelationen** dazu (Sprechweisen: ... *enthält als Element* ... und *ist [echte] Obermenge von*). Es gelten entsprechende Gleichungen wie (2.3) und (2.4) Seite 20. Schließlich sind  $\notin$ ,  $\not\subset$ ,  $\not\subseteq$ ,  $\not\supset$ ,  $\not\supseteq$  und  $\not\ni$  gemäß (2.2) Seite 20 noch die zugehörigen **Negationen**.

Wenn wir von einer **natürlichen Zahl** sprechen, meinen wir immer ein Element aus  $\mathbb{N}_0$ .

### 2.2.1. Bezeichnungen

**Symbole** umfassen neben speziellen Symbolen auch Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen. Symbole, für die es kein eigenes typographisches Zeichen gibt, können auch durch Aufeinanderfolge mehrerer typographischer Zeichen, i. Alg. lateinische Buchstaben, dargestellt werden. Wir nennen sie dann **zusammengesetzte Symbole**, im Gegensatz zu den **einfachen Symbolen**. Charakteristisch für ein Symbol ist, dass es ohne Bedeutungsverlust nicht zerlegt werden kann. Ein **zusammengesetztes Symbol plural** ist i. Alg. **zerlegbar**, kann aber auch als **atomar**, d. h. unzerlegbar, definiert werden, wie z. B.  $\sin$  als **Symbol** für die Sinusfunktion. Symbole werden  $\langle$ so $\rangle$  quotiert; **zerlegbare** können aber auch wie **Zeichenfolgen** quotiert werden. — Die Quotierung ist kein Bestandteil des Symbols!

Wird für bestimmte Objekte ein Symbol verwendet, so nennen wir dies ein **Objektsymbol**. Ist das Objekt eine Funktion, Operation, Relation usw., so nennen wir das Symbol ein **Funktionsymbol**, **Operationssymbol**, **Relationssymbol** usw.

<sup>17)</sup> Die Anforderungen an  $A$  und  $B$  sind intuitiv klar. Insbesondere darf  $B$  nicht von einem bisher undefinierten Teil von  $A$  abhängig sein.

<sup>18)</sup> Nach den Definitionen von  $\Leftrightarrow$  und  $\coloneqq$  sind zwei Ausdrücke  $P$  und  $Q$  schon dann gleich, wenn nach der Ersetzung aller Vorkommen von  $A$  durch  $B$  sowohl in  $P$  als auch in  $Q$  die resultierenden Ausdrücke  $\bar{P}$  und  $\bar{Q}$  gleich sind.

<sup>19)</sup> In der Literatur wird  $\langle \subset \rangle$  oft in der Bedeutung von  $\langle \subseteq \rangle$  verwendet. Wir verwenden  $\langle \subset \rangle$  jedoch nur, wenn wir explizit **Ungleichheit** verlangen.

**Zeichenketten** sind Folgen von einfachen **Symbolen**, in denen im Prinzip auch Leerstellen und andere nicht druckbare Zeichen zulässig sind.<sup>20)</sup> Damit Leerstellen in **Zeichenketten** leicht bestimmt und sogar gezählt werden können, werden **Zeichenketten** stets „in dieser“ Schriftart und Quotierung dargestellt. — Die Quotierung ist kein Bestandteil der **Zeichenkette** !

**Zeichenfolgen** sind ähnlich wie **Zeichenketten**, außer das sie als Bausteine neben einfachen auch zusammengesetzte, aber **atomare Symbole** enthalten können und Leerzeichen und andere Zwischenraumzeichen nicht zählen. Letztere dienen nur der optischen Trennung der **Symbole** und der besseren Lesbarkeit. **Zeichenfolgen** werden stets «in dieser» Quotierung dargestellt. — Die Quotierung ist kein Bestandteil der **Zeichenfolge** !

**Formeln** sind in diesem Dokument immer nach vorgegebenen Regeln aufgebaute **Zeichenfolgen**<sup>21)</sup>. Daher werden sie wie **Zeichenfolgen** quotiert. — Die Quotierung ist kein Bestandteil der **Zeichenfolge** !

Man kann eine **Formel** auch dadurch charakterisieren, dass sie ein Element einer vorgegebenen Menge  $\mathcal{L}$  von **Zeichenfolgen** ist.<sup>22)</sup> Das ist dann so ziemlich die einfachste Regel.

Wenn eine **Zeichenfolge** nicht korrekt nach den vorgegebenen Regeln aufgebaut ist bzw. kein Element der vorgegebenen Menge  $\mathcal{L}$  ist, werden wir sie *nicht* als **Formel** bezeichnen, auch nicht als „fehlerhafte Formel“ oder ähnlich. Sie ist dann einfach keine **Formel** .

**Objekte** sind z. B. **Symbole**, **Zeichenketten**, **Zeichenfolgen** und **Formeln**, oder auch **Aussagen**, Mengen, Zahlen, usw. — ganz allgemein reale oder gedachte Dinge an sich. Eine **Formel** , die nicht quotiert ist, steht für den Wert dieser **Formel** , der dann wieder ein **Objekt** ist. Entsprechend steht ein **Symbol** , das nicht quotiert ist, für das dadurch bezeichnete **Objekt** . Z. B. bezeichnet das **Symbol**  $\langle \mathbb{N} \rangle$  die Menge  $\mathbb{N}$  der natürlichen Zahlen ohne 0.

### 2.2.2. Quotierung

Zur Verdeutlichung der soeben definierten Quotierungen ein Beispiel:<sup>23)</sup>

sin	<b>Objekt</b>	die Sinusfunktion
$\langle \text{sin} \rangle$	<b>Symbol</b> (Bezeichnung)	für das <b>Objekt</b>
$\langle\langle \text{sin} \rangle\rangle$	<b>Zeichenfolge</b> ( <b>Formel</b> )	aus dem zusammengesetzten, <b>atomaren Symbol</b> $\langle \text{sin} \rangle$
$\langle\langle \text{sin} \rangle\rangle$	<b>Zeichenfolge</b> ( <b>Formel</b> )	aus den einfachen <b>Symbolen</b> $\langle s \rangle$ , $\langle i \rangle$ und $\langle n \rangle$
“sin”	<b>Zeichenkette</b>	aus den einfachen <b>Symbolen</b> $\langle s \rangle$ , $\langle i \rangle$ und $\langle n \rangle$

Die Bezeichnung eines **Objekt**  $s$  kann auch aus mehreren Symbolen bestehen, d. h. einer **Zeichenfolge** oder sogar einer ganzen **Formel** ; z. B. ist die Bezeichnung für das indizierte **Objekt**  $a_i$  gleich  $\langle\langle a_i \rangle\rangle$ .

### 2.2.3. Weitere Bezeichnungen

#### Folge

**Tupel** Ein  $n$ -**Tupel** ist eine endliche Folge  $\vec{a} = (a_1, \dots, a_n)$  mit folgenden Eigenschaften:

<sup>20)</sup> Da beim Ausdruck optisch nicht entschieden werden kann, ob ein Zwischenraum (white space) aus einem Tabulator oder evtl. mehreren Leerzeichen besteht, verwenden wir nur einzelne Leerzeichen als Zwischenraumzeichen und vermeiden Zeilenumbrüche.

<sup>21)</sup> Es kann verschiedene Arten von **Formeln** geben, z. B. aussagenlogische, prädikatenlogische und solche, die ein Taschenrechner auswerten kann.

<sup>22)</sup> Die **Formel** wird dann auch **Wort** der **Sprache**  $\mathcal{L}$  genannt - besonders, wenn die Elemente aus  $\mathcal{L}$  **Zeichenketten** statt **Zeichenfolgen** sind. Wir bleiben der Klarheit willen bei „**Formel**“.

<sup>23)</sup> Was **atomare** und was **zerlegbare Symbole** sind, muss jeweils definiert werden, bzw. ergibt sich aus dem Zusammenhang.

- $n$ , die **Länge**, d. h. die Anzahl der **Komponenten** aus  $\vec{a}$ , ist eine natürliche Zahl.

$$\text{len } \vec{a} := \text{len}(\vec{a}) := n$$

- Die  $a_i$  für  $1 \leq i \leq n$  sind Elemente meist vorgegebener Mengen.
- $\text{set } \vec{a} := \text{set}(\vec{a}) :=$  die Menge aller Komponenten  $a_i$  aus  $\vec{a}$ .

Für  $n = 0$  ist  $\vec{a} = ()$ , das **leere Tupel** oder **0-Tupel**.

Wo immer  $\vec{a}$  und  $a_i$  mit  $i \in \mathbb{N}_0$  gemeinsam vorkommen, ist  $a_i$  die  $i$ -te Komponente aus  $\vec{a}$ .

**Relation** Eine  $n$ -stellige **Relation** <sup>24)</sup>  $R$  ist ein  $(1+n)$ -**Tupel**  $(G, A_1, \dots, A_n)$  mit folgenden Eigenschaften:

- $n$ , die **relationale Stelligkeit**, ist eine natürliche Zahl.

$$\text{stel}_r R := \text{stel}_r(R) := n$$

- Die  $A_i$  für  $1 \leq i \leq n$  sind Mengen, die **Trägermengen** (carrier) von  $R$ .

$$\text{car}_i R := \text{car}_i(R) := A_i$$

- $G$ , der **Graph** von  $R$ , ist eine Teilmenge des kartesischen Produkts  $A_1 \times \dots \times A_n$ .

$$\text{graph } R := \text{graph}(R) := G \quad (\text{oft einfach mit } R \text{ bezeichnet})$$

- $R(a_1, \dots, a_n) \Leftrightarrow (a_1, \dots, a_n) \in G$

Für  $n = 0$  ist  $G \subseteq \{()\}$  <sup>25)</sup>, d. h.  $R()$  ist entweder **wahr** (**true**) oder **falsch** (**false**).

Für  $n = 1$  ist  $G \subseteq A_1$ , d. h.  $R$  kann als Teilmenge von  $A_1$  aufgefasst werden.

Für  $n = 2$  heißt die Relation **binär** und man schreibt  $\langle\langle xRy \rangle\rangle$  statt  $\langle\langle R(x,y) \rangle\rangle$  bzw.  $\langle\langle (x,y) \in R \rangle\rangle$ .

Ist  $R = (G, M, \dots, M)$ , so heißt  $R$  eine  $n$ -stellige Relation **auf** <sup>26)</sup>  $M$ .

Ist  $|G|$  endlich, so nennen wir auch  $R$  **endlich**.

**Umkehrrelation** Die **Umkehrrelation** einer binären Relation  $(G, A, B)$  ist die Relation  $(G', B, A)$  mit  $G' := \{(b, a) \mid (a, b) \in G\}$ . Üblicherweise wird das zugehörige Relationssymbol gespiegelt.

**Funktion** Eine  $n$ -stellige **Funktion** <sup>27)</sup> ist ein  $(1+n+1)$ -**Tupel**  $f = (G, A_1, \dots, A_n, B)$  mit folgenden Eigenschaften:

- $n$ , die **Stelligkeit** <sup>28)</sup>, ist eine natürliche Zahl.

$$\text{stel}_f f := \text{stel}_f(f) := n$$

- $f$  ist eine  $(n+1)$ -stellige Relation.

- Zu jedem  $n$ -**Tupel**  $\vec{a} = (a_1, \dots, a_n)$  mit  $a_i \in A_i$  für  $1 \leq i \leq n$  gibt es genau ein  $b \in B$  mit  $(a_1, \dots, a_n, b) \in G$ , den **Funktionswert** von  $\vec{a}$ .

$$f\vec{a} := fa_1 \dots a_n := f(\vec{a}) := f(a_1, \dots, a_n) := b \quad \text{<sup>29)</sup>}$$

- $A = A_1 \times \dots \times A_n$  ist der **Definitionsbereich** (domain) von  $f$ .

$$\text{dom } f := \text{dom}(f) := A_1 \times \dots \times A_n$$

<sup>24)</sup> siehe [45]

<sup>25)</sup> Das kartesische Produkt enthält nur noch das 0-Tupel  $()$ .

<sup>26)</sup> alternativ: **in**

<sup>27)</sup> siehe [31]

<sup>28)</sup> Die Werte der Stelligkeit als Relation und als Funktion sind verschieden, d. h. es gilt stets:  $\text{stel}_r(f) = \text{stel}_f(f) + 1$ .

<sup>29)</sup>  $f(a_1, \dots, a_n)$  und  $f(a_1, \dots, a_n, b)$  sind wohl zu unterscheiden. Ersteres ist ein Funktionsaufruf mit einem Funktionswert, letzteres eine Relation mit einem Wahrheitswert.

- $B$  ist der **Zielbereich** (target) von  $f$

$$\text{tar } f := \text{tar}(f)$$

Für  $n = 0$  ist  $G = ((), b)$  für ein  $b \in B$  und somit  $f() = b$ .  $f$  kann damit auch als Konstante  $b$  aufgefasst werden.<sup>30)</sup>

Man sagt:  $f$  ist eine  $n$ -stellige **Funktion** von  $A_1 \times \dots \times A_n$  **nach**<sup>31)</sup>  $B$  (Schreibweise:  $f : A_1 \times \dots \times A_n \rightarrow B$ ) oder, im Fall  $n = 1$ ,  $f$  ist eine Funktion von  $A$  nach  $B$  (Schreibweise:  $f : A \rightarrow B$ ). Mit  $A := A_1 \times \dots \times A_n$  kann für  $n > 0$  jede Funktion als 1-stellig aufgefasst werden.

**Operationen** in oder auf einer Menge  $M$  sind  $n$ -stellige Funktionen  $M^n \rightarrow M$ . Für eine **binäre**, d. h. 2-stellige **Operation**  $\otimes$  schreibt man i. Alg.  $\langle\langle x \otimes y \rangle\rangle$  statt  $\langle\langle \otimes(x, y) \rangle\rangle$ . Wenn nicht anders angegeben, sind **Operationen** stets binär. 0-stellige **Operationen** können wieder als Konstante aufgefasst werden.

Um Missverständnisse zu vermeiden, werden wir den Begriff „Operator“ nicht verwenden.

**Junktoren** sind aussagenlogische **Relationen** und **Operationen**.<sup>32)</sup>

## 2.2.4. Relationen und Operationen

Als Beispielsymbol für unäre **Operationen** wird  $\langle\ominus\rangle$  und für binäre **Operationen**  $\langle\otimes\rangle$  verwendet. Beispielsymbole für binäre **Relationen** sind  $\langle<\rangle$  und  $\langle\leq\rangle$ , für ihre **Umkehrrelationen**  $\langle>\rangle$  bzw.  $\langle\geq\rangle$  sowie für ihre **Negationen**  $\langle\neq\rangle$  bzw.  $\langle\neg\rangle$ .<sup>33)</sup> Wenn nichts anderes gesagt wird, gelte mit diesen Symbolen bei gegebenem  $\langle<\rangle$  stets:

$$(A > B) \quad :\Leftrightarrow \quad (B < A) \quad , \text{ die Umkehrrelation von } < \quad (2.1)$$

$$(A \neq B) \quad :\Leftrightarrow \quad \sim (A < B) \quad , \text{ die Negation von } < \quad (2.2)$$

Dabei ist  $\langle>\rangle$  ist die waagerechte Spiegelung von  $\langle<\rangle$  und statt des senkrechten kann auch ein schräger Strich genommen werden.

Ist  $\langle>\rangle$ ,  $\langle\leq\rangle$  oder  $\langle\geq\rangle$ , statt  $\langle<\rangle$  gegeben, so müssen die Symbole entsprechend ausgetauscht werden. Entsprechend für die nächsten beiden Definitionen.

Je nachdem ob  $<$  oder  $\leq$  gegeben ist gelte ferner:

$$(A \leq B) \quad :\Leftrightarrow \quad ((A < B) \parallel (A = B)) \quad (2.3)$$

$$(A < B) \quad :\Leftrightarrow \quad ((A \leq B) \& (A \neq B)) \quad (2.4)$$

Man beachte, dass, wenn man  $\langle:\Leftrightarrow\rangle$  durch  $\langle\Rightarrow\rangle$  ersetzt, weder (2.3) aus (2.4) folgt noch umgekehrt. (2.3) und (2.4) folgen aber dann auseinander, wenn aus  $\langle<\rangle$  die Ungleichheit bzw. aus der Gleichheit  $\langle\leq\rangle$  folgt. Beispiele dazu sind in der Tabelle 2.2 auf der nächsten Seite angegeben.

<sup>30)</sup> Bei der Schreibweise ohne Klammern steht da statt  $\langle\langle f() \rangle\rangle$  nur noch  $\langle\langle f \rangle\rangle$  und statt  $\langle\langle f() = b \rangle\rangle$ , insgesamt also nur noch  $\langle\langle f = b \rangle\rangle$ .

<sup>31)</sup> alternativ: **in**

<sup>32)</sup> Ein  $n$ -stelliger **Junktor**  $J$  sei eine **Operation** und somit eine **Funktion**. Wegen  $M = \{\text{true}, \text{false}\}$  kann er auch als eine  $n$ -stellige **Relation**  $J'$  aufgefasst werden:  $J' := \{\vec{a} \in M^n \mid J(\vec{a}) = \text{true}\}$ .

Umgekehrt kann eine  $n$ -stellige aussagenlogische **Relation**  $J'$  mittels:  $J''(\vec{a}) := \text{true}$  für  $\vec{a} \in J'$ , **false** sonst, für  $\vec{a} \in M^n$ , als  $n$ -stellige **Operation** aufgefasst werden.

Falls  $J(\vec{a}) = \text{true}$  ist  $\vec{a} \in J'$  und somit  $J''(\vec{a}) = \text{true}$ . Für  $J(\vec{a}) = \text{false}$  ist  $\vec{a} \notin J'$  und somit  $J''(\vec{a}) = \text{false}$ . Also ist  $J = J''$  und so können die aussagenlogischen  $n$ -stelligen **Relationen** und **Operationen** einander eindeutig zugeordnet werden.

Daher sind in der Aussagenlogik **Relationen** und **Operationen** nicht von vornherein unterscheidbar. Wegen der Verabredungen in Unterabschnitt 2.2.4 muss für die verwendeten **Junktoren** daher jeweils wohl definiert sein, ob sie als **Relation** und **Operation** zu verstehen sind.

<sup>33)</sup> Die **Relationen** brauchen keine Ordnungsrelationen sein, auch wenn die angegebenen Symbole dies nahe legen. Wenn eine der **Relationen**  $<$ ,  $\leq$ ,  $>$  oder  $\geq$  definiert ist, sind wegen (2.1), (2.3) und (2.4) auch die anderen drei **Relationen** definiert sowie wegen (2.2) auch  $\neq$ ,  $\neq$ ,  $\neq$  und  $\neq$ . Der senkrechte Strich bei den **Negationen** kann auch schräg sein, wie z. B. bei  $\neq$ .

	$A, A$	$A, B$	$B, A$	$B, B$	
$=$	$A = A$		$B = B$		
$<$	$A < B$				Es gilt (2.3)
$\leq$	$A \leq A$	$A \leq B$	$B \leq B$		und (2.4)
$<$	$A < B$		$B < B$		Es gilt (2.3)
$\leq$	$A \leq A$	$A \leq B$	$B \leq B$		aber nicht (2.4)
$<$	$A < B$				Es gilt (2.4)
$\leq$	$A \leq A$	$A \leq B$			aber nicht (2.3)

Tabelle 2.2.: Beispiele für  $<$  und  $\leq$ 

Wird eine binäre Relation  $<$  zusammen mit einer binären Operation  $\circledast$  oder einer weiteren binären Relation  $\approx$  verwendet wird, treffen wir folgende Vereinbarung:<sup>34)</sup>

$A \circledast B < C$	steht für	$A \circledast B$	$\&$	$B < C$
$A < B \circledast C$	steht für	$A < B$	$\&$	$B \circledast C$
$A < B \approx C$	steht für	$A < B$	$\&$	$B \approx C$

Besondere Vereinbarungen für die unäre Operation  $\langle \ominus \rangle$  treffen wir nicht.

Für den Fall fehlender Klammern sind die Prioritäten in der Tabelle 2.3 auf der nächsten Seite angegeben. Damit wären dann alle Klammern in diesem Unterabschnitt 2.2.4 überflüssig.

### 2.2.5. Prioritäten

Die Tabelle 2.3 auf der nächsten Seite listet zur Vermeidung von Klammern die Prioritäten der in diesem Dokument verwendeten Operationen, Relationen, Junktoren und Definitionen in absteigender Folge von höherer zu niedrigerer Priorität, d. h. von starker zu schwacher Bindung auf.<sup>35)</sup> Das Weglassen redundanter Klammern wird in diesem Kapitel 2 nicht weiter thematisiert.<sup>36)</sup> Zur besseren Verständlichkeit werden aber gelegentlich auch redundante Klammern verwendet, insbesondere wenn Prioritäten unklar oder in der Literatur auch anders definiert sind. Die Prioritäten der Junktoren wurden aus [1] Kapitel 1.1 Seite 5 entnommen und ergänzt und die der Metaoperationen daran angeglichen.

Für Operationen derselben Priorität wählen wir in diesem Dokument Rechtsklammerung<sup>37)</sup>.

<sup>34)</sup> wird auch in der Literatur verwendet, z. B. z. B. [1], Notationen Seite xxi

<sup>35)</sup> Priorität 1 ist höher und bindet damit stärker als Priorität 2, usw.

<sup>36)</sup> Gesetzt den Fall, dass ASBA die Voraussetzungen und Folgerungen eines mathematischen Satzes richtig und die Beweisschritte, z. B. durch fehlerhafte Interpretation einer Formel, falsch einliest, ansonsten aber richtig arbeitet. Dann kann man folgende Fälle unterscheiden:

— Ein falscher Satz kann dadurch nicht als richtig bewertet werden.

— Ein richtiger Satz wird wahrscheinlich auch bei eigentlich richtigem Beweis als nicht bewiesen gelten, was natürlich unbefriedigend ist.

— In äußerst unwahrscheinlichen Fällen kann dabei auch ein eigentlich falscher Beweis in einen richtigen verwandelt werden, was zwar schön ist, aber leider steht in der Dokumentation dann ein falscher Beweis.

In keinem Fall wird durch diesen Fehler die Menge der richtigen Sätze durch einen falschen Satz „verunreinigt“.

<sup>37)</sup> Die Symbole unärer Operationen stehen in diesem Dokument stets links vor dem Operanden, so dass es für sie nur Rechtsklammerung geben kann. Zur Rechtsklammerung bei binären Operationen ein Zitat aus [1] Kapitel 1.1 Seite 5: „Diese hat gegenüber Linksklammerung Vorteile bei der Niederschrift von Tautologien in  $\rightarrow, [\dots]$ “. Die meisten Autoren bevorzugten Linksklammerung, was natürlicher erscheint. Dann sollte man aber für die Potenz doch noch Rechtsklammerung wählen, sonst ist  $\langle\langle a^{x^y} = (a^x)^y = a^{(x*y)} \rangle\rangle$  und nicht wie wahrscheinlich erwünscht  $\langle\langle a^{(x^y)} \rangle\rangle$ .

Klammern	( ) < > ‹ › “ ”
<b>Operationen</b> haben unterschiedliche Priorität.	
Unäre <b>Operationen</b> <sup>1) 2)</sup>	$\ominus \neg \sim$
Binäre <b>Operationen</b> für Mengen	$\times$ $\cup$ $\cap$
Binäre <b>Operationen</b> <sup>1)</sup>	$\otimes$
Binäre <b>Junktoren</b> <sup>2)</sup>	$\wedge \uparrow$ $\vee + \downarrow$ $\leftarrow \rightarrow$ $\leftrightarrow$
Binäre Relationen haben gleiche Priorität.	
Binäre Relationen für Mengen <sup>3)</sup>	$\in \ni \subset \subseteq \supset \supseteq$
Binäre <b>Relationen</b> <sup>1)</sup>	$< \nless \leq \nless \geq \gtrless$
<b>Gleichheitsrelation</b> <sup>4)</sup>	$= \neq \equiv \neq$
<b>Ableitungsrelation</b> <sup>5)</sup>	$\vdash$
<b>Ersetzung</b> <sup>5)</sup>	$\mapsto \leftarrow$
Sonstige binäre Verknüpfungen haben unterschiedliche Priorität.	
<b>Definition</b> <sup>6)</sup>	$:=$
Binäre <b>Metaoperationen</b> <sup>7) 8)</sup>	$\&$ $\parallel$ $\perp$ $\Leftarrow \Leftrightarrow \Rightarrow$
<b>Metadefinition</b> <sup>6)</sup>	$:\Leftrightarrow$
Natürliche Sprache	
Innerhalb natürlicher Sprache deren Strukturelemente, z. B. Satzzeichen <sup>9)</sup>	$\cdot , ;$ usw.

<sup>1</sup> siehe Unterabschnitt 2.2.4 auf Seite 20

<sup>2</sup> siehe Tabelle 2.4 auf Seite 29

<sup>3</sup> siehe Unterabschnitt 2.2.1 auf Seite 17

<sup>4</sup> siehe Paragraph 2.1.3.2 auf Seite 16

<sup>5</sup> siehe Unterabschnitt 3.1.1 auf Seite 34

<sup>6</sup> siehe Paragraph 2.1.3.3 auf Seite 17

<sup>7</sup> siehe Unterabschnitt 2.1.2 auf Seite 15

<sup>8</sup>  $\langle | \rangle$  wird nur bei den **Schlussregeln** (siehe Unterabschnitt 2.3.3 auf Seite 25) verwendet. Zwar bezeichnen  $\langle \& \rangle$  und  $\langle | \rangle$  dieselbe **Operation**, aber je nach verwendetem Symbol hat sie eine unterschiedliche Priorität.

<sup>9</sup> Innerhalb von **Formeln** können Satzzeichen eine andere Bedeutung und Priorität haben.

**Tabelle 2.3.:** Prioritäten in abnehmender Reihenfolge



## 2.3. Beweise in ASBA

Die Regeln zur Formulierung und Prüfung der **Beweise** müssen in **ASBA** fest codiert werden. Sie sind quasi die **Axiome** von **ASBA** und sollten daher möglichst wenig voraussetzen. In **ASBA** wird dazu ein *Genzen-Kalkül*<sup>38)</sup> verwendet. Die Definition von *Schlussregel* und *Beweis* ist in diesem Dokument **ASBA**-spezifisch, um später eine leichtere Umsetzung in ein Programm zu erreichen. Insbesondere müssen alle abzuspeichernden Mengen endlich sein. Dies berücksichtigen wir in den Beispielen, fordern zunächst aber nicht notwendig Beschränktheit. Zuerst brauchen wir aber noch ein paar Definitionen.

### 2.3.1. Definitionen und Verabredungen

Zu  $\langle \text{len} \rangle$  und  $\langle \text{set} \rangle$  Vergleiche die Definition von *n-Tupel* im Unterabschnitt 2.2.3 auf Seite 18.

$ M $	$\coloneqq$	Kardinalität von $M$	, die <b>Anzahl der Elemente</b> aus $M$	
$M^n$	$\coloneqq$	$M \times \cdots \times M$	, für $n \in \mathbb{N}_0$	, das <b>kartesische Produkt</b> aus $n$ Mengen $M$
$M^0$	$=$	$\{()\}$		, wobei $()$ das <b>0-Tupel</b> ist
$\mathfrak{T}(M)$	$\coloneqq$	$\{\vec{a} \mid \vec{a} \in M^n \wedge n \in \mathbb{N}_0\}$		, die Menge der <b>Tupel</b> über $M$ ( <b>Tupelmenge</b> )
$(A, B)^<$	$\coloneqq$	$A$		, die <b>linke Seite</b> eines geordneten Paares. (2.5)
$(A, B)^>$	$\coloneqq$	$B$		, die <b>rechte Seite</b> eines geordneten Paares. (2.6)
$\mathfrak{P}(M)$	$\coloneqq$	$\{A \mid A \subseteq M\}$		, die <b>Potenzmenge</b> der Menge $M$ (2.7)
$\mathfrak{P}_e(M)$	$\coloneqq$	$\{A \mid A \subseteq M \wedge  A  \in \mathbb{N}_0\}$		, die <b>endlichen Teilmengen</b> von $M$
$\mathfrak{R}(M)$	$\coloneqq$	$\{R \mid R \subseteq M \times M\}$		, die Menge der <b>binären Relationen</b> in $M$ (2.8)
$\mathfrak{R}_e(M)$	$\coloneqq$	$\{R \mid R \subseteq M \times M \wedge  R  \in \mathbb{N}_0\}$		, die <b>endlichen binären Relationen</b> in $M$
$\vdash_R$	$\coloneqq$	$R$		, für Relationen $R \in \mathfrak{R}(\mathfrak{P}(\mathcal{L}))$ (2.9)

Offensichtlich gilt für Mengen  $M$  und  $N$ :

$$\mathfrak{P}_e(M) \subseteq \mathfrak{P}(M) \quad , \quad \mathfrak{R}_e(M) \subseteq \mathfrak{R}(M) \quad (2.10)$$

$$\mathfrak{R}(M) = \mathfrak{P}(M \times M) = \mathfrak{P}(M^2) \quad , \quad \mathfrak{R}_e(M) = \mathfrak{P}_e(M \times M) = \mathfrak{P}_e(M^2) \quad (2.11)$$

$$\mathfrak{P}(M) \subset \mathfrak{P}(N) \quad \Leftrightarrow \quad \mathfrak{P}_e(M) \subset \mathfrak{P}_e(N) \quad \Leftrightarrow \quad M \subset N$$

$$\mathfrak{R}(M) \subset \mathfrak{R}(N) \quad \Leftrightarrow \quad \mathfrak{R}_e(M) \subset \mathfrak{R}_e(N) \quad \Leftrightarrow \quad M \subset N$$

$$\vec{a} \in \mathfrak{T}(M^2) \quad \Leftrightarrow \quad \text{set}(\vec{a}) \in \mathfrak{R}_e(M) \quad (2.12)$$

### 2.3.2. Formeln und Ableitungen

Im Folgenden sei  $\mathcal{L}$  stets eine gegebene Menge von **Formeln**, z. B. alle korrekten **Formeln** der **Aussagenlogik** oder der **Prädikatenlogik**. Für die folgenden Betrachtungen ist aber nur nötig, dass die Elemente aus  $\mathcal{L}$  **Zeichenfolgen** sind. Die Teilmengen von  $\mathcal{L}$  nennen wir **Formelmengen**. Es sind genau die Elemente aus  $\mathfrak{P}(\mathcal{L})$ .

Bei einem Beweis werden aus einer **Formelmenge**  $\Gamma$  von **Axiomen** und schon bewiesenen **Formeln** mittels zulässiger<sup>39)</sup> **Ableitungen** die **Formeln** einer **Formelmenge**  $\Delta$  abgeleitet; Schreibweise:  $\langle \Gamma \vdash \Delta \rangle$ .

Für Teilmengen  $\Gamma$  und  $\Delta$  von  $\mathcal{L}$  sei also:

<sup>38)</sup> siehe [1] Kapitel 1.4 und [46, 48]

<sup>39)</sup> Was *zulässig* heißt, muss im entsprechenden Kontext jeweils definiert sein. Üblicherweise sind das bestimmte Ableitungsregeln und Ersetzungen.

- $\Gamma \vdash \Delta \Leftrightarrow \Gamma$  **ableitbar**  $\Delta$ ; oder auch  $\Gamma$  **beweisbar**  $\Delta$ .
- $\Gamma \vdash \Delta$  nennen wir auch eine **Ableitung** in  $\mathcal{L}$ . Damit ist  $(\Gamma, \Delta)$  ein Element einer binären Relation  $\vdash$  in  $\mathfrak{P}(\mathcal{L})$ , einer sogenannten **Ableitungsrelation**.
- Wenn wir von einer Ableitung  $\mathbf{a}$  sprechen, meinen wir immer ein Element einer **Ableitungsrelation**, d. h. ein geordnetes Paar, z. B.  $(\Gamma, \Delta) \in \mathfrak{P}(\mathcal{L}) \times \mathfrak{P}(\mathcal{L})$ , dargestellt als  $\Gamma \vdash \Delta$ .
- Um möglicherweise verschiedene **Ableitungsrelationen** unterscheiden zu können, indizieren wir  $\langle \vdash \rangle$  ggf. mit der zugrundeliegenden **Relation**  $R$ , d. h. wir schreiben  $\langle \vdash_R \rangle$  und sprechen dann von **R-ableitbar**, **R-beweisbar** und **R-Ableitung**.

Zur Vereinfachung der Darstellung und besseren Lesbarkeit treffen wir noch folgende Vereinbarungen für die beiden Seiten von  $\langle \Gamma \vdash \Delta \rangle$  (natürlich nur, wenn dies nicht zu Verwechslungen führt):

- Eine Aufzählung von **Formelmengen** und einzelnen **Formeln** steht für die Vereinigung der **Formelmengen** mit der Menge der einzeln angegebenen **Formeln**. Z. B. steht  $\langle \Gamma, \alpha \vdash \beta \rangle$  für  $\langle (\Gamma \cup \{\alpha\}) \vdash \{\beta\} \rangle$ .
- Diese Aufzählungen können auch leer sein und stehen dann für die **leere Menge**. Z. B. steht  $\langle \vdash \alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha) \rangle$  für  $\langle \emptyset \vdash \{\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)\} \rangle$ .
- Ist die Aufzählung links vom Relationssymbol  $\langle \vdash \rangle$  leer, kann auch das Relationssymbol wegfallen. Im letzten Beispiel also einfach  $\langle \{\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)\} \rangle$ . Das entspricht dann einem **Axiom**.

Im Folgenden halten wir uns bei der Verwendung von Buchstaben so weit wie möglich an folgende Vereinbarungen:<sup>40)</sup>

griechisch, klein:	$\alpha, \beta, \gamma, \dots$	<b>Formel</b>	$\in$	$\mathcal{L}$
griechisch, groß:	$\Gamma, \Delta, \Theta, \dots$	<b>Formelmenge</b>	$\in$	$\mathfrak{P}(\mathcal{L})$
lateinisch, fett, klein:	$\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \dots$	<b>Ableitung</b>	$\in$	$\mathfrak{P}(\mathcal{L})^2$
lateinisch, fett, groß:	$\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \dots$	<b>Ableitungsrelation</b>	$\in$	$\mathfrak{P}(\mathfrak{P}(\mathcal{L})^2) = \mathfrak{A}(\mathfrak{P}(\mathcal{L}))$

Damit definieren wir folgende Aussagen:

$$\frac{\mathbf{A}}{\mathbf{B}} \Leftrightarrow \text{Mit den Ableitungen aus } \mathbf{A} \text{ lassen sich die aus } \mathbf{B} \text{ ableiten.} \quad (2.13)$$

$$\frac{\vec{\mathbf{a}}}{\vec{\mathbf{b}}} \Leftrightarrow \text{Mit den Komponenten aus } \vec{\mathbf{a}} \text{ lassen sich die aus } \vec{\mathbf{b}} \text{ ableiten.} \quad (2.14)$$

$$\frac{\mathbf{a}_1 \mid \dots \mid \mathbf{a}_n}{\mathbf{b}_1 \mid \dots \mid \mathbf{b}_m} \Leftrightarrow \text{Mit den Ableitungen } \mathbf{a}_i \text{ lassen sich die } \mathbf{b}_j \text{ ableiten.} \quad (2.15)$$

wobei in der letzten Definition  $1 \leq i \leq n$  und  $1 \leq j \leq m$  sei und die  $\mathbf{a}_i$  und die  $\mathbf{b}_j$  dabei jeweils beliebig permutiert werden können.  $\langle \mid \rangle$  und Bruchstrich stehen für die **Metaoperationen**  $\langle \& \rangle$  und  $\langle \Rightarrow \rangle$ .<sup>41)</sup> Wir nennen alle drei Formen **Schlussregeln**.<sup>42)</sup> Die Elemente aus  $A$  bzw. die Komponenten  $a_i$  nennen wir die **Voraussetzungen** und die Elemente aus  $B$  bzw. die Komponenten  $b_j$  die **Folgerungen** der **Schlussregel**. Offensichtlich gilt:

$$\frac{a_1 \mid \dots \mid a_n}{b_1 \mid \dots \mid b_m} \Leftrightarrow \frac{\vec{\mathbf{a}}}{\vec{\mathbf{b}}} \Leftrightarrow \frac{\text{set}(\vec{\mathbf{a}})}{\text{set}(\vec{\mathbf{b}})} \quad (2.16)$$

<sup>40)</sup> Die letzte Gleichung ergibt sich aus (2.11) auf Seite 23.

<sup>41)</sup> Der Bruchstrich hat die übliche Priorität,  $\mid$  die schwächste. Man beachte, dass Zähler und Nenner auch leer sein können, d. h.  $n$  und  $m$  gleich 0 sein dürfen. In der Praxis liegen sie bei kleinen Werten, typischerweise 0, 1 oder 2.

<sup>42)</sup> Genau genommen nur um die Darstellung einer Schlussregel. Die Exakte Definition erfolgt im Unterabschnitt 2.3.3 auf der nächsten Seite.



Wir nennen eine **Schlussregel** auch einen **formalen Satz** und nennen sie **beschränkt**, wenn sie nur endlich viele **Voraussetzungen** und **Folgerungen** hat. Die **Schlussregeln** nach (2.14) und (2.15) sind per se beschränkt. Die nach (2.13) genau dann, wenn **A** und **B** endliche Mengen sind, d. h. wenn sie Elemente aus

Die Mengen der **Voraussetzungen** und **Folgerungen** dürfen auch leer sein. Dies führt zu den folgenden Spezialfällen:

Eine **Schlussregel**  $\frac{A}{\emptyset}$  ohne **Folgerungen** ist immer gültig.

Ein Menge **B** von Ableitungen, die als **Axiome** dienen sollen, kann als **Schlussregel**  $\frac{\emptyset}{B}$  ohne **Voraussetzungen** repräsentiert werden.

### 2.3.3. Schlussregeln

Wir betrachten zuerst noch die Menge der binären Relationen<sup>43)</sup> in  $\mathfrak{P}(\mathcal{L})$ . Sei also **R** eine solche binäre Relation und  $A \in R$ . Dann gilt wegen (2.5), (2.6), (2.7), (2.8) und (2.9) auf Seite 23:

$$A \in R \in \mathfrak{R}(\mathfrak{P}(\mathcal{L}))$$

$$A = (A^<, A^>) \quad \text{und es gilt} \quad A^<, A^> \subseteq \mathcal{L}$$

$$A^< \vdash_R A^> \quad \text{oder einfach} \quad A^< \vdash A^> \quad \text{ist eine } R\text{-Ableitung}$$

$$A^< \text{ R-ableitbar } A^> \quad \text{oder einfach} \quad A^< \text{ ableitbar } A^>$$

Nach diesen Vorbereitungen fassen wir noch mal zusammen:

Ein geordnetes Paar  $(\mathcal{V}, \mathcal{F}) \in \mathfrak{P}(\mathfrak{P}(\mathcal{L}))^2 = \mathfrak{R}(\mathfrak{P}(\mathcal{L}))^2$  heißt eine **Schlussregel** für  $\mathcal{L}$ , geschrieben  $\frac{\mathcal{V}}{\mathcal{F}}$ , und es gilt:

$\mathcal{V} \in \mathfrak{R}(\mathfrak{P}(\mathcal{L}))$  , die **Voraussetzungen** , eine Menge von  **$\mathcal{V}$ -Ableitungen**.

$\mathcal{F} \in \mathfrak{R}(\mathfrak{P}(\mathcal{L}))$  , die **Folgerungen** , eine Menge von  **$\mathcal{F}$ -Ableitungen**.

$a \in \mathcal{V} \Rightarrow a = (\Gamma, \Delta) \ \& \ \Gamma, \Delta \in \mathfrak{P}(\mathcal{L})$  , Schreibweise:  $\Gamma \vdash_{\mathcal{V}} \Delta$

$a \in \mathcal{F} \Rightarrow a = (\Gamma, \Delta) \ \& \ \Gamma, \Delta \in \mathfrak{P}(\mathcal{L})$  , Schreibweise:  $\Gamma \vdash_{\mathcal{F}} \Delta$

mit  $\Gamma$  und  $\Delta$  jeweils passend.

\*\*\*\*\* Fehlende Verweise: **Ableitungsmenge** ,  $\neq$  , **true** ,  $\vdash$  ,  $\vdash_R$ . \*\*\*\*\*

Die **Schlussregel** entspricht der **Aussage** :

*Mit den **Voraussetzungen** aus  $\mathcal{V}$  lassen sich alle **Folgerungen** aus  $\mathcal{F}$  ableiten<sup>44)</sup>.*

Die **Schlussregel** heißt **allgemeingültig**, wenn aus den **Voraussetzungen** alle **Folgerungen** abgeleitet werden können. In diesem Fall kann sie zur **zulässigen Umwandlung** von weiteren **Formeln** dienen.

Die Mengen der **Voraussetzungen** und **Folgerungen** sowie die beiden Seiten einer **Ableitung** dürfen auch leer sein. Dies führt zu den folgenden semantischen Spezialfällen:

- Eine **Ableitung**  $(A, \emptyset)$  ist trivial allgemeingültig. Daher können solche Voraussetzungen und Folgerungen ohne Probleme weggelassen werden.
- Ein Menge **B** von **Formeln**, die **Axiome** sein sollen, kann durch eine **Voraussetzung**  $(\emptyset, B)$  repräsentiert werden.
- Ein Menge **B** von **Formeln**, die als allgemeingültig zu beweisen sind, kann durch eine **Folgerung**  $(\emptyset, B)$  repräsentiert werden.

<sup>43)</sup> siehe Unterabschnitt 2.2.3 auf Seite 18

<sup>44)</sup> mittels noch zu definierender **zulässiger Umwandlungen**

Wenn eine Schlussregel  $\frac{\mathcal{V}}{\mathcal{F}}$  beschränkt ist, sind  $\mathcal{V}$  und  $\mathcal{F}$  endliche Mengen und es gibt wegen (2.12) auf Seite 23 zwei Tupel  $\vec{v}, \vec{f} \in \mathfrak{T}(\mathfrak{P}(\mathcal{L})^2)$ , so dass gilt:<sup>45)</sup>

$$\begin{aligned} \mathcal{V} &= \text{set}(\vec{v}) & , \mathcal{F} &= \text{set}(\vec{f}) \\ N &\geq |\mathcal{V}| & , M &\geq |\mathcal{F}| & , \text{ mit } N, M \in \mathbb{N}_0 \\ \vec{v} &= \{v_1, \dots, v_N\} & , \vec{f} &= \{f_1, \dots, f_M\} \\ v_n &= (v_n^<, v_n^>) & , f_m &= (f_m^<, f_m^>) & , \text{ für } 1 \leq n \leq N, 1 \leq m \leq M \\ v_n^< \vdash_{\mathcal{V}} v_n^> & & , f_m^< \vdash_{\mathcal{F}} f_m^> & & , \text{ für } 1 \leq n \leq N, 1 \leq m \leq M \end{aligned} \quad (2.17)$$

also

$$\begin{aligned} \vec{v} &= \{(v_n^<, v_n^>) \mid 1 \leq n \leq N\} \\ \vec{f} &= \{(f_m^<, f_m^>) \mid 1 \leq m \leq M\} \end{aligned}$$

und wir nennen auch das Paar  $(\vec{v}, \vec{f})$  **Schlussregel**. Diese ist per se **beschränkt** und ein Element aus  $\mathfrak{T}(\mathfrak{P}(\mathcal{L})^2)^2$ . Nun haben wir alternative Schreibweisen für **beschränkte Schlussregeln**:<sup>46)</sup>

$$\frac{\mathcal{V}}{\mathcal{F}} \Leftrightarrow \frac{\text{set}(\vec{v})}{\text{set}(\vec{f})} \Leftrightarrow \frac{\vec{v}}{\vec{f}} \Leftrightarrow \frac{v_1^< \vdash_{\mathcal{V}} v_1^> \mid \dots \mid v_N^< \vdash_{\mathcal{V}} v_N^>}{f_1^< \vdash_{\mathcal{F}} f_1^> \mid \dots \mid f_M^< \vdash_{\mathcal{F}} f_M^>} , \text{ **Schlussregel** oder **formaler Satz** } \quad (\text{FS})$$

### 2.3.4. Beweise

Für einen **Beweis** in ASBA ist stets gegeben:<sup>47)</sup>

$$\begin{aligned} \mathcal{L} & & , \text{ eine Menge von **Formeln**, die zugrundeliegende **Sprache** .} \\ \mathcal{E} &\subseteq \{E \mid E : \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{L}\} & , \text{ eine Menge von **Funktionen**, die **Ersetzungen**.} \\ \mathcal{C} &\in \mathfrak{R}(\mathfrak{R}(\mathfrak{P}(\mathcal{L}))) & , \text{ eine Menge von **Schlussregeln**.} \\ \mathcal{E} &\in \mathfrak{R}(\mathfrak{P}(\mathcal{L})) & , \text{ eine Menge von **Ableitungen**, die **Ergebnisse**.} \end{aligned}$$

Die **Ersetzungen** sorgen z. B. dafür, dass aus einer **allgemeingültigen Formel** wie  $\langle\langle \alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha) \rangle\rangle$  z. B. die **allgemeingültige Formel**  $\langle\langle \gamma \rightarrow (\delta \rightarrow \gamma) \rangle\rangle$  abgeleitet werden kann. Die **Schlussregeln** geben erlaubte Schlussfolgerungen aus gegebenen Elementen an und umfassen auch die Voraussetzungen eines Satzes. Die **Ergebnisse** schließlich sind das, was mittels eines Beweises aus den gegebenen Voraussetzungen  $\mathcal{L}$ ,  $\mathcal{E}$  und  $\mathcal{C}$  gefolgert werden soll.

Im Fall von **beschränkten Schlussregeln** können statt  $\mathcal{C}$  und  $\mathcal{E}$  auch

$$\begin{aligned} \vec{\mathcal{C}} &\in \mathfrak{T}(\mathfrak{T}(\mathfrak{P}(\mathcal{L})^2)^2) & , \text{ ein **Tupel** aus **Schlussregeln**.} \\ \vec{\mathcal{E}} &\in \mathfrak{T}(\mathfrak{P}(\mathcal{L})^2) & , \text{ ein **Tupel** aus **Ableitungen**, die **Ergebnisse**.} \end{aligned}$$

gegeben sein. Mit

$$\begin{aligned} \mathcal{C} &:= \{(\text{set}(\vec{v}), \text{set}(\vec{f})) \mid (\vec{v}, \vec{f}) \in \text{set}(\vec{\mathcal{C}})\} \\ \mathcal{E} &:= \text{set}(\vec{\mathcal{E}}) \end{aligned}$$

ergibt sich wegen (2.10) und (2.12) auf Seite 23 wieder die erste Form.

<sup>45)</sup> Statt  $\geq$  könnte in (2.17) auch  $=$  genommen werden. Dann müssten die  $v_n$  und die  $f_m$  jeweils paarweise verschieden sein, was wir nicht voraussetzen wollen.

<sup>46)</sup> Nach (2.13), (2.14) und (2.15) auf Seite 24 sind die „Brüche“ **Aussagen**, und keine Paare mehr. Die Äquivalenz der Aussagen steht schon in (2.16) auf Seite 24

<sup>47)</sup> ASBA selbst kann nur endliche Mengen abspeichern. Für ASBA muss daher einschränkend  $\mathcal{C} \in \mathfrak{R}_e(\mathfrak{R}_e(\mathfrak{P}_e(\mathcal{L})))$  und  $\mathcal{E} \in \mathfrak{R}_e(\mathfrak{P}_e(\mathcal{L}))$  sein.

### 2.3.5. Beispiel für einen Beweis

> > > Nacharbeiten < < <

> > > Hier weitermachen < < <

Zur Veranschaulichung ein Beispiel:<sup>48)</sup>

$E_{\alpha,\beta}(\delta)$	$\equiv$	das $\delta$ , bei dem alle Vorkommen von $\alpha$ durch $\beta$ ersetzt wurden
$\mathcal{L}$	$\equiv$	die Menge aller <b>Formeln</b> der aussagenlogischen <b>Sprache</b>
$\mathbf{v}_1$	$\equiv$	$(A, \{\alpha\})$
$\mathbf{v}_2$	$\equiv$	$(B, \{\alpha \rightarrow \beta\})$
$\mathbf{v}_3$	$\equiv$	$(A \cup B, \{\beta\})$
$\mathcal{E}$	$\equiv$	$\{E_{\alpha,\delta}, E_{\beta,B}, E_{\beta,B \rightarrow \delta}, E_{\gamma,\delta}\}$
$\mathcal{C}$	$\equiv$	...
$\chi_1$	$\equiv$	$\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)$
$\chi_2$	$\equiv$	$(\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$
$\mathcal{X}$	$\equiv$	$\{\chi_1, \chi_2\}$
$\vdash_{\mathcal{F}}$	$\equiv$	...

### 2.3.6. Beweisschritte

Ein **Beweis** <sup>49)</sup> in ASBA besteht aus

einer <b>Schlussregel</b>	$\frac{\mathcal{V}}{\mathcal{F}}$	
einer Folge	$\vec{b} = (b_1, b_2, \dots, b_K)$	von <b>Beweisschritten</b> $b_k$ , die <b>Beweisschrittfolge</b>
einer Folge	$\mathcal{T} = (T_1, T_2, \dots, T_K)$	von <b>Umwandlungen</b> $T_k$ , die <b>Umwandlungsfolge</b>

Dabei ist  $K$  ein Element aus  $\mathbb{N}_0$ ,  $0 \leq k \leq K$ , die **Beweisschritte**  $b_k$  sind **Schlussregeln** und die **Umwandlungen**  $T_k$  werden später definiert. Wir definieren noch:

$\mathcal{B}_k$	$\equiv$	$\{b_1, b_2, \dots, b_k\}$	, für $0 \leq k \leq K$
$\mathcal{B}$	$\equiv$	$\mathcal{B}_K$	

und nennen  $\mathcal{B}$  die **Beweisschrittmenge** der **Beweisschrittfolge**  $\vec{b}$ . Dann ist  $\mathcal{B}_0 = \emptyset$  und  $\mathcal{B}_i \subseteq \mathcal{B}_j \subseteq \mathcal{B}$  für  $0 \leq i \leq j \leq K$ . – Wir nennen die **Beweisschrittfolge** auch eine **Ableitung** aus  $\mathcal{F}$  aus  $\mathcal{V}$ .

Jeder **Beweisschritt**  $b_k$  für  $1 \leq k \leq K$  muss entweder eine **Voraussetzung** aus  $\mathcal{V}$  oder durch Anwendung einer **allgemeingültigen Schlussregel** auf eine Teilmenge von  $\mathcal{B}_{k-1}$  eine wahre **Formel** oder eine weitere **allgemeingültige Schlussregel** sein. Schließlich muss noch

$$\mathcal{F} \subseteq \mathcal{B}$$

sein, da jede **Folgerung** aus  $\mathcal{F}$  in der Folge  $\vec{b}$  vorkommen und somit Element der Menge  $\mathcal{B}$  sein muss.

=====

Bevor die **Schlussregeln** weiter behandelt werden, werden noch Elemente der **Aussagenlogik** und der **Prädikatenlogik** behandelt. Wir stützen uns dabei weitgehend auf [1], ohne das jedes Mal anzugeben.

<sup>48)</sup> siehe [32]

<sup>49)</sup> siehe [1] Kapitel 1.6 und 3.6

## 2.4. Aussagenlogik

### 2.4.1. Konstante und Operationen

Die Tabelle 2.4 auf der nächsten Seite<sup>50)</sup> definiert für die zweiwertige Logik Konstante und **Junktoren** über die **Wahrheitswerte** ihrer Anwendung. So ergeben sich, abhängig von den **Wahrheitswerten** der Operanden  $A$  und  $B$ ,<sup>51)</sup> die in der Tabelle angegebenen **Wahrheitswerte** für die **Operationen**. Die mit 0, 1 und 2 benannten Spalten werden jeweils nur für die 0-, 1- und 2-stelligen **Junktoren**, d. h. für die Konstanten, die unären und die binären **Junktoren** ausgefüllt. Dabei werden die Konstanten als 0-stellige **Junktoren** angesehen. Hat der Inhalt einer Zelle keine Relevanz, steht dort ein Minuszeichen, ist kein Wert bekannt, so bleibt sie leer.

Für einige **Junktorsymbole**<sup>52)</sup>, Namen und Sprechweisen sind auch Alternativen angegeben. Die durchgestrichenen (d. h. negierten) Symbole sind ungebräuchlich und nur aus formalen Gründen aufgeführt. Wenn für eine bestimmte Kombination von **Wahrheitswerten** mehr als eine Zeile angegeben ist, so können die zugehörigen **Junktoren** zwar formal verschieden sein, liefern in der zweiwertigen **Aussagenlogik** jedoch dieselben Ergebnisse.

Die zur Einsparung von Klammern definierten Prioritäten sind in der Tabelle 2.3 auf Seite 22 angegeben.<sup>53)</sup>

### 2.4.2. Formalisierung

Da sie die Grundlage — quasi das Fundament — des mathematischen Inhalts von **ASBA** sind, müssen die **Axiome**, **Sätze**, **Beweise**, usw. der **Aussagenlogik** (und später der **Prädikatenlogik**) in streng formaler Form vorliegen.<sup>54)</sup> Da Computerprogramme mit der **Polnischen Notationen**<sup>55)</sup> besser umgehen können und Klammern dort überflüssig sind, werden viele **Formeln** auch parallel in der Polnischen Notation angegeben. Dies wird auf Wunsch auch bei Ausgaben von **ASBA** so gehandhabt.

#### 2.4.2.1. Bausteine der aussagenlogischen Sprache

Zur Einteilung der **Junktoren** werden die folgenden Mengen definiert:

$\mathcal{I}_c$	$:=$	$\{\top, \perp\}$	, Menge der <b>aussagenlogischen Konstanten</b>
$\mathcal{I}_u$	$:=$	$\{\neg\}$	, Menge der <b>unärer Junktor pluralen</b>
$\mathcal{I}_b$	$:=$	$\{\wedge, \vee, +, \rightarrow, \leftrightarrow, \leftarrow, \uparrow, \downarrow\}$	, Menge der <b>binärer Junktor pluralen</b>

Um damit **Formeln** zu bilden, werden noch Variable gebraucht:

$\mathcal{Q}$	$:=$	$\{q_n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$	, Menge der <b>aussagenlogischen Variablen</b>
---------------	------	-----------------------------------	--

<sup>50)</sup> Die Tabelle basiert auf den Wahrheitstafeln in [37] Kapitel 2.2 und [1] Kapitel 1.1 Seite 3.

<sup>51)</sup>  $A$  und  $B$  können hier beliebige **Aussagen** sein — auch **Formeln** —, die jeweils genau einen **Wahrheitswert** repräsentieren.

<sup>52)</sup> Symbole, die für **Junktoren** verwendet werden.

<sup>53)</sup> Zur Erinnerung: Es gilt Rechtsklammerung, siehe Unterabschnitt 2.2.5 auf Seite 21

<sup>54)</sup> Die Formalisierung stützt sich auf [30]; siehe auch [22, 25].

<sup>55)</sup> Bei der **Polnischen Notationen** stehen die Operanden bzw. Argumente von **Relationen** und **Funktionen** stets rechts von den Relations- und Funktionssymbolen. Dadurch kann auf Gliederungszeichen wie Klammern und Kommata verzichtet werden. Noch einfacher für Computer ist die **umgekehrte Polnische Notation**, bei der die Operanden und Argumente links von den Symbolen stehen.

A	-	W	F	W	W	F	F	-	Aussage A	-
B	-	-	-	W	F	W	F	-	Aussage B	-
<b>Junktor</b> <sup>1)</sup>	<b>0</b> <sup>2)</sup>	<b>1</b>		<b>2</b>				<b>Name</b> <sup>3)</sup>	<b>Sprechweise</b>	<b>Prio</b> <sup>4)</sup>
$\top$	W	-	-	-	-	-	-	Verum	<i>wahr</i>	-
$\perp$	F	-	-	-	-	-	-	Falsum	<i>falsch</i>	-
(...)	-	W	W	-	-	-	-			-
	-	W	F	-	-	-	-	Klammerung	A ist geklammert	5)
$\neg$	-	F	W	-	-	-	-	Negation	Nicht A	1 <sup>6)</sup>
	-	F	F	-	-	-	-			-
	-	-	-	W	W	W	W	Tautologie		-
$\vee$	-	-	-	W	W	W	F	Disjunktion; Adjunktion; Alternative	A oder B	3
$\leftarrow \Leftarrow \subset$	-	-	-	W	W	F	W	Replikation; Konversion; konverse Implikation	A folgt aus B	4
$\mid$	-	-	-	W	W	F	F	Präpendenz	Identität von A	-
$\rightarrow \Rightarrow \supset$	-	-	-	W	F	W	W	Implikation; Subjunktion; Konditional	Aus A folgt B; Wenn A dann B; A nur dann wenn B	4
$\mid$	-	-	-	W	F	W	F	Postpendenz	Identität von B	-
$\leftrightarrow \Leftrightarrow$	-	-	-	W	F	F	W	Äquivalenz; Bijunktion; Bikonditional	A genau dann wenn B; A dann und nur dann wenn B	5
$\wedge \& \cdot$	-	-	-	W	F	F	F	Konjunktion	A und B; Sowohl A als auch B	2
$\uparrow \curlywedge \mid$	-	-	-	F	W	W	W	NAND; Unverträglichkeit; Sheffer-Funktion	Nicht zugleich A und B	2
$+\dot{\vee} \vee \oplus$	-	-	-	F	W	W	F	XOR; Antivalenz; ausschließende Disjunktion	Entweder A oder B	3
$\leftrightarrow \Leftrightarrow \neq$	-	-	-	"	"	"	"	Kontravalenz		-
$\mid$	-	-	-	F	W	F	W	Postnonpendenz	Negation von B	-
$\rightarrow \Rightarrow \supset$	-	-	-	F	W	F	F	Postsektion		-
$\mid$	-	-	-	F	F	W	W	Pränonpendenz	Negation von A	-
$\leftarrow \Leftarrow \subset$	-	-	-	F	F	W	F	Präsektion		-
$\downarrow \nabla$	-	-	-	F	F	F	W	NOR; Nihilation; Peirce-Funktion	Weder A noch B	3
	-	-	-	F	F	F	F	Kontradiktion		-

Um vollständig zu sein, d. h. alle 22 möglichen Kombinationen von Wahrheitswerten für höchstens zwei Variable zu berücksichtigen, enthält die Tabelle auch viele ungebräuchliche Symbole und Operationen. Junktoren ohne Angabe einer Priorität sind in diesem Dokument nicht weiter von Interesse. — Im Folgenden werden von den in der Tabelle aufgeführten Junktoren nur noch  $\perp$ ,  $\top$ ,  $\neg$ ,  $\wedge$ ,  $\vee$ ,  $\rightarrow$ ,  $\leftarrow$ ,  $\leftrightarrow$ ,  $\uparrow$ ,  $\downarrow$  und  $+$  verwendet.

<sup>1</sup> Die Junktoren  $\langle \subset \rangle$ ,  $\langle \supset \rangle$ ,  $\langle \oplus \rangle$  und  $\langle nsupset \rangle$  haben hier nicht die Bedeutung der entsprechenden Operationen der Mengenlehre und dürfen nicht damit verwechselt werden; entsprechendes gilt für  $\langle + \rangle$  und  $\langle \cdot \rangle$  mit Addition und Multiplikation.

<sup>2</sup> 0-stellige Junktoren sind Konstante, hier Wahrheitswerte.

<sup>3</sup> Ist eine Zelle in dieser Spalte leer, so ist die zugehörige Zeile nur vorhanden, um alle binären Junktoren aufzuführen.

<sup>4</sup> Je kleiner die Zahl, je höher die Priorität.

<sup>5</sup> Klammerung ist genau genommen keine Operation und wird nicht nur bei logischen, sondern auch bei anderen Ausdrücken verwendet. Ihre Priorität - sofern man überhaupt davon sprechen kann - kann nur höher als die aller Junktoren sein.

<sup>6</sup> Die Priorität der unären Operationen muss höher sein als die aller mehrwertigen, also auch der binären Operationen. Wenn die Symbole aller unären Operationen auf derselben Seite des Operanden stehen, brauchen sie eigentlich keine Priorität, da die Auswertung nur von innen (dem Operanden) nach außen erfolgen kann. Nur wenn es sowohl links- als auch rechtsseitige unäre Operationen gibt, muss man für diese Prioritäten definieren.

**Tabelle 2.4.:** Definition von aussagenlogischen Symbolen.

Die Mengen  $\mathcal{J}_c$ ,  $\mathcal{J}_u$ ,  $\mathcal{J}_b$  und  $\mathcal{Q}$  müssen paarweise disjunkt sein. – Damit können die folgende Mengen definiert werden:

$$\begin{aligned}\mathcal{J} &:= \mathcal{J}_c \cup \mathcal{J}_u \cup \mathcal{J}_b && , \text{Menge der } \textbf{Junktorsymbole} \\ \mathcal{A} &:= \mathcal{Q} \cup \mathcal{J} && , \text{Alphabet der aussagenlogische Sprache plurals für } \mathcal{J} \\ \mathcal{J}_x &\subseteq \mathcal{J} && , \text{eine Teilmenge von } \mathcal{J} \text{ für eine Indexvariable } x \\ \mathcal{A}_x &:= \mathcal{Q} \cup \mathcal{J}_x && , \text{Alphabet der aussagenlogische Sprache plurals für } \mathcal{J}_x\end{aligned}$$

Für Elemente aus  $\mathcal{Q}$  verwenden wir normalerweise die kleinen, lateinischen Buchstaben  $a, b, c$ , usw.

#### 2.4.2.2. Aussagenlogische Formeln

Neben dem Alphabet  $\mathcal{A}$  bzw.  $\mathcal{A}_x$  werden noch Klammern als Gliederungszeichen verwendet. Damit können nun rekursiv für jede Teilmenge  $\mathcal{J}_x$  von  $\mathcal{J}$  zwei Mengen von aussagenlogischen **Formeln** definiert werden, wobei wir für diese **Formeln** die kleinen, griechischen Buchstaben  $\alpha, \beta, \gamma$ , usw. verwenden.

$\mathcal{L}_x^A$  sei die Menge der auf folgende Weise definierten **aussagenlogischen Formel** mit **Klammerung** zum Alphabet  $\mathcal{A}_x$ :

$$\begin{aligned}\mathcal{Q} &\subset \mathcal{L}_x^A && , \text{die Variablen} \\ \mathcal{J}_x \cap \mathcal{J}_c &\subset \mathcal{L}_x^A && , \text{die Konstanten} \\ \alpha \in \mathcal{L}_x^A &\Rightarrow (\ominus \alpha) \in \mathcal{L}_x^A && , \text{für } \ominus \in \mathcal{J}_u \cap \mathcal{J}_x && (2.18) \\ \alpha, \beta \in \mathcal{L}_x^A &\Rightarrow (\alpha * \beta) \in \mathcal{L}_x^A && , \text{für } * \in \mathcal{J}_b \cap \mathcal{J}_x && (2.19)\end{aligned}$$

Nur die auf diese Weise konstruierten **Formeln** sind Elemente aus  $\mathcal{L}_x^A$ . – Für  $\mathcal{J}_x = \mathcal{J}$  sei noch  $\mathcal{L}^A := \mathcal{L}_x^A$ .

$\mathcal{L}_x^{Ap}$  sei die Menge der auf folgende Weise definierten **aussagenlogischen Formeln** in **Polnischer Notation**:

$$\begin{aligned}\mathcal{Q} &\subset \mathcal{L}_x^{Ap} && , \text{die Variablen} \\ \mathcal{J}_x \cap \mathcal{J}_c &\subset \mathcal{L}_x^{Ap} && , \text{die Konstanten} \\ \alpha \in \mathcal{L}_x^{Ap} &\Rightarrow \ominus \alpha \in \mathcal{L}_x^{Ap} && , \text{für } \ominus \in \mathcal{J}_u \cap \mathcal{J}_x && (2.20) \\ \alpha, \beta \in \mathcal{L}_x^{Ap} &\Rightarrow * \alpha \beta \in \mathcal{L}_x^{Ap} && , \text{für } * \in \mathcal{J}_b \cap \mathcal{J}_x && (2.21)\end{aligned}$$

Nur die auf diese Weise konstruierten **Formeln** sind Elemente aus  $\mathcal{L}_x^{Ap}$ . – Für  $\mathcal{J}_x = \mathcal{J}$  sei noch  $\mathcal{L}^{Ap} := \mathcal{L}_x^{Ap}$ .

Wie man leicht sieht, gilt

$$\mathcal{J}_x \subset \mathcal{J}_y \subseteq \mathcal{J} \Rightarrow \begin{cases} \mathcal{A}_x \subset \mathcal{A}_y \subseteq \mathcal{A} \\ \mathcal{L}_x^A \subset \mathcal{L}_y^A \subseteq \mathcal{L}^A \\ \mathcal{L}_x^{Ap} \subset \mathcal{L}_y^{Ap} \subseteq \mathcal{L}^{Ap} \end{cases}$$

und weiterhin gibt es eine bijektive Abbildung von  $\mathcal{L}^A$  nach  $\mathcal{L}^{Ap}$ . Auf einen **Beweis** verzichten wir. Durch Anwendung der Klammerregeln von Paragraph 2.4.2.1 auf Seite 28 lassen sich in der Regel noch viele Klammern der **Formeln** aus  $\mathcal{L}_x^A$  einsparen. Die **Formeln** aus  $\mathcal{L}_x^{Ap}$  sind frei von Klammern. Die Namen der **Junktoren** finden sich in der Tabelle 2.4 auf der vorherigen Seite.

Die **Formeln**, die nach einer der Regeln (2.18), (2.19), (2.20) oder (2.21) gebildet wurden, sind offensichtlich **zerlegbar**, die anderen, d. h. Variablen und Konstanten (aus  $\mathcal{Q}$  bzw.  $\mathcal{J}_c$ ), sind nicht **zerlegbar**. Letztere bezeichnet man auch als **atomare Formeln**.

### 2.4.3. Definition von Junktoren durch andere

Im folgenden gelte für zwei aussagenlogische **Formeln**  $\alpha$  und  $\beta$ :

$\alpha = \beta \quad :\Leftrightarrow \quad \alpha$  und  $\beta$  stimmen als **Zeichenkette** überein.

$\alpha \Leftrightarrow \beta \quad :\Leftrightarrow \quad \alpha$  und  $\beta$  können mit Hilfe erlaubter **Ersetzungen** und geltender **Axiome** — siehe Unterabschnitt 2.4.4 auf der nächsten Seite — ineinander überführt werden.

Es werden verschiedene Teilmengen von  $\mathcal{J}$  eingeführt, die jeweils ausreichen um alle anderen Elemente aus  $\mathcal{J}$  zu definieren:

$\mathcal{J}_{\text{bool}} \quad := \quad \{\neg, \wedge, \vee\} \quad (\text{Boolesche Signatur})$

$\mathcal{J}_{\text{and}} \quad := \quad \{\neg, \wedge\}$

$\mathcal{J}_{\text{or}} \quad := \quad \{\neg, \vee\}$

$\mathcal{J}_{\text{imp}} \quad := \quad \{\neg, \rightarrow\}$

$\mathcal{J}_{\text{rep}} \quad := \quad \{\neg, \leftarrow\}$

$\mathcal{J}_{\text{nand}} \quad := \quad \{\uparrow\}$

$\mathcal{J}_{\text{nor}} \quad := \quad \{\downarrow\}$

Solche Teilmengen heißen **logische Signatur**.

Im Folgenden stehen jeweils links die **Formeln** in üblicher Schreibweise vollständig geklammert und rechts in Polnischer Notation (ohne Klammern). Ferner seien  $\alpha$  und  $\beta$  beliebige, nicht notwendig verschiedene **Formeln** aus der passenden Menge  $\mathcal{L}_x^A$  bzgl. der um die mit Hilfe der Definitionen erweiterten **Formelmenge**.

Ausgehend von den **Junktoren** aus der **Booleschen Signatur**  $\mathcal{J}_{\text{bool}}$  werden die restlichen **Junktoren** aus  $\mathcal{J}$  definiert. Die Definitionen sind in zwei Gruppen eingeteilt, und zwar die mit den **Junktoren** aus  $\mathcal{J}_{\text{and}}$ :

$$(\alpha \rightarrow \beta) := (\neg(\alpha \wedge (\neg\beta))) \qquad \rightarrow \alpha\beta := \neg \wedge \alpha \neg\beta \qquad (2.22)$$

$$(\alpha \leftarrow \beta) := (\neg(\beta \wedge (\neg\alpha))) \qquad \leftarrow \beta\alpha := \neg \wedge \beta \neg\alpha \qquad (2.23)$$

$$(\alpha \leftrightarrow \beta) := ((\alpha \rightarrow \beta) \wedge (\alpha \leftarrow \beta)) \qquad \leftrightarrow \alpha\beta := \wedge \rightarrow \alpha\beta \leftarrow \alpha\beta$$

$$\perp := (\mathbf{q}_0 \wedge (\neg\mathbf{q}_0)) \qquad \perp := \wedge \mathbf{q}_0 \neg\mathbf{q}_0$$

$$(\alpha \uparrow \beta) := (\neg(\alpha \wedge \beta)) \qquad \uparrow \alpha\beta := \neg \wedge \alpha\beta \qquad (2.24)$$

und die mit den **Junktoren** aus  $\mathcal{J}_{\text{or}}$ :

$$(\alpha \downarrow \beta) := (\neg(\alpha \vee \beta)) \qquad \downarrow \alpha\beta := \neg \vee \alpha\beta \qquad (2.25)$$

$$(\alpha + \beta) := ((\alpha \vee \beta) \wedge (\neg(\alpha \wedge \beta))) \qquad + \alpha\beta := \wedge \vee \alpha\beta \neg \wedge \alpha\beta$$

$$\top := (\mathbf{q}_0 \vee (\neg\mathbf{q}_0)) \qquad \top := \vee \mathbf{q}_0 \neg\mathbf{q}_0$$

Ist  $\langle \vee \rangle$  oder  $\langle \wedge \rangle$  nicht vorgegeben, d. h. wird von den Elementen aus  $\mathcal{J}_{\text{and}}$  bzgl.  $\mathcal{J}_{\text{or}}$  statt von denen aus  $\mathcal{J}_{\text{bool}}$  ausgegangen, so muss man den fehlenden **Junktor** mittels der passenden der beiden folgenden Definitionen einführen:

$$(\alpha \vee \beta) := (\neg((\neg\alpha) \wedge (\neg\beta))) \qquad \vee \alpha\beta := \neg \wedge \neg\alpha \neg\beta$$

$$(\alpha \wedge \beta) := (\neg((\neg\alpha) \vee (\neg\beta))) \qquad \wedge \alpha\beta := \neg \vee \neg\alpha \neg\beta$$

Nun sind wieder alle **Junktoren** definiert.



Entsprechend wird bei Vorgabe von  $\mathcal{J}_{\text{imp}}$  bzgl.  $\mathcal{J}_{\text{rep}}$  die passende der beiden folgenden Definitionen ausgewählt:

$$\begin{array}{ll} (\alpha \vee \beta) := ((\neg\alpha) \rightarrow \beta) & \vee\alpha\beta := \rightarrow \neg\alpha\beta \\ (\alpha \wedge \beta) := (\neg((\neg\beta) \leftarrow \alpha)) & \wedge\alpha\beta := \neg \leftarrow \neg\beta\alpha \end{array}$$

woraufhin dann (2.22) bzgl. (2.23) als Gleichung nachzuweisen ist. Da aus (2.23) durch **Vertauschung** der Variablen unmittelbar

$$(\alpha \leftarrow \beta) \Leftrightarrow (\beta \rightarrow \alpha) \qquad \leftarrow \alpha\beta \Leftrightarrow \rightarrow \beta\alpha$$

folgt, vermindert sich der Aufwand dazu erheblich.

Bei Vorgabe von  $\mathcal{J}_{\text{nand}}$  bzgl.  $\mathcal{J}_{\text{nor}}$  schließlich werden die passenden Definitionen aus

$$\begin{array}{ll} (\neg\alpha) := (\alpha \downarrow \alpha) & \neg\alpha := \downarrow \alpha\alpha \\ (\neg\alpha) := (\alpha \uparrow \alpha) & \neg\alpha := \uparrow \alpha\alpha \end{array}$$

und, da  $\langle \neg \rangle$  jetzt definiert ist, aus

$$\begin{array}{ll} (\alpha \vee \beta) := (\neg(\alpha \downarrow \beta)) & \vee\alpha\beta := \neg \downarrow \alpha\beta \\ (\alpha \wedge \beta) := (\neg(\alpha \uparrow \beta)) & \wedge\alpha\beta := \neg \uparrow \alpha\beta \end{array} \quad (2.26)$$

ausgewählt und es ist (2.24) bzgl. (2.25) als Gleichung nachzuweisen.

Abschließend ist noch nachzuweisen, dass mit Hilfe der jeweils passenden der Definitionen (2.22) bis (2.26), ausgehend vom jeweils passenden  $\mathcal{L}_x^A$ , genau die gesamte **Formelmengen**  $\mathcal{L}^A$  erzeugt werden kann.

#### 2.4.4. Aussagenlogisches Axiomensystem

Ausgehend von der **logischen Signatur**  $\mathcal{J}_{\text{and}} = \{\neg, \wedge\}$  und der Definition 2.22 auf der vorherigen Seite von  $\langle \rightarrow \rangle$  werden die folgenden vier logischen **Axiome** definiert:

$$\begin{array}{ll} (\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma) & \rightarrow\rightarrow \alpha \rightarrow \beta\gamma \rightarrow\rightarrow \alpha\beta \rightarrow \alpha\gamma \\ \alpha \rightarrow \beta \rightarrow \alpha \wedge \beta & \rightarrow \alpha \rightarrow \beta \wedge \alpha\beta \\ \alpha \wedge \beta \rightarrow \alpha ; \quad \alpha \wedge \beta \rightarrow \beta & \rightarrow \wedge\alpha\beta\alpha ; \quad \rightarrow \wedge\alpha\beta\beta \\ (\alpha \rightarrow \neg\beta) \rightarrow (\beta \rightarrow \neg\alpha) & \rightarrow\rightarrow \alpha\neg\beta \rightarrow \beta\neg\alpha \end{array}$$

>>> **Aussagenlogik weiter bearbeiten.** <<<

Siehe **Aussagenlogik** im Glossar.

Wikipedia [29] schreibt dazu (Zitat ohne Verweise ins Internet):

Die **Aussagenlogik** ist ein Teilgebiet der Logik, das sich mit Aussagen und deren Verknüpfung durch Junktoren befasst, ausgehend von strukturlosen Elementaraussagen (Atomen), denen ein Wahrheitswert zugeordnet wird. In der *klassischen Aussagenlogik* wird jeder Aussage genau einer der zwei Wahrheitswerte „wahr“ und „falsch“ zugeordnet. Der Wahrheitswert einer zusammengesetzten Aussage lässt sich ohne zusätzliche Informationen aus den Wahrheitswerten ihrer Teilaussagen bestimmen.



## 2.5. Prädikatenlogik

> > > Prädikatenlogik bearbeiten. < < <

Siehe **Prädikatenlogik** im Glossar.

Wikipedia [43] schreibt dazu (Zitat ohne Verweise ins Internet):

Die **Prädikatenlogiken** (auch **Quantorenlogiken**) bilden eine Familie logischer Systeme, die es erlauben, einen weiten und in der Praxis vieler Wissenschaften und deren Anwendungen wichtigen Bereich von Argumenten zu formalisieren und auf ihre Gültigkeit zu überprüfen. Auf Grund dieser Eigenschaft spielt die Prädikatenlogik eine große Rolle in der Logik sowie in Mathematik, Informatik, Linguistik und Philosophie.

## 2.6. Mengenlehre

> > > Mengenlehre bearbeiten. < < <

Siehe **Mengenlehre** im Glossar.

Wikipedia [42] schreibt dazu (Zitat ohne Verweise ins Internet):

Die **Mengenlehre** ist ein grundlegendes Teilgebiet der Mathematik, das sich mit der Untersuchung von Mengen, also von Zusammenfassungen von Objekten, beschäftigt. Die gesamte Mathematik, wie sie heute üblicherweise gelehrt wird, ist in der Sprache der Mengenlehre formuliert und baut auf den Axiomen der Mengenlehre auf. Die meisten mathematischen Objekte, die in Teilbereichen wie Algebra, Analysis, Geometrie, Stochastik oder Topologie behandelt werden, um nur einige wenige zu nennen, lassen sich als Mengen definieren. Gemessen daran ist die Mengenlehre eine recht junge Wissenschaft; erst nach der Überwindung der Grundlagenkrise der Mathematik im frühen 20. Jahrhundert konnte die Mengenlehre ihren heutigen, zentralen und grundlegenden Platz in der Mathematik einnehmen.

## 3. Ideen

### 3.1. Schlussregeln

In diesem Abschnitt geht es um **zulässige Umwandlungen**, d. h. **allgemeingültige Schlussregeln**. Dazu gehören zunächst die **Basisregeln**. Dann aber auch alle aus den **Basisregeln** und den bis dahin **allgemeingültigen Schlussregeln** korrekt abgeleiteten neuen **Schlussregeln**. Die **Schlussregeln** haben die Form eines Formalen **Satz** s.

#### 3.1.1. Basisregeln

Gemäß [1] Kapitel 1.4 *Ein vollständiger aussagenlogischer Kalkül* werden sechs **Basisregeln** definiert. Zuvor werden aber noch einige **Definitionen** gebraucht. Dazu seien  $n, m, k$  und  $l$  natürliche Zahlen (auch 0),  $\alpha, \alpha_i, \beta$  und  $\beta_j$  **Formeln**  $X, X_i, Y$  und  $Y_j$  Mengen von **Formeln** und

$$\begin{aligned} X &:= X_1 \cup X_2 \cup \dots \cup X_n \cup \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\} \\ Y &:= Y_1 \cup Y_2 \cup \dots \cup Y_k \cup \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_l\} \end{aligned}$$

$X$  und  $Y$  können auch die **leere Menge** sein. Damit wird definiert:

$\alpha \vdash \beta \Leftrightarrow \beta$  ist mittels schrittweiser Anwendung **zulässiger Umwandlungen** (siehe weiter unten) aus  $\alpha$  **ableitbar**. Sprechweise: Aus  $\alpha$  ist  $\beta$  **ableitbar** oder **beweisbar**; kurz: „ $\alpha$  **ableitbar**  $\beta$ “ bzw. „ $\alpha$  **beweisbar**  $\beta$ “ — Es kann auch  $\langle \alpha \rangle$  durch  $\langle X \rangle$  und/oder  $\langle \beta \rangle$  durch  $\langle Y \rangle$  ersetzt werden.

$\vdash \beta \Leftrightarrow \emptyset \vdash \beta$  ( $\langle \vdash \rangle$  kann dann auch ganz entfallen)

$$X_1, X_2, \dots, X_n, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \vdash Y_1, Y_2, \dots, Y_k, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_l \Leftrightarrow X \vdash Y$$

Eine **zulässige Umwandlung** ist die Anwendung einer **Ersetzung** <sup>1)</sup> (siehe unten), einer **Basisregel** (siehe unten) oder einer davon abgeleiteten sonstigen **Schlussregel**, z. B. aus Unterabschnitt 2.3.3 auf Seite 25. Bei den **Schlussregeln** und der **Ersetzung**  $\langle \leftarrow \rangle$  soll das Komma stärker binden als  $\langle \vdash \rangle$ ,  $\langle \leftarrow \rangle$  und  $\langle | \rangle$ , wobei  $\langle | \rangle$  für „und“ bzw.  $\langle \& \rangle$  <sup>2)</sup> steht und schwächer bindet als  $\langle \vdash \rangle$  und  $\langle \leftarrow \rangle$ . <sup>3)</sup>

Zur der Auswahl der **Basisregeln**, der Formulierung und der Bezeichnungen wird auf [1, 48] zurückgegriffen. Wie in [48] steht  $\langle E \rangle$  für „Einführung“ und  $\langle B \rangle$  für „Beseitigung“ (oder „Elimination“) von **Junktoren**. <sup>4)</sup>

Im Folgenden seien  $\alpha$  und  $\beta$  **Formeln** und  $X$  und  $Y$  Mengen von **Formeln**. Für die sechs **Basisregeln** werden dann nur noch die **Junktoren**  $\langle \neg \rangle$  und  $\langle \wedge \rangle$  benötigt. Bei den weiteren **Schlussregeln** wird noch  $\langle \rightarrow \rangle$  gemäß der Definition 2.22 auf Seite 31 verwendet.

<sup>1)</sup> siehe Unterabschnitt 3.1.2 auf der nächsten Seite

<sup>2)</sup> siehe Unterabschnitt 2.1.2 auf Seite 15

<sup>3)</sup> siehe Fußnote 3 von Tabelle 2.3 auf Seite 22

<sup>4)</sup> In der **Monotonieregel** wird hier, anders als in [1],  $\langle X, Y \rangle$  statt  $\langle Y, \text{für } Y \supseteq X \rangle$  genommen. Das ist gleichwertig, vermeidet aber den Zusatz  $\langle , \text{für } Y \supseteq X \rangle$ . Außerdem werden bei den Bezeichnungen  $\langle (\wedge 1) \rangle$  und  $\langle (\wedge 2) \rangle$  gemäß [48] durch  $\langle (\wedge E) \rangle$  bzw.  $\langle (\wedge B) \rangle$  ersetzt.

$$\frac{}{\alpha \vdash \alpha} \quad (\text{Anfangsregel}) \quad (\text{AR})$$

$$\frac{X \vdash \alpha}{X, Y \vdash \alpha} \quad (\text{Monotonieregel}) \quad (\text{MR})$$

$$\frac{X \vdash \alpha, \neg \alpha}{X \vdash \beta} \quad (\text{Einführung/Beseitigung der Negation Teil 1}) \quad (\neg 1)$$

$$\frac{X, \alpha \vdash \beta \mid X, \neg \alpha \vdash \beta}{X \vdash \beta} \quad (\text{Einführung/Beseitigung der Negation Teil 2}) \quad (\neg 2)$$

$$\frac{X \vdash \alpha, \beta}{X \vdash \alpha \wedge \beta} \quad (\text{Einführung der Konjunktion}) \quad (\wedge E)$$

$$\frac{X \vdash \alpha \wedge \beta}{X \vdash \alpha, \beta} \quad (\text{Beseitigung der Konjunktion}) \quad (\wedge B)$$

In einer **Schlussregel** werden die **Formeln**<sup>5)</sup> über dem Querstrich als **Voraussetzungen** und die unter dem Querstrich als **Folgerungen** der Regel bezeichnet. Eine **Schlussregel** steht für die **Aussage**, dass mit ihren **Voraussetzungen** auch ihre **Folgerungen** gelten. – Im Gegensatz zu den weiteren **Schlussregeln** werden die oben aufgelisteten **Basisregeln** nicht weiter hinterfragt, d. h. sie gelten quasi als **Axiome**.

### 3.1.2. Identitätsregeln

Die **zulässigen Umwandlungen**, d. h. die Anwendung der **Schlussregeln**, erfordern **zulässige Ersetzungen**. Damit wird dem Gleichheits- oder Identitätszeichen ( $=$ ) mittels Einführungs- und Beseitigungsregel eine Bedeutung verliehen.<sup>6)</sup> Dazu seien  $\alpha$ ,  $\beta$  und  $\gamma$  **vergleichbare**<sup>7)</sup> **Formeln**.

Zunächst wird definiert:

$\gamma(\alpha \leftarrow \beta) \quad :=$  Die **Formel**, die man erhält, wenn in  $\gamma$  alle oder nur einige Vorkommen von  $\alpha$  durch  $\beta$  ersetzt werden. — Gegebenenfalls muss noch die Auswahl der Ersetzungen angegeben werden, andernfalls werden alle Vorkommen ersetzt. Letzteres heißt dann **vollständige Ersetzung**.

$\gamma(\alpha \rightleftharpoons \beta) \quad :=$  Die **Formel**, die man erhält, wenn in  $\gamma$  alle  $\alpha$  und  $\beta$  miteinander vertauscht werden. Dazu ist es nötig, dass  $\alpha$  und  $\beta$  voneinander unabhängig sind, vorzugsweise zwei verschiedene Variable.

$\langle\langle \alpha \leftarrow \beta \rangle\rangle$  heißt **Ersetzung** und  $\langle\langle \alpha \rightleftharpoons \beta \rangle\rangle$  **Vertauschung** oder kurz **Tausch**. – Sei noch  $S = (s_1, s_2, \dots)$  eine endliche Folge von **Ersetzungen**, die auch **Vertauschungen** enthalten und auch leer sein kann.

<sup>5)</sup> hier: **Aussagen** in einer formalen Form.

<sup>6)</sup> siehe [48]

<sup>7)</sup> siehe Ende von Unterabschnitt 2.1.2 auf Seite 15

Dann wird definiert:

$$\begin{aligned}\gamma(S) &::= \gamma(s_1)(s_2)\dots & (3.1) \\ \gamma(\emptyset) &= \gamma & \text{(nur zur Verdeutlichung)} \\ \gamma(s_1, s_2, \dots) &::= \gamma(S)\end{aligned}$$

Die **Vertauschung** ist eine spezielle Form der **Ersetzung**. Wenn  $x$  und  $y$  zwei verschiedene Variable, die in  $\alpha$ ,  $\beta$  und  $\gamma$  nicht vorkommen, gilt:

$$\gamma(\alpha \rightleftharpoons \beta) = \gamma(\alpha \leftarrow x, \beta \leftarrow y, y \leftarrow \alpha, x \leftarrow \beta)$$

Sei zusätzlich noch  $s$  eine **Ersetzung**. Folgende Sprechweisen werden verwendet:

$\gamma(\alpha \leftarrow \beta)$  : In  $\gamma$  wird  $\alpha$  (**vollständig**) durch  $\beta$  **substituiert**.

$\gamma(\alpha \rightleftharpoons \beta)$  : In  $\gamma$  werden  $\alpha$  und  $\beta$  **vertauscht**.

$\gamma(s)$  :  $s$  wird auf  $\gamma$  **angewendet**.

$\gamma(S)$  : Die **Ersetzungen** aus  $S$  werden in der angegebenen Reihenfolge auf  $\gamma$  angewendet.

$\gamma(S)$  :  $S$  wird auf  $\gamma$  angewendet.

Bei obiger Definition der **Ersetzung** bleibt noch offen, unter welchen **Voraussetzungen** sie angewendet werden darf. Das soll hier nicht untersucht werden. In diesem Abschnitt genügt es, das nur **Vertauschung** und vollständige **Ersetzung** verwendet werden. In diesen Fällen sind beliebige **Ersetzungen** von Variablen durch **Formeln** erlaubt.

Ist  $\gamma$  wie oben und  $S$  eine Menge von **Ersetzungen**.

Nun können die beiden **Identitätsregeln** definiert werden:

$$\frac{}{\alpha = \alpha} \quad \text{(Einführung der Identität)} \quad (= E)$$

$$\frac{\alpha = \beta \mid \gamma}{\gamma(\alpha \leftarrow \beta)} \quad \text{(Beseitigung der Identität)} \quad (= B)$$

Die **Identitätsregeln** werden hier eingeführt, um die **Ersetzung** zu rechtfertigen. Wie die **Basisregeln** gelten sie als **Axiome**, würden also eigentlich dazu gehören. Da sie aber nicht weiter verwendet werden, werden sie hier nicht zu den **Basisregeln** gezählt.

### 3.1.3. Weitere **Schlussregeln**

In [1] werden aus den **Basisregeln** mittels zulässiger **Umwandlungen** weitere **Schlussregeln** abgeleitet.<sup>8)</sup> Man vergleiche auch mit [48].

<sup>8)</sup> In [1] werden die **Identitätsregeln** zwar weder aufgeführt noch angewandt, ohne **Ersetzung** geht es aber nicht.

$$\frac{X, \neg\alpha \vdash \alpha}{X \vdash \alpha} \quad (\text{Beseitigung der Negation; Indirekter Beweis}) \quad (\neg 3)$$

$$\frac{X, \neg\alpha \vdash \beta, \neg\beta}{X \vdash \alpha} \quad (\text{Reductio ad absurdum}) \quad (\neg 4)$$

$$\frac{X, \alpha \vdash \beta}{X \vdash \alpha \rightarrow \beta} \quad (\text{Einführung der Implikation}) \quad (\rightarrow E)$$

$$\frac{X \vdash \alpha \rightarrow \beta}{X, \alpha \vdash \beta} \quad (\text{Beseitigung der Implikation}) \quad (\rightarrow B)$$

$$\frac{X \vdash \alpha \mid X, \alpha \vdash \beta}{X \vdash \beta} \quad (\text{Schnittregel}) \quad (\text{SR})$$

$$\frac{X \vdash \alpha \mid \alpha \rightarrow \beta}{X \vdash \beta} \quad (\text{Abtrennungsregel} \text{ — } \textit{Modus ponens}) \quad (\text{TR})$$

Dabei werden zum Beweis der Schlussregeln in [1] folgende Basisregeln verwendet:

**Schlussregel** : verwendete **Basisregeln**

$\neg 3$  : AR, MR,  $\neg 2$

$\neg 4$  : AR, MR,  $\neg 1$ ,  $\neg 2$

$\rightarrow E$  : AR, MR,  $\neg 1$ ,  $\neg 2$ ,  $\wedge E$

$\rightarrow B$  : AR, MR,  $\neg 1$ ,  $\neg 2$ ,  $\wedge B$

SR : AR, MR,  $\neg 1$ ,  $\neg 2$

TR : AR, MR,  $\neg 1$ ,  $\neg 2$ ,  $\wedge E$

### 3.1.4. Beispiel einer Ableitung

Als Beispiel wird hier die Schnittregel aus den Basisregeln abgeleitet.<sup>9)</sup> Dazu wird verabredet, dass in der Tabelle 3.1 auf Seite 39 der Inhalt der Zelle in der Zeile  $i$  und der Spalte  $(X_n)$  mit  $X_i$  bezeichnet wird. Zur kürzeren Darstellung wird statt auf die vollständigen Spaltenüberschriften nur auf die dort notierten  $(X_n)$  verwiesen. Dass in der Spalte  $(n)$  stets die Zeilennummer steht, wird im folgenden nicht mehr extra erwähnt.

<sup>9)</sup> Die Form der Tabelle ist angelehnt an [48] Kapitel 2.2.4 Eine Beispielableitung.

Für die ausgefüllten Felder wird nun definiert:<sup>10)</sup>

$$R_i := \begin{cases} - \text{“Voraussetzung”} = \text{Die Aussage } A_i \text{ ist eine Voraussetzung.} \\ - \text{“Folgerung”} = \text{Die Aussage } A_i \text{ ist eine Folgerung.} \\ - \text{“Annahme”} = \text{Die Aussage } A_i \text{ wird vorübergehend als zutreffend angenommen.} \\ - j = \text{Verweis auf die Schlussregel } \bar{R}_j \text{ für ein } j < i. \\ - \text{Verweis (ohne Klammern) auf eine allgemeingültige Schlussregel.} \end{cases}$$

$S_i :=$  Die Folge von den anzuwendenden Ersetzungen.

$\bar{R}_i :=$  Das Ergebnis der in der angegebenen Reihenfolge angewendeten Ersetzungen aus  $S_i$  auf die Schlussregel  $R_i$

$Z_i :=$  Die Indizes  $j$  (mit  $j < i$ ) als Verweise auf eine oder mehrere Aussagen  $A_j$ , welche zusammen genau die Voraussetzungen der Schnittregel  $\bar{R}_i$  erfüllen.

$A_i :=$  Folgerung(en) der Schlussregel  $\bar{R}_i$  —

auch in Form der Indizes von einem oder mehreren von  $A_j$  (mit  $j < i$ ).

In der Ergebniszeile kann hier auch die bewiesene Aussage als Schlussregel stehen.

$D_i :=$  die Indizes der  $A_j$ , von denen  $A_i$  abhängig ist.

Bis zur Zeile  $i$  hat man die folgende Schlussregel bewiesen:

$$\frac{A_{i_1} \mid A_{i_2} \dots}{A_i}, \text{ für alle } i_j \in D_i$$

Sei nun

$$\Gamma_i := \begin{cases} \text{leer} & \text{für } R_i = \text{“Voraussetzung”} \\ \text{leer} & \text{für } R_i = \text{“Folgerung”} \\ \text{leer} & \text{für } R_i = \text{“Annahme”} \\ \bar{R}_j & \text{für } R_i = j \text{ (eine interne Schlussregel)} \\ \text{die Schlussregel} & \text{für } R_i = \text{Verweis auf eine externe Schlussregel} \end{cases}$$

Damit gilt für die Einträge in einer Zeile  $i$ :

- Wenn  $\Gamma_i$  nicht leer ist, ist  $R_i$  eine Schlussregel mit  $R_i = \Gamma_i(S_i)$ <sup>11)</sup>.
- Wenn  $A_i$  nicht leer ist, ist  $R_i = \frac{A_{z_1} \mid A_{z_2} \mid \dots}{A_i}$  (alle  $z_j \in Z_i$ ).
- Wenn  $A_i$  nicht leer ist, ist bis jetzt die Schlussregel  $\frac{A_{d_1} \mid A_{d_2} \mid \dots}{A_i}$  (alle  $d_j \in D_i$ ) schon bewiesen.

$S_i$ ,  $Z_i$  und  $D_i$  dürfen dabei auch leer sein.

Die Erzeugung einer Tabelle analog zu 3.1 auf der nächsten Seite wird im folgenden beschrieben. Zellen, für die kein Inhalt angegeben wird, bleiben leer. Rückwärts-Referenzen auf schon ausgefüllte Zellinhalte sind jederzeit möglich. Das Eintragen der Zeilennummer  $i$  wird nicht extra erwähnt. – Die Tabelle und die Beschreibung sind so ausführlich, damit man daraus leicht ein Computerprogramm erstellen kann.

1. Am Anfang der Tabelle werden zuerst Voraussetzungen, dann zu beweisende Folgerungen und schließlich Annahmen aufgeführt.<sup>12)</sup> Jede der drei Gruppen kann auch leer sein und es ist auch

<sup>10)</sup> Eigentlich müsste man für jede Ersetzung aus  $S_i$  eine eigene Zeile vorsehen. Um die Tabellen für die Beweise kürzer zu halten, werden aufeinanderfolgende Ersetzungen zusammengefasst.

<sup>11)</sup> siehe Definition (3.1) von Unterabschnitt 3.1.2 auf Seite 35

<sup>12)</sup> Die Angabe ist dann erforderlich, wenn darauf verwiesen wird. Durch die Auflistung hat man aber einen vollständigen Überblick über die Voraussetzungen und Folgerungen eines Beweises und die Zwischenannahmen. Auf jede nötige Voraussetzung und jede verwendete Zwischenannahme wird in der Spalte ( $Z_n$ ) mindestens einmal verwiesen, so dass sie auch aufgeführt werden müssen. Die Angabe der Folgerungen erleichtert die Erstellung einer Ergebniszeile (siehe Punkt 3).

Zeile ( $n$ )	Regel ( $R_n$ )	Substitu- tionen ( $S_n$ )	erzeugte Regel ( $\bar{R}_n$ )	angewendet auf ... ( $Z_n$ )	Aussage ( $A_n$ )	Abhängig- keiten ( $D_n$ )
1	Voraus- setzung				$X \vdash \alpha$	1
2	Voraus- setzung				$X, \alpha \vdash \beta$	2
3	Folge- rung				$X \vdash \beta$	3
4	MR		$\frac{X \vdash \alpha}{X, Y \vdash \alpha}$			
5	4	$Y \leftrightarrow \neg \alpha$	$\frac{X \vdash \alpha}{X, \neg \alpha \vdash \alpha}$	1	$X, \neg \alpha \vdash \alpha$	1
6	AR		$\frac{}{\alpha \vdash \alpha}$			
7	6	$\alpha \leftrightarrow \neg \alpha$	$\frac{}{\neg \alpha \vdash \neg \alpha}$		$\neg \alpha \vdash \neg \alpha$	
8	4	$\alpha \leftrightarrow \neg \alpha$ $X \leftrightarrow \neg \alpha$ $Y \leftrightarrow X$	$\frac{\neg \alpha \vdash \neg \alpha}{X, \neg \alpha \vdash \neg \alpha}$	7	$X, \neg \alpha \vdash \neg \alpha$	
9	$\neg 1$		$\frac{X \vdash \alpha, \neg \alpha}{X \vdash \beta}$			
10	9	$X \leftrightarrow X, \neg \alpha$	$\frac{X, \neg \alpha \vdash \alpha, \neg \alpha}{X, \neg \alpha \vdash \beta}$	5, 8	$X, \neg \alpha \vdash \beta$	1
11	$\neg 2$		$\frac{X, \alpha \vdash \beta \mid X, \neg \alpha \vdash \beta}{X \vdash \beta}$	2, 10	3	1, 2
12	AR, MR, $\neg 1, \neg 2$		$\frac{A_1 \mid A_2}{A_3}$		$\frac{X \vdash \alpha \mid X, \alpha \vdash \beta}{X \vdash \beta}$	

Tabelle 3.1.: Ableitung der Schnittregel aus den Basisregeln

möglich, die Zeilen an anderen Stellen der Tabelle anzugeben, spätestens aber, wenn darauf verwiesen wird. Für jede **Voraussetzung**, **Folgerung** und Annahme gibt es eine Zeile:

- a)  $R_i$  = "**Voraussetzung**", "**Folgerung**" oder "**Annahme**".
- b)  $A_i$  = Die aktuelle **Voraussetzung**, **Folgerung** oder Annahme.
- c)  $D_i = i$  (ein Verweis auf  $A_i$ ).

2. In den nächsten Zeilen werden die **Beweisschritte** aufgeführt, für jeden Schritt eine Zeile.

Zunächst kann  $R_i$  kann auf zwei Arten erzeugt werden:

- a) i.  $R_i$  = Verweis auf eine **allgemeingültige Schlussregel**.
- ii.  $\bar{R}_i$  = Die **Schlussregel**, auf die verwiesen wird.

oder

- a) i.  $R_i = j$ , wenn die schon bewiesene **Schlussregel**  $\bar{R}_j$  (mit  $j < i$ ) angewendet werden soll.
- ii.  $S_i$  = Die auf die **Schlussregel**  $R_i$  anzuwendende **Ersetzung**.
- iii.  $\bar{R}_i$  = Das Ergebnis der **Ersetzung**  $S_i$  auf die **Schlussregel**  $R_i$ .

Man beachte, dass die **Schlussregel**  $\bar{R}_i$ , stets allgemeingültig ist, da sie ausschließlich aus **allgemeingültigen Schlussregeln** mittels **Ersetzungen** abgeleitet worden ist. Daher gibt es auch keine Beschränkung weiterer **Ersetzungen** durch irgendwelche Abhängigkeiten.

Nun kann die Zeile beendet werden, oder es geht weiter mit:

- b)  $Z_n$  = Die Indizes aller  $A_j$  (mit  $j < i$ ), die eine **Voraussetzung** der **Schlussregel**  $\bar{R}_i$  sind, möglichst in der verwendeten Reihenfolge. — Für jedes angegebene  $j$  werden noch die Abhängigkeiten  $D_j$  den Abhängigkeiten  $D_i$  hinzugefügt.
- c)  $A_i$  = **Folgerung** (en) der **Schlussregel**  $\bar{R}_i$ . — Wenn diese **Folgerungen** schon als **Aussagen**  $A_j$  (mit  $j < i$ ) vorhanden sind, können auch einfach deren Indizes eingetragen werden. Damit werden die Zusammenhänge und der Abschluss des **Beweis es** besser ersichtlich.
- d)  $D_i$  = Die Verweise wurden schon in (2b) eingetragen.<sup>13)</sup>

Der **Beweis** muss so lange fortgeführt werden, bis alle **Folgerungen** als **Aussagen** in der Spalte ( $A_n$ ) erschienen und dort jeweils nur von den gegebenen **Voraussetzungen** abhängig sind.

3. In einer **Ergebniszeile**, die dann die letzte ist, kann noch die bewiesene Behauptung in Form einer **Schlussregel** formuliert und in einer passenden Spalte notiert werden. Zusätzlich können dort auch noch alle verwendeten **Schlussregeln** gesammelt werden. Dies kann z. B. folgendermaßen geschehen:

- a)  $(R_n)$  = Verweise auf alle verwendeten externen **Schlussregeln**.
- b)  $(\bar{R}_n)$  = Die bewiesene Behauptung als **Schlussregeln**, wobei alle  $A_i$ , die **Voraussetzungen** sind, als **Voraussetzung** und alle  $A_j$ , die **Folgerungen** sind, als **Folgerung** eingesetzt werden. Das ergibt dann:

$$\frac{A_{i_1} \mid A_{i_2} \mid \dots}{A_{j_1} \mid A_{j_2} \mid \dots}$$

- c)  $(A_n) = \bar{R}_i$ , wobei die **Voraussetzungen** und **Folgerungen** aufgelöst werden.
- d)  $(D_n)$  = Die Vereinigung aller Abhängigkeiten der **Folgerungen**, vermindert um die **Voraussetzungen**. — Wenn das Feld dabei nicht leer bleibt, ist der **Beweis** missglückt!

Ein weiteres Beispiel in der Tabelle 3.2 auf der nächsten Seite soll verdeutlichen, wie Abhängigkeiten von Zwischenannahmen wieder beseitigt werden können.<sup>14)</sup>

> > > Beispielableitung der Kontraposition vervollständigen < < <

<sup>13)</sup> Wenn  $D_n$  leer ist, dann ist  $A_n$  allgemeingültig.

<sup>14)</sup> siehe [48], Kapitel 2.2.4 Eine Beispielableitung



Zeile ( $n$ )	Regel ( $R_n$ )	Substitu- tionen ( $S_n$ )	erzeugte Regel ( $\bar{R}_n$ )	angewendet auf ... ( $Z_n$ )	Aussage ( $A_n$ )	Abhängig- keiten ( $D_n$ )
1	Folge- rung				$(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\neg\beta \rightarrow \neg\alpha)$	1
2	An- nahme				$\alpha \rightarrow \beta$	2
3	An- nahme				$\neg\beta$	3
4	An- nahme				$\alpha$	4
5	$\rightarrow$ B		$\frac{X \vdash \alpha \rightarrow \beta}{X, \alpha \vdash \beta}$			
6	-1	$X \leftrightarrow \emptyset$	$\frac{\alpha \rightarrow \beta}{\alpha \vdash \beta}$	2	$\alpha \vdash \beta$	2
7	SR		$\frac{X \vdash \alpha \mid X, \alpha \vdash \beta}{X \vdash \beta}$			
8	-1	$X \leftrightarrow \emptyset$	$\frac{\alpha \mid \alpha \vdash \beta}{\beta}$	4, 6	$\beta$	4, 6
9'	$\wedge$ E		$\frac{X \vdash \alpha, \beta}{X \vdash \alpha \wedge \beta}$			
10'	-1	$X \leftrightarrow \emptyset$	$\frac{\alpha \mid \beta}{\alpha \wedge \beta}$			
11'	-1	$\alpha \leftrightarrow \beta$ $\alpha \leftrightarrow \neg\beta$	$\frac{\beta \mid \neg\beta}{\beta \wedge \neg\beta}$	8, 3	$\beta \wedge \neg\beta$	
9	$\neg$ 1		$\frac{X \vdash \alpha, \neg\alpha}{X \vdash \beta}$			
10	-1	$X \leftrightarrow \emptyset$	$\frac{\alpha \mid \neg\alpha}{\beta}$			
11	-1	$\alpha \leftrightarrow \beta$ $\alpha \leftrightarrow \neg\alpha$	$\frac{\beta \mid \neg\beta}{\neg\alpha}$	8, 3	$\neg\alpha$	2, 3, 4
12	$\rightarrow$ E		$\frac{X, \alpha \vdash \beta}{X \vdash \alpha \rightarrow \beta}$			
13	-1	$X \leftrightarrow \emptyset$	$\frac{\alpha \vdash \beta}{\alpha \rightarrow \beta}$			
14	-1	$\alpha \leftrightarrow \beta$ $\alpha \leftrightarrow \neg\alpha$ $\beta \leftrightarrow \neg\beta$ $\alpha \leftrightarrow \gamma$	$\frac{\neg\beta \vdash \neg\alpha}{\neg\beta \rightarrow \neg\alpha}$	3, 11, ???	$\neg\beta \rightarrow \neg\alpha$	2, 3, 4, ???
15	$\rightarrow$ E+1	$\beta \leftrightarrow \delta$ $\gamma \leftrightarrow \alpha \rightarrow \beta$ $\delta \leftrightarrow \neg\beta \rightarrow$ $\neg\alpha$	$\frac{\alpha \rightarrow \beta \vdash \neg\beta \rightarrow \neg\alpha}{(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\neg\beta \rightarrow \neg\alpha)}$	2, 14	$(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\neg\beta \rightarrow \neg\alpha)$	2, 3, 4, ???
16	$\rightarrow$ E, $\rightarrow$ B, SR		$\overline{A_1}$		$\overline{(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\neg\beta \rightarrow \neg\alpha)}$	

Tabelle 3.2.: Ableitung der Kontraposition aus allgemeingültigen Schlussregeln

## 4. Design

Dieses Projekt soll Open Source sein. Daher gilt für die Dokumente die *GNU Free Documentation License (FDL)* und für die Software die *GNU Affero General Public License (APGL)*. Die *GNU General Public License (GPL)* reicht für die Software nicht aus, da das Programm auch mittels eines Servers betrieben werden kann und soll. Damit das Projekt gegebenenfalls durch verschiedene Entwickler gleichzeitig bearbeitet werden kann und wegen des Konfigurationsmanagements wurde es als ein GitHub Projekt erstellt (siehe [21]).

Wenn die Lizenzen nicht mitgeliefert wurden, können sie unter <http://www.gnu.org/licenses/> gefunden werden.

### 4.1. Anforderungen

Die Anforderungen ergeben sich zunächst aus den Zielen im Abschnitt 1.3 auf Seite 7. Die beiden Ziele 1 *Daten* und 15 *Lizenz* sind für die Entwicklung von ASBA von sekundärer Bedeutung und werden daher in diesem Abschnitt nicht übernommen. Die anderen Ziele werden noch verfeinert.

> > > **Ziele aus Abschnitt “Ziele” in Anforderungen umwandeln.** < < <

1. **Form:** Die Daten liegt in formaler, geprüfter Form vor. — siehe Ziel 2 auf Seite 7
2. **Eingaben:** Die Eingabe von Daten erfolgt in einer formalen Syntax unter Verwendung der üblichen mathematischen Schreibweise. Folgende Daten können eingegeben werden:
  - a) *Axiome*
  - b) *Sätze*
  - c) *Beweise*
  - d) *Fachbegriffe*
  - e) *Fachgebiete*
  - f) *Ausgabeschemata*

Dabei sind alle Begriffe nur innerhalb eines Fachgebiets und seiner untergeordneten *Fachgebiete* gültig, solange sie nicht umdefiniert werden. Das oberste *Fachgebiet* ist die ganze Mathematik. — siehe Ziel 3 auf Seite 7

3. **Prüfung:** Vorhandene *Beweise* können automatisch geprüft werden. — siehe Ziel 4 auf Seite 7
4. **Ausgaben:** Die Ausgabe kann in einer eindeutigen, formalen Syntax gemäß vorhandener *Ausgabeschemata* erfolgen. — siehe Ziel 5 auf Seite 7
5. **Auswertungen:** Zusätzlich zur Ausgabe der Daten sind verschiedene Auswertungen möglich. Insbesondere kann zu jedem *Beweis* angegeben werden, wie lang er ist und welche *Axiome* und *Sätze*<sup>1)</sup> er benötigt. — siehe Ziel 6 auf Seite 7

<sup>1)</sup> *Sätze*, die quasi als *Axiome* verwendet werden.

6. **Anpassbarkeit:** [Fachbegriffe](#) und die Darstellung bei der Ausgabe können mit Hilfe von — gegebenenfalls unbenannten — untergeordneten [Fachgebieten](#) angepasst werden. — siehe Ziel [7 auf Seite 7](#)
7. **Individualität:** [Axiome](#) und [Sätze](#) können für jeden [Beweis](#) individuell vorausgesetzt werden. Dabei sind fachgebietsspezifische [Fachbegriffe](#) erlaubt. — siehe Ziel [8 auf Seite 7](#))
8. **Internet:** Die Daten können auf mehrere Dateien verteilt sein. Ein Teil davon — oder sogar alle — können im Internet liegen. — siehe Ziel [9 auf Seite 8](#)
9. **Kommunikation:** Die Kommunikation mit [ASBA](#) kann mit den [Fachbegriffen](#) der einzelnen [Fachgebiete](#) erfolgen. — siehe Ziel [10 auf Seite 8](#)
10. **Zugriff:** Der Zugriff auf [ASBA](#) kann lokal und über das Internet erfolgen. — siehe Ziel [11 auf Seite 8](#)
11. **Unabhängigkeit:** [ASBA](#) kann offline und online arbeiten. — siehe Ziel [12 auf Seite 8](#)
12. **Rekursion:** Es kann rekursiv über alle verwendeten Dateien — auch solchen, die im Internet liegen — ausgewertet werden. — siehe Ziel [13 auf Seite 8](#)
13. **Bedienbarkeit:** [ASBA](#) ist einfach zu bedienen. — siehe Ziel [14 auf Seite 8](#)
14. **Zwischenspeicher:** Wichtige Auswertungen können an vorhandenen Dateien angehängt oder separat in eigenen Dateien gespeichert werden. — siehe Ziel [16 auf Seite 8](#)
15. **Beweisunterstützung:** [ASBA](#) hilft bei der Erstellung von [Beweisen](#). — siehe Ziel [17 auf Seite 8](#)

## 4.2. [Axiome](#)

> > > [Axiome](#) auswählen und definieren. < < <

## 4.3. [Beweise](#)

> > > [Schlussregeln](#) auswählen und Beweise definieren. < < <

## 4.4. Datenstruktur

> > > Datenstruktur abstrakt und in XML definieren. < < <

## 4.5. Bausteine

> > > Bausteine? definieren. < < <

# A. Anhang

## A.1. Werkzeuge

Da dies ein Open Source Projekt sein soll, müssen alle Werkzeuge, die zum Ablauf der Software erforderlich sind, ebenfalls Open Source sein. Für die reine Entwicklung sollte das auch gelten, muss es aber nicht.

### Werkzeuge zur Übersetzung der Quelldateien

1. Ein Übersetzer für  $\text{\LaTeX}$  Quellcode (\*.tex). — Verwendet wird *MiKTeX*.
2. Ein Übersetzer für C++ Quellcode (\*.c, \*.cpp, \*.h, \*.hpp). — Verwendet wird *Visual Studio Community 2017*.

Nicht unbedingt nötig, aber sinnvoll:

3. Ein Dokumentationssystem für in C++ Quellcode und darin enthaltene Doxygen Kommentare (\*.c, \*.cpp, \*.h, \*.hpp). — Verwendet wird *Doxygen* mit Konfigurationsdatei „Doxyfile“.
4. Ein Konfigurationsmanagementsystem zur Verwaltung der Quelldateien. — Verwendet wird *GitHub*.

### Werkzeuge für die Entwicklung

5. *GitHub* als Online Konfigurationsmanagementsystem zur Zusammenarbeit verschiedener Entwickler. → <https://github.com/> — Lizenz siehe [8]
6. *GitHub* benötigt *Git* als Konfigurationsmanagementsystem. → <https://git-scm.com/> — Lizenz siehe [8]
7. *MiKTeX* für Dokumentation und Ausgaben in  $\text{\LaTeX}$ . → <https://miktex.org/> — Lizenz siehe [12]
8. angedacht: *Visual Studio Community 2017*<sup>1)</sup> (VS) als Entwicklungsumgebung für C++. → <https://www.visualstudio.com/downloads/> — Lizenz siehe [11]
9. angedacht: In *Visual Studio Community 2015* integrierte Datenbank für *Ausgabeschemata*, *Sätze*, *Beweise*, *Fachbegriffe* und *Fachgebiete*. — Lizenz siehe [11]
10. angedacht: *RapidXml* für Ein- und Ausgabe in XML. → <http://rapidxml.sourceforge.net/index.htm> — Lizenz siehe [4] oder wahlweise [14]<sup>2)</sup>
11. angedacht: *Doxygen* als Dokumentationssystem für C++. → <http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen/> — Lizenz siehe [8]

<sup>1)</sup> Visual Studio Community ist zwar nicht Open Source, darf aber zur Entwicklung von Open Source Software unentgeltlich verwendet werden.

<sup>2)</sup> RapidXml stellt eine C++ Header-Datei zur Verfügung. Wenn diese im Quellcode eines Programms enthalten ist, gilt das ganze Programm als Open Source. Wenn diese Header-Datei nur in einer Bibliothek innerhalb eines Projekts verwendet wird, so gilt nur diese Bibliothek als Open Source.

12. angedacht: Doxygen benötigt *Ghostscript* als Interpreter für Postscript und PDF. → <http://ghostscript.com/> — Lizenz siehe [6]
13. angedacht: Doxygen benötigt *Graphviz* mit *Dot* zur Erzeugung und Visualisierung von Graphen. → <http://www.graphviz.org/Home.php> — Lizenz siehe [5]

### Werkzeuge zur Bearbeitung der Quelldateien

14. *TeXstudio* als Editor für  $\text{\LaTeX}$ . → <http://www.texstudio.org/> — Lizenz siehe [8]  
*TeXstudio* benötigt einen Interpreter für Perl:
15. *Strawberry Perl* als Interpreter für Perl. → <http://strawberryperl.com/> — Lizenz: Various OSI-compatible Open Source licenses, or given to the public domain
16. *Notepad++* als Text-Editor. → <https://notepad-plus-plus.org/> — Lizenz siehe [7]
17. *WinMerge* zum Vergleich von Dateien und Verzeichnissen. → <http://winmerge.org/> — Lizenz siehe [7]

### Im Projekt *qedeq* verwendete Werkzeuge

- *Java* als Programmiersprache und Laufzeitumgebung. → <https://www.java.com/de/download/win10.jsp> — Lizenz siehe [15]
- *Apache Ant* als Java Bibliothek und Kommandozeilen-Werkzeug um Java Programme zu erzeugen. → <http://ant.apache.org/> — Lizenz siehe [3]
- *Checkstyle* zur statischen Code-Analyse für Java. → <http://checkstyle.sourceforge.net/> — Lizenz siehe [9]
- *Clover*<sup>3)</sup> als Testwerkzeug zur Analyse der Code-Abdeckung. → <https://www.atlassian.com/software/clover/> — Lizenz siehe [10]
- *Eclipse IDE for Java Developers* als Entwicklungsumgebung für Java. → <http://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-developers/neon1a/> — Lizenz siehe [16]
- *JUnit* zur Erzeugung von wiederholbaren Tests. → <http://junit.org/junit4/> — Lizenz siehe [5]
- *Xerces2* als XML-Parser in Java. → <http://xerces.apache.org/xerces2-j/> — Lizenzen siehe [3, 13, 17, 18]

## A.2. Offene Aufgaben

1. TODOs bearbeiten.
2. Eingabeprogramm erstellen (liest XML).
3. Prüfprogramm erstellen.
4. Ausgabeprogramm erstellen (schreibt XML).
5. Formelausgabe erstellen (erzeugt  $\text{\LaTeX}$  aus XML).
6. [Axiome](#) sammeln und eingeben.
7. Sätze sammeln und eingeben.

<sup>3)</sup> Clover ist proprietäre Software, aber auf Anfrage frei für 30 Tage. Danach ist eine einmalige Lizenzgebühr fällig.

8. [Beweise](#) sammeln und eingeben.
9. [Fachbegriffe](#) und Symbole sammeln und eingeben.
10. [Fachgebiete](#) sammeln und eingeben.
11. [Ausgabeschemata](#) sammeln und eingeben.

## B. Verzeichnisse

### Tabellenverzeichnis

1.1. Fragen (1.1) → Eigenschaften (1.2) . . . . .	7
1.2. Eigenschaften (1.2) → Ziele (1.3) . . . . .	8
1.3. Fragen (1.1) → Ziele (1.3) . . . . .	9
2.1. Darstellung der Wahrheitswerte . . . . .	14
2.2. Beispiele für $<$ und $\leq$ . . . . .	21
2.3. Prioritäten in abnehmender Reihenfolge . . . . .	22
2.4. Definition von aussagenlogischen Symbolen. . . . .	29
3.1. Ableitung der Schnittregel aus den Basisregeln . . . . .	39
3.2. Ableitung der Kontraposition aus allgemeingültigen Schlussregeln . . . . .	41

### Abbildungsverzeichnis

1.1. Die Umgebung von ASBA . . . . .	10
--------------------------------------	----



# Literaturverzeichnis

- [1] Wolfgang Rautenberg, *Einführung in die Mathematische Logik*: Ein Lehrbuch, 3. Auflage, Vieweg+Teubner 2008 [5](#), [12](#), [13](#), [21](#), [23](#), [27](#), [28](#), [34](#), [36](#), [37](#)
- [2] Norbert Schwarz, „unveränderte“ PDF-Fassung der 3. Auflage von 1991 → *Einführung in T<sub>E</sub>X*: <sup>1)</sup> <http://www.ruhr-uni-bochum.de/www-rz/schwanbs/TeX/> — 06.02.2002
- [3] *Apache License*, Version 2.0 <sup>2)</sup> → <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> — 01.2004 [45](#)
- [4] *Boost Software License* 1.0 → <http://www.boost.org/users/license.html> — 17.08.2003 [44](#)
- [5] *Eclipse Public License* Version 1.0 → <http://www.eclipse.org/org/documents/epl-v10.php> — 09.03.2017 [45](#)
- [6] *GNU Affero General Public License* → <http://www.gnu.org/licenses/agpl> — 19.11.2007 [45](#)
- [7] *GNU General Public License* → <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-1.0> — 02.1989 [45](#)
- [8] *GNU General Public License*, Version 2  
→ <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0> — 06.1991 [44](#), [45](#)
- [9] *GNU Lesser General Public License*, Version 2.1  
→ <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1> — 02.1999 [45](#)
- [10] Lizenz für *Clover* → <https://www.atlassian.com/software/clover> — 2017 [45](#)
- [11] Lizenz für *Microsoft Visual Studio Express* 2015  
→ <https://www.visualstudio.com/de/license-terms/mt171551/> — 2017 [44](#)
- [12] Lizenz für *MikTeX* → <https://miktex.org/kb/copying> — 13.04.2017 [44](#)
- [13] Lizenz für *SAX* → <http://www.saxproject.org/copying.html> — 05.05.2000 [45](#)
- [14] *MIT License* → <https://opensource.org/licenses/MIT/> — 09.03.2017 [44](#)
- [15] *Oracle Binary Code License Agreement* → <http://java.com/license> — 02.04.2013 [45](#)
- [16] *OSI Certified Open Source Software*  
→ <https://opensource.org/pressreleases/certified-open-source.php> — 16.06.1999 [45](#)
- [17] *W3C Document License* → <http://www.w3.org/Consortium/Legal/2015/doc-license> — 01.02.2015 [45](#)
- [18] *W3C Software Notice and License*  
→ <http://www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-software-20021231.html> — 13.05.2015 [45](#)
- [19] *Hilbert II — Introduction* → <http://www.qedeq.org/> — 20.01.2014 [4](#), [5](#)
- [20] *Formal Correct Mathematical Knowledge*: GitHub Repository vom Projekt Hilbert II  
→ <https://github.com/m-31/qedeq/> — 18.03.2017 [5](#)

<sup>1)</sup> Das Datum hinter dem Link gibt — je nachdem welches bekannt ist — das Datum der letzten Änderung, den Stand der Seite oder das Datum, an dem die Seite angeschaut wurde an. Sind mehrere Daten vorhanden, wird das erste vorhandene in der angegebenen Reihenfolge genommen. — Dies gilt für alle hier aufgelisteten Seiten im Internet.

<sup>2)</sup> Der Pfeil (→) verweist stets auf einen Link zu einer Seite im Internet.

- [21] ASBA — *Axiome, Sätze, Beweise und Auswertungen*. Projekt zur maschinellen Überprüfung von mathematischen Beweisen und deren Ausgabe in lesbarer Form: GitHub Repository vom Projekt ASBA — in Bearbeitung → <https://github.com/Dr-Winfried/ASBA> 42
- [22] Meyling, Michael: *Anfangsgründe der mathematischen Logik* → [http://www.qedeq.org/current/doc/math/qedeq\\_logic\\_v1\\_de.pdf](http://www.qedeq.org/current/doc/math/qedeq_logic_v1_de.pdf) — 24. Mai 2013 (in Bearbeitung) 28
- [23] Meyling, Michael: *Formale Prädikatenlogik* → [http://www.qedeq.org/current/doc/math/qedeq\\_formal\\_logic\\_v1\\_de.pdf](http://www.qedeq.org/current/doc/math/qedeq_formal_logic_v1_de.pdf) — 24. Mai 2013 (in Bearbeitung)
- [24] Meyling, Michael: *Axiomatische Mengenlehre* → [http://www.qedeq.org/current/doc/math/qedeq\\_set\\_theory\\_v1\\_de.pdf](http://www.qedeq.org/current/doc/math/qedeq_set_theory_v1_de.pdf) — 24. Mai 2013 (in Bearbeitung)
- [25] Meyling, Michael: *Elements of Mathematical Logic* → [http://www.qedeq.org/current/doc/math/qedeq\\_logic\\_v1\\_en.pdf](http://www.qedeq.org/current/doc/math/qedeq_logic_v1_en.pdf) — 24. Mai 2013 (in Bearbeitung) 28
- [26] Meyling, Michael: *Formal Predicate Calculus* → [http://www.qedeq.org/current/doc/math/qedeq\\_formal\\_logic\\_v1\\_en.pdf](http://www.qedeq.org/current/doc/math/qedeq_formal_logic_v1_en.pdf) — 24. Mai 2013 (in Bearbeitung)
- [27] Meyling, Michael: *Axiomatic Set Theory* → [http://www.qedeq.org/current/doc/math/qedeq\\_set\\_theory\\_v1\\_en.pdf](http://www.qedeq.org/current/doc/math/qedeq_set_theory_v1_en.pdf) — 24. Mai 2013 (in Bearbeitung)
- [28] Wikipedia Hauptseite → <https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite> — 07.11.2017 66
- [29] Wikipedia: *Aussagenlogik* → <https://de.wikipedia.org/wiki/Aussagenlogik> — 18.01.2018 32, 59
- [30] Wikipedia: *Aussagenlogik Kapitel 4 Formaler Zugang* → [https://de.wikipedia.org/wiki/Aussagenlogik#Formaler\\_Zugang](https://de.wikipedia.org/wiki/Aussagenlogik#Formaler_Zugang) — 18.01.2018 28
- [31] Wikipedia: *Funktion (Mathematik) Kapitel 2.1 Mengentheoretische Definition* → [https://de.wikipedia.org/wiki/Funktion\\_\(Mathematik\)#Mengentheoretische\\_Definition](https://de.wikipedia.org/wiki/Funktion_(Mathematik)#Mengentheoretische_Definition) — 27.01.2018 19
- [32] Wikipedia: *Hilbert-Kalkül Kapitel 1.4 Modus (ponendo) ponens* → [https://de.wikipedia.org/wiki/Hilbert-Kalk%C3%BCl#Modus\\_\(ponendo\)\\_ponens](https://de.wikipedia.org/wiki/Hilbert-Kalk%C3%BCl#Modus_(ponendo)_ponens) — 18.06.16 27
- [33] Wikipedia: *Ableitung (Logik)* → [https://de.wikipedia.org/wiki/Ableitung\\_\(Logik\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Ableitung_(Logik)) — 20.02.2018 58
- [34] Wikipedia: *Aussage (Logik)* → [https://de.wikipedia.org/wiki/Aussage\\_\(Logik\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Aussage_(Logik)) — 11.03.2018 14, 58
- [35] Wikipedia: *Element (Mathematik)* → [https://de.wikipedia.org/wiki/Element\\_\(Mathematik\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Element_(Mathematik)) — 09.01.2016 60
- [36] Wikipedia: *Identität (Logik) Kapitel 2.3 Identität in der Informatik* → [https://de.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A4t\\_\(Logik\)#Identit.C3.A4t\\_in\\_der\\_Informatik](https://de.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A4t_(Logik)#Identit.C3.A4t_in_der_Informatik) — 18.05.2017 16
- [37] Wikipedia: *Junktor Kapitel 2.2 Mögliche Junktoren* → [https://de.wikipedia.org/wiki/Junktor#M.C3.B6gliche\\_Junktoren](https://de.wikipedia.org/wiki/Junktor#M.C3.B6gliche_Junktoren) — 21.10.2017 28
- [38] Wikipedia: *Kalkül* → <https://de.wikipedia.org/wiki/Kalk%C3%BCl> — 26.02.2017 11

- [39] Wikipedia: *Konstante (Logik)* → [https://de.wikipedia.org/wiki/Konstante\\_\(Logik\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Konstante_(Logik)) — 20.01.2016 62
- [40] Wikipedia: *Logik* → <https://de.wikipedia.org/wiki/Logik> — 28.01.2018 62
- [41] Wikipedia: *Menge* → [https://de.wikipedia.org/wiki/Menge\\_\(Mathematik\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Menge_(Mathematik)) — 07.03.2018 62
- [42] Wikipedia: *Mengenlehre* → <https://de.wikipedia.org/wiki/Mengenlehre> — 17.01.2018 33, 63
- [43] Wikipedia: *Prädikatenlogik* → <https://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4dikatenlogik> — 01.03.2018 33, 64
- [44] Wikipedia: *Prädikatenlogik erster Stufe*  
→ [https://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4dikatenlogik\\_erster\\_Stufe](https://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4dikatenlogik_erster_Stufe) — 26.11.2017
- [45] Wikipedia: *Relation (Mathematik) Kapitel 1.1 Mehrstellige Relation*  
→ [https://de.wikipedia.org/wiki/Relation\\_\(Mathematik\)#Mehrstellige\\_Relation](https://de.wikipedia.org/wiki/Relation_(Mathematik)#Mehrstellige_Relation) — 27.01.2018 19
- [46] Wikipedia: *Schlussregel* → <https://de.wikipedia.org/wiki/Schlussregel> — 29.03.2015 12, 23
- [47] Wikipedia: *Signatur (Modelltheorie)*  
→ [https://de.wikipedia.org/wiki/Signatur\\_\(Modelltheorie\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Signatur_(Modelltheorie)) — 04.03.2018 65
- [48] Wikipedia: *Systeme natürlichen Schließens*  
→ [https://de.wikipedia.org/wiki/Systeme\\_nat%C3%BCrlichen\\_Schlie%C3%9Fens](https://de.wikipedia.org/wiki/Systeme_nat%C3%BCrlichen_Schlie%C3%9Fens) — 25.10.2017 12, 23, 34, 35, 36, 37, 40
- [49] Wikipedia: *Tupel* → <https://de.wikipedia.org/wiki/Tupel> — 17.12.2017
- [50] Wikipedia: *Variable (Mathematik)*  
→ [https://de.wikipedia.org/wiki/Variable\\_\(Mathematik\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Variable_(Mathematik)) — 08.03.2018 66
- [51] Wikipedia: *Wahrheitswert* → <https://de.wikipedia.org/wiki/Wahrheitswert> — 03.07.2017 14, 66

## Index

### A

ableitbar [24, 25, 34, 53, 58, 59](#)  
 Ableitung [24, 25, 27, 37, 39, 41, 47, 58, 60, 66](#)  
 Ableitungsmenge [25, 58, 60, 66](#)  
 Ableitungsrelation [22, 24, 53, 58](#)  
 Abtrennungsregel [37, 55, 58](#)  
 Äquivalenzrelation [58](#)  
 Alphabet [35, 55, 58](#)  
 Äquivalenz [16, 29, 53, 58](#)  
 ASBA [58](#)  
 atomar [15, 17, 58, 65, 67](#)  
 Ausgabeschema [11, 58](#)  
 Aussage [11, 14, 15, 17, 25, 29, 35, 38, 39, 41, 58, 59, 62, 64, 65, 67](#)  
 Aussagenlogik [23, 27–29, 31, 32, 56, 59, 62, 64](#)  
 Axiom [5, 11, 24, 57, 59, 63](#)  
 Axiomensystem [32, 59](#)

### B

Basisregel [34, 59, 61](#)  
 Baustein [59](#)  
 beschränkt [25, 26, 59](#)  
 Beweis [4, 5, 7, 9–12, 21, 23, 26, 27, 30, 37, 38, 40, 42, 43, 55, 59, 60, 66](#)  
 beweisbar [24, 34, 53, 58, 59](#)  
 Beweisschritt [27, 55, 59](#)  
 Beweisschrittfolge [27, 59](#)  
 Beweisschrittmenge [27, 59](#)  
 binär [59, 66](#)

### D

logische Darstellung [12, 59](#)  
 Definition [17, 22, 31, 53, 59, 63](#)  
 Definitionsbereich [19, 57, 59, 61, 64](#)  
 Dummy [4, 60](#)

### E

echt [60](#)  
 Eigenschaft, interessierende [60](#)  
 Element [60, 62](#)  
 Elementoperation [60](#)  
 Elementrelation [60](#)  
 Ergebnis [56, 60](#)  
 Ergebnismenge [60](#)  
 Ersetzung [22, 34–36, 38, 39, 53, 55, 60, 61, 66, 67](#)  
 Ersetzungsmenge [60](#)

### F

Fachbegriff [5, 11, 60](#)  
 Fachgebiet [5, 6, 11, 42, 60, 64](#)  
 Folge [12, 18, 56, 60–62](#)  
 -, leere [60](#)  
 Folgerung [25, 27, 38–40, 55, 60](#)  
 Folgerungsmenge [60](#)  
 Formationsregel [60](#)  
 Formel [16, 18, 21, 24, 27, 35, 58–61, 63–67](#)  
 -, allgemeingültige [61](#)  
 -, aussagenlogische [61](#)  
 Formelmenge [23, 24, 31, 32, 56, 61, 65, 67](#)  
 Funktion [19, 20, 55–57, 59–61, 64–67](#)  
 Funktionswert [19, 61](#)

### G

Gleichheit [16, 53, 54, 61](#)  
 Gleichheitsrelation [22, 58, 61, 62, 66](#)  
 Graph [19, 56, 61](#)

### I

Identitätsregel [61](#)

### J

Junktor [20, 29, 31, 53, 54, 56, 59, 61](#)  
 -, binärer [61](#)  
 -, unärer [61](#)  
 Junktorsymbol [61](#)

### K

Klammerung [30, 56, 61](#)  
 Komponente [61](#)  
 Konstante [61, 62, 66](#)  
 -, aussagenlogische [61](#)  
 Kontraposition [41, 47, 62](#)  
 Kontravalenz [16, 29, 62](#)

### L

Logik [5, 58, 59, 62, 64, 65](#)

### M

Menge [56, 60, 62, 63](#)  
 -, leere [62](#)  
 Mengenlehre [5, 29, 33, 60, 63, 64](#)  
 Mengenoperation [63](#)  
 Mengenrelation [63](#)

Metadefinition 17, 22, 53, 59, 63

Metaformel 63

Metajunktor 63

Metaoperation 53, 63

Metarelation 53, 63

Metasprache 13, 14, 63

-, formale 63

Metasymbol 14, 63–65

Metavariable 63

Monotonieregel 34, 35, 55, 63

## N

Negation 20, 63

Notation, Polnische 63

## O

Oberaussage 64

Objekt 16–18, 60, 63, 64

Objektart 16, 58, 64, 66

Objektformel 64

Objektsprache 13, 14, 63, 64

Objektsymbol 14, 17, 63–65

Operation 16, 20–22, 29, 53, 59, 61, 63, 64, 66

Operationssymbol 64

## P

Potenzmenge 23, 56, 64

Prädikatenlogik 23, 27, 28, 33, 59, 62, 64

Prädikat 64

## Q

Quellbereich 55, 59, 64

## R

Relation 19–21, 24, 53, 55–61, 63–66

## S

Satz 4, 5, 11, 34, 64

-, formaler 64

Schlussregel 23–27, 34, 35, 37–40, 54, 55, 58–60, 63, 64, 66

-, allgemeingültige 64

Schlussregelmenge 64

Schnittregel 37–39, 47, 55, 65

Signatur 65

-, Boolesche 65

-, logische 65

Sprache 14, 18, 26, 27, 55, 56, 61, 63, 65, 67

-, aussagenlogische 65

Sprachebene 65

Stelligkeit 19, 57, 59, 65, 66

Symbol 17, 18, 55, 57, 61, 63–65, 67

-, zusammengesetztes 65

## T

Trägermenge 55, 65

Tupel 18, 19, 23, 26, 56, 57, 60–62, 64, 65

Tupelmenge 23, 57, 65

## U

Umkehrrelation 19, 20, 53, 65

Umwandlung 57, 60, 65–67

-, zulässige 66

Umwandlungsfolge 27, 66

Umwandlungsregel 66

unär 59, 66

Ungleichheit 16, 17, 66

## V

Variable 62, 63, 66

vergleichbar 16, 66

Vertauschung 32, 35, 36, 53, 66

Voraussetzung 25, 27, 38–40, 57, 66

Voraussetzungsmenge 66

## W

Wahrheitswert 14, 16, 28, 53–55, 57, 59, 60, 66

Wertebereich 57, 66, 67

Wikipedia 14, 32, 33, 58–60, 62–66

Wort 18, 67

## Y

YYY 67

-, XXX 67

## Z

Zahl, natürliche 67

Zeichenfolge 16, 18, 61, 67

Zeichenkette 16, 18, 31, 67

zerlegbar 15, 17, 30, 58, 65, 67

Ziel 7, 67

Zielbereich 20, 56, 61, 66, 67

zulässig 60, 65, 67

## Symbole

- # Dummy Symbol für das Symbolverzeichnis 4,
- $\ominus$  Beispielsymbol für eine unäre [Operation](#) . 20, 21, 22, 30,
- $\otimes$  Beispielsymbol für eine binäre [Operation](#) . 20, 21, 22, 30, , 64
- $<$  Beispielsymbol für eine binäre [Relation](#) mit [Umkehrrelation](#)  $>$ . 20, 21, 22, 47, , 53, 58
- $\leq$  Beispielsymbol für eine binäre [Relation](#) mit [Gleichheit](#) und [Umkehrrelation](#)  $\geq$ . 20, 21, 22, 47, , 53
- $>$  Beispielsymbol für eine binäre [Relation](#) mit [Umkehrrelation](#)  $<$ . 20, 22, , 53
- $\geq$  Beispielsymbol für eine binäre [Relation](#) mit [Gleichheit](#) und [Umkehrrelation](#)  $\leq$ . 20, 22, , 53
- $\nmid$  Verneinung von  $<$ . 20, 22,
- $\nmid$  Verneinung von  $\leq$ . 20, 22,
- $\nmid$  Verneinung von  $>$ . 20,
- $\nmid$  Verneinung von  $\geq$ . 20,
- $\sim$  Eine unäre [Metaoperation](#) : ... *gilt nicht*. 15, 20, 22, , *siehe*  $\neg$
- $\&$  Eine [Metaoperation](#) : ... *und* ... 15, 16, 20–22, 24, 25, 34, , 58, 63, *siehe*  $\wedge$
- $\parallel$  Eine [Metaoperation](#) : ... *oder* ... 15, 20, 22, , 63, *siehe*  $\vee$
- $\Rightarrow$  Eine [Metarelation](#) : ... *dann auch* ..., die [Umkehrrelation](#) zu  $\Leftarrow$ . 15, 16, 22, 24, 25, 30, , 53, 58, 63, *siehe*  $\rightarrow$
- $\Leftarrow$  Eine [Metarelation](#) : ... *sofern* ..., die [Umkehrrelation](#) zu  $\Rightarrow$ . 15, 22, , 53, 63, *siehe*  $\leftarrow$
- $\Leftrightarrow$  Eine [Metarelation](#) : ... *genau dann wenn* ... 15, 16, 20, 22–24, 26, 31, 32, , 63, *siehe*  $\leftrightarrow$
- $=$  Eine [Metarelation](#) : ... *ist gleich* (dasselbe wie; identisch zu) ... 16, 20–23, 26, 31, 35, 36, , 61, 66, *siehe*  $=$  & [Gleichheit](#)
- $\neq$  Eine [Metarelation](#) : ... *ist ungleich* (nicht dasselbe wie, nicht identisch zu) ... 16, 20, 22, , 61, 66, *siehe*  $\neq$
- $\equiv$  Eine [Metarelation](#) : ... *äquivalent* (so wie; ähnlich) ... 16, 22, , 58, 61, 62, *siehe* [Äquivalenz](#)
- $\not\equiv$  Eine [Metarelation](#) : ... *nicht äquivalent* (nicht so wie; nicht ähnlich) ... 16, 22, , 61, 62, *siehe* [Äquivalenz](#)
- $:\Leftrightarrow$  [Metadefinition](#) : ... *definitionsgemäß genau dann wenn* ... 15, 17, 19, 20, 22, 24, 31, 34, , 63
- $:=$  [Definition](#) : ... *definitionsgemäß gleich* (dasselbe wie; identisch zu) ... 17, 19, 20, 22, 23, 26–28, 30–32, 34–36, 38, , 59
- $\mid$  Eine [Metaoperation](#) (nur für Schlussregeln): ... *und* ... 16, 22, 24, 26, 34–41, , 63, *siehe*  $\&$  &  $\wedge$
- $\vdash$  [Ableitungsrelation](#) : ... *ableitbar* (*beweisbar*) ... 22, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 37, 39, 41, , 58, *siehe*  $\vdash_R$
- $\vdash_R$  Eine Darstellung der [Relation](#)  $R$  aus  $\mathfrak{A}(\mathfrak{P}(\mathcal{L}))$  als [Ableitungsrelation](#) . 23, 24, 25, , 58
- $\leftarrow$  [Ersetzung](#) : ... *substituiert durch* ... 22, 34, 35, 36, 39, 41,
- $\leftrightarrow$  [Vertauschung](#) : ... *vertauscht mit* ... 22, 35, 36, 41, , 66
- $\perp$  Ein 0-stelliger [Junktor](#) , d. h. eine aussagenlogische Konstante mit dem [Wahrheitswert falsch](#). 14, 28, 29, 31, , *siehe* [false](#)



$\top$	Ein 0-stelliger <b>Junktor</b> , d. h. eine aussagenlogische Konstante mit dem Wahrheitswert <i>wahr</i> . 14, 28, 29, 31, , siehe <i>true</i>
$\neg$	Ein unärer <b>Junktor</b> : <i>nicht</i> ... 15, 22, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 41, , 55, 62, 65, siehe $\sim$
$\wedge$	Ein binärer <b>Junktor</b> : ... <i>und</i> ... 15, 22, 23, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 41, , 54, 55, 65, siehe $\uparrow$ & $\&$
$\vee$	Ein binärer <b>Junktor</b> : ... <i>oder</i> ... 15, 22, 28, 29, 31, 32, , 55, 65, siehe $\downarrow$ , $+$ & $\parallel$
$\rightarrow$	Ein binärer <b>Junktor</b> : <i>aus</i> ... <i>folgt</i> ... 21, 22, 24, 26–28, 29, 31, 32, 34, 37, 41, , 55, 62, siehe $\Rightarrow$
$\leftarrow$	Ein binärer <b>Junktor</b> : ... <i>folgt aus</i> ... 22, 28, 29, 31, 32, , siehe $\Leftarrow$
$\leftrightarrow$	Ein binärer <b>Junktor</b> : ... <i>genau dann wenn</i> ... 22, 28, 29, 31, , siehe $\Leftrightarrow$
$\uparrow$	Ein binärer <b>Junktor</b> : <i>nicht zugleich</i> ... <i>und</i> ... 22, 28, 29, 31, 32, , siehe $\wedge$
$\downarrow$	Ein binärer <b>Junktor</b> : <i>weder</i> ... <i>noch</i> ... 22, 28, 29, 31, 32, , siehe $\vee$ & $+$
$+$	Ein binärer <b>Junktor</b> : <i>entweder</i> ... <i>oder</i> ... 22, 28, 29, 31, , siehe $\vee$ & $\downarrow$
$=$	Logische Gleichheit: ... <i>gleich</i> ... , 55, siehe $=$
$\neq$	Logische Ungleichheit: ... <i>ungleich</i> ... 25, , siehe $\neq$
$\in$	Eine Elementrelation: ... <i>ist Element aus</i> (der Menge) ... 17, 22, , 56, 60
$\ni$	Eine Elementrelation: ... <i>ist Element aus</i> (der Menge) ... 17, 22,
$\notin$	Eine Elementrelation: ... <i>ist kein Element aus</i> (der Menge) ... 17,
$\nexists$	Eine Elementrelation: ... <i>ist kein Element aus</i> (der Menge) ... 17,
$\subset$	Eine Mengenrelation: (die Menge) ... <i>ist echte Teilmenge von</i> (der Menge) ... Es kann keine <b>Gleichheit</b> bestehen. In der Literatur wird $\subset$ oft im Sinne von $\subseteq$ verwendet. 4, 17, 22, 23, 30, , 54
$\subseteq$	Eine Mengenrelation: (die Menge) ... <i>ist Teilmenge von</i> (der Menge) ... Es kann <b>Gleichheit</b> bestehen. 17, 19, 22, 23, 25–27, 30, , 54, 55, 58, 64
$\not\subset$	Eine Mengenrelation: (die Menge) ... <i>ist keine echte Teilmenge von</i> (der Menge) ... Es kann aber <b>Gleichheit</b> bestehen. 17,
$\not\subseteq$	Eine Mengenrelation: (die Menge) ... <i>ist keine Teilmenge von</i> (der Menge) ... Es kann auch keine <b>Gleichheit</b> bestehen. 17,
$\supset$	Eine Mengenrelation: (die Menge) ... <i>ist echte Obermenge von</i> (der Menge) ... Es kann keine <b>Gleichheit</b> bestehen. In der Literatur wird $\supset$ oft im Sinne von $\supseteq$ verwendet. 17, 22, , 54
$\supseteq$	Eine Mengenrelation: (die Menge) ... <i>ist Obermenge von</i> (der Menge) ... Es kann <b>Gleichheit</b> bestehen. 17, 22, 34, , 54
$\not\supset$	Eine Mengenrelation: (die Menge) ... <i>ist keine echte Obermenge von</i> (der Menge) ... Es kann aber <b>Gleichheit</b> bestehen. 17,
$\not\supseteq$	Eine Mengenrelation: (die Menge) ... <i>ist keine Obermenge von</i> (der Menge) ... Es kann auch keine <b>Gleichheit</b> bestehen. 17,
$\cap$	Eine Mengenoperation: (die Menge) ... <b>geschnitten mit</b> (der Menge) ... — der <b>Durchschnitt</b> zweier Mengen
$\cup$	Eine Mengenoperation: (die Menge) ... <b>vereinigt mit</b> (der Menge) ... — die <b>Vereinigung</b> zweier Mengen
$\setminus$	Eine Mengenoperation: (die Menge) ... <b>ohne</b> (die Menge) ... — die <b>Differenz</b> zweier Mengen
$(\wedge B)$	Eine <b>Schlussregel</b> : Beseitigung von $\wedge$ . 35, 37,



$(\wedge E)$	Eine <a href="#">Schlussregel</a> : Einführung von $\wedge$ . <a href="#">35</a> , <a href="#">37</a> , <a href="#">41</a> ,
$(\vee B)$	Eine <a href="#">Schlussregel</a> : Beseitigung von $\vee$ .
$(\vee E)$	Eine <a href="#">Schlussregel</a> : Einführung von $\vee$ .
$(\rightarrow B)$	Eine <a href="#">Schlussregel</a> : Beseitigung von $\rightarrow$ . <a href="#">37</a> ,
$(\rightarrow E)$	Eine <a href="#">Schlussregel</a> : Einführung von $\rightarrow$ . <a href="#">37</a> ,
$(\neg 1)$	Eine <a href="#">Schlussregel</a> : Einführung/Beseitigung von $\neg$ Teil 1. <a href="#">35</a> , <a href="#">37</a> , <a href="#">39</a> , <a href="#">41</a> ,
$(\neg 2)$	Eine <a href="#">Schlussregel</a> : Einführung/Beseitigung von $\neg$ Teil 2. <a href="#">35</a> , <a href="#">37</a> , <a href="#">39</a> ,
$(\neg 3)$	Eine <a href="#">Schlussregel</a> : Beweistechnik "Indirekter <a href="#">Beweis</a> ". <a href="#">37</a> ,
$(\neg 4)$	Eine <a href="#">Schlussregel</a> : Reductio ad absurdum (Indirekter <a href="#">Beweis</a> ). <a href="#">37</a> ,
$(= B)$	Eine <a href="#">Schlussregel</a> : Beseitigung von $=$ . <a href="#">36</a> ,
$(= E)$	Eine <a href="#">Schlussregel</a> : Einführung von $=$ . <a href="#">36</a> ,
$(AR)$	Eine <a href="#">Schlussregel</a> : <a href="#">Anfangsregel</a> . <a href="#">35</a> , <a href="#">37</a> , <a href="#">39</a> , , <a href="#">58</a>
$(FS)$	Eine <a href="#">Schlussregel</a> : <a href="#">formaler Satz</a> . <a href="#">26</a> ,
$(MR)$	Eine <a href="#">Schlussregel</a> : <a href="#">Monotonieregel</a> . <a href="#">35</a> , <a href="#">37</a> , <a href="#">39</a> ,
$(SR)$	Eine <a href="#">Schlussregel</a> : <a href="#">Schnittregel</a> . <a href="#">37</a> ,
$(TR)$	Eine <a href="#">Schlussregel</a> : <a href="#">Abtrennungsregel</a> . <a href="#">37</a> ,
$\mathcal{A}$	Das Alphabet der aussagenlogischen <a href="#">Sprache</a> . <a href="#">30</a> , , <a href="#">55</a>
$\mathcal{A}_x$	Eine Teilmenge des Alphabets $\mathcal{A}$ der aussagenlogischen <a href="#">Sprache</a> . <a href="#">30</a> ,
$b$	Ein <a href="#">Beweisschritt</a> . <a href="#">27</a> ,
$\mathcal{B}$	Eine Menge von <a href="#">Beweisschritten</a> . <a href="#">27</a> ,
$\vec{b}$	Eine Menge von <a href="#">Beweisschritten</a> . <a href="#">27</a> ,
$C$	Eine <a href="#">Schlussregel</a> . <a href="#">26</a> ,
$\mathcal{C}$	Eine Menge von <a href="#">Schlussregeln</a> . <a href="#">26</a> , <a href="#">27</a> , , <a href="#">64</a>
car	$\text{car}_i(R)$ für $R \subseteq A_1 \times \dots \times A_n$ ist die <a href="#">Trägermenge</a> $A_i$ für $i$ von 1 bis $n$ . <a href="#">19</a> , , <a href="#">55</a> , siehe <a href="#">Trägermenge</a> & <a href="#">Relation</a>
dom	$\text{dom}(f)$ für $f : A \rightarrow B$ ist die Menge $A$ <a href="#">19</a> , , <a href="#">55</a> , siehe <a href="#">Quellbereich</a> & <a href="#">Funktion</a>
$E$	Ein <a href="#">Ersetzung</a> . <a href="#">26</a> , <a href="#">27</a> , , siehe $\mathcal{E}$
$\mathcal{E}$	Eine Menge von <a href="#">Ersetzungen</a> . <a href="#">26</a> , <a href="#">27</a> , , <a href="#">60</a> , siehe $E$
$f$	Eine <a href="#">Folgerung</a> . <a href="#">26</a> , , <a href="#">65</a>
$\mathcal{F}$	Eine Menge von <a href="#">Folgerungen</a> . <a href="#">25–27</a> , , <a href="#">60</a> , <a href="#">64–66</a>
$\vdash_{\mathcal{F}}$	Eine Relation (als Menge aufgefasst) von <a href="#">Folgerungen</a> . <a href="#">27</a> , , <a href="#">60</a>
false	Der metasprachliche <a href="#">Wahrheitswert</a> <i>falsch</i> als <a href="#">Symbol</a> . <a href="#">14</a> , <a href="#">19</a> , <a href="#">20</a> , , siehe $\perp$ & <a href="#">true</a>

graph	$\text{graph}(R)$ ist der Graph der Funktion bzw. Relation $R$ . 19, , 56, siehe Funktion , Relation & Graph
$\mathcal{J}$	Die Menge der Junktorsymbole. 30, 31, 32, , 56, 65, siehe Junktor
$\mathcal{J}_b$	Die Menge der binären Junktoren. 28, 30,
$\mathcal{J}_c$	Die Menge der aussagenlogischen Konstanten. 28, 30, , 61
$\mathcal{J}_u$	Die Menge der unären Junktoren. 28, 30,
$\mathcal{J}_x$	Eine Teilmenge der Menge $\mathcal{J}$ der Junktorsymbole. 30,
$\mathcal{L}$	Eine Sprache . 18, 23–27, , 53, 58, 61, siehe Formelmenge
$\mathcal{L}^A$	Eine Formelmenge : Die Menge der aussagenlogischen Formeln mit Klammerung . 30, 32, , 56, 61
$\mathcal{L}_x^A$	Eine Formelmenge : Eine Teilmenge der Menge $\mathcal{L}^A$ der aussagenlogischen Formeln mit Klammerung . 30, 31, 32,
$\mathcal{L}^{Ap}$	Eine Formelmenge : Die Menge der aussagenlogischen Formeln in Polnischer Notation. 30, , 56
$\mathcal{L}_x^{Ap}$	Eine Formelmenge : Eine Teilmenge der Menge $\mathcal{L}^{Ap}$ der aussagenlogischen Formel in Polnischer Notation. 30,
len	$\text{len}(\vec{a})$ ist die Länge, d. h. die Anzahl der Komponenten einer Folge bzw. eines Tupel s. 19, 23, , 56, siehe Folge & Tupel
$M^0$	$\{()\}$ , wobei $()$ das 0-Tupel ist. 23,
$M^n$	Das kartesische Produkt $M \times \cdots \times M$ aus $n$ Mengen $M$ mit $n \in \mathbb{N}_0$ . 20, 23, , siehe Tupel
$\mathbb{N}$	Die Menge der natürlichen Zahlen ohne 0. 4, 17, 18,
$\mathbb{N}_0$	Die Menge der natürlichen Zahlen (mit 0). 17, 19, 23, 26–28, , 56, 60, 65
$\emptyset$	Die leere Menge, d. h. die einzige Menge ohne Elemente; auch mit $\{\}$ bezeichnet.
$\mathfrak{P}$	Menge der Teilmengen (Potenzmenge). 23, 24–26, , 53, 58, 64, siehe $\mathfrak{P}_e$
$\mathfrak{P}_e$	Menge der endlichen Teilmengen. 23, 26, , siehe $\mathfrak{P}$ & Potenzmenge
$\mathcal{Q}$	Die Menge der aussagenlogischen Variablen $q_i$ für $i \in \mathbb{N}_0$ . 28, 30, , 65, siehe Aussagenlogik
$\mathbf{q}$	Die $q_i \in \text{ObjVar}$ für $i \in \mathbb{N}_0$ sind die aussagenlogischen Variablen. 28, 31, , 56, siehe Aussagenlogik
$\mathfrak{R}$	Menge der binären Relationen. 23, 24–26, , 53, siehe $\mathfrak{R}_e$ & Relation
$\mathfrak{R}_e$	Menge der endlichen binären Relationen. 23, 26, , siehe $\mathfrak{R}$
$e$	Ein Ergebnis . 26,
$\mathcal{E}$	Eine Menge von Ergebnissen. 26, , 60
$\vdash_{\mathcal{E}}$	Eine Relation (aufgefasst als Menge) von Ergebnissen.
ran	$\text{ran}(f)$ für $f : A \rightarrow B$ ist die Menge $\{f(a)   a \in A\}$ . , 56, siehe Zielbereich & Funktion
set	$\text{set}(\vec{a})$ ist die Menge der Komponenten eine Folge bzw. eines Tupel s. 19, 23, 24, 26, , 56, siehe Folge & Tupel

$\text{src } \text{src}(f)$  für  $f : A \rightarrow B$  ist die Menge  $\{a \in A \mid f(a) \text{ existiert}\}$ . , 57, siehe [Definitionsbereich](#) & [Funktion](#)  
 $\text{stel}_f$  [Stelligkeit](#) einer [Funktion](#) . 19, , siehe [Funktion](#) &  $\text{stel}_r$   
 $\text{stel}_r$  [Stelligkeit](#) einer [Relation](#) . 19, , siehe [Relation](#) &  $\text{stel}_f$   
 $\mathfrak{T}$  Eine Mengenoperation:  $\mathfrak{T}(M)$  ist die Menge aller [Tupel](#) von  $M$ . 23, 26, , 57, 65, siehe [Tupelmenge](#)  
 $T$  Eine [Umwandlung](#) . 27,  
 $\mathcal{T}$  Eine Menge von [Umwandlungen](#). 27,  
 $\text{tar } \text{tar}(f)$  für  $f : A \rightarrow B$  ist die Menge  $B$  20, , 57, siehe [Wertebereich](#) & [Funktion](#)  
 $\text{true}$  Der metasprachliche [Wahrheitswert](#) *wahr* als [Symbol](#) . 14, 19, 20, 25, , siehe  $\top$  & *false*  
 $v$  Eine [Voraussetzung](#) . 26, 27, , 60, 65, 66  
 $\mathcal{V}$  Eine Menge von [Voraussetzungen](#). 25–27, , 60, 64–66  
 $\vdash_v$  Eine Relation (aufgefasst als Menge) von [Voraussetzungen](#). , 66  
 $X$  Ein [Axiom](#) .  
 $\mathcal{X}$  Eine Menge von [Axiomen](#). 27,

## Glossar

[A](#) | [B](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [Y](#) | [Z](#)

### A

**ableitbar** Synonym zu [beweisbar](#) — Wenn sich eine [Formel](#)  $\beta$  aus einer anderen [Formel](#)  $\alpha$  mittels [zulässiger Umwandlungen](#) ableiten lässt, heißt  $\beta$  **ableitbar** aus  $\alpha$ . Sprechweise:  $\langle\langle \alpha$  ableitbar  $\beta \rangle\rangle$ . Eine oder beide [Formeln](#)  $\alpha$  bzw.  $\beta$  dürfen dabei durch [Formelmengen](#) ersetzt werden. [24](#), [25](#), [34](#), [53](#), [58](#), [59](#), [siehe](#) [Ableitungsrelation](#)

**Ableitung** [Wikipedia](#) [[33](#)] schreibt dazu (Zitat ohne Fußnote und Verweise ins Internet):

Eine **Ableitung**, **Herleitung**, oder Deduktion ist in der Logik die Gewinnung von Aussagen aus anderen Aussagen. Dabei werden Schlussregeln auf Prämissen angewandt, um zu Konklusionen zu gelangen. Welche Schlussregeln dabei erlaubt sind, wird durch das verwendete Kalkül bestimmt.

Eine [Aussage](#)  $A \vdash B$  bzw. allgemeiner  $A \vdash_R B$  mit  $A, B \subseteq \mathcal{L}$ . Dies entspricht einem Element  $(A, B)$  einer [Ableitungsrelation](#)  $\vdash$  bzw.  $\vdash_R$  (d. h.  $(A, B) \in R$ ). Die semantische Aussage ist die, dass die [Formeln](#) aus  $B$  aus den [Formeln](#) aus  $A$  abgeleitet werden können. [23](#), [24](#), [25](#), [26](#), [27](#), [37](#), [39](#), [41](#), [47](#), [58](#), [60](#), [66](#), [siehe](#) [Ableitungsmenge](#), [Ableitungsrelation](#), [Aussage](#), [Logik](#), & [Schlussregel](#)

**Ableitungsmenge** Eine Menge von [Ableitungen](#), letztlich nichts anderes als eine [Ableitungsrelation](#). [25](#), [60](#), [66](#)

**Ableitungsrelation** Eine binäre [Relation](#)  $\vdash$  aus  $\mathfrak{P}(\mathcal{L})^2$ . Für  $R \in \mathfrak{P}(\mathcal{L})^2$  auch mit  $\vdash_R$  bezeichnet. [22](#), [24](#), [53](#), [58](#), [siehe](#) [Ableitung](#)

**Abtrennungsregel** Eine [Schlussregel](#). [37](#), [55](#), [siehe](#) (TR)

**Äquivalenz** Eine [Gleichheitsrelation](#): Zwei Objekte  $A$  und  $B$  sind *äquivalent*<sup>3)</sup>,  $A \equiv B$ , wenn sie in den [interessierenden Eigenschaften](#) für  $\equiv$  übereinstimmen. [16](#), [29](#), [siehe](#)  $\equiv$

**Äquivalenzrelation** Eine binäre [Relation](#)  $<$  auf einer Menge  $M$  mit folgenden Eigenschaften:

**reflexiv**:  $a < a$

**transitiv**:  $((a < b) \& (b < c)) \Rightarrow (a < c)$

**symmetrisch**:  $(a < b) \Rightarrow (b < a)$

jeweils für alle Elemente  $a, b$  und  $c$  aus  $M$ . [16](#)

**Anfangsregel** Die [Schlussregel](#) (AR) um anfangen zu können. [35](#), [55](#)

**ASBA** ist ein Akronym für "Axiome, Sätze, Beweise und Auswertungen". Es bezeichnet das in diesem Dokument beschriebene Programmsystem, das zu eingegebenen [Axiomen](#), [Sätzen](#) und [Beweisen](#) letztere prüft, Auswertungen generiert und unter Zuhilfenahme gegebener [Ausgabeschemata](#) eine Ausgabe im  $\text{\LaTeX}$ -Format in mathematisch üblicher Schreibweise mit [Formeln](#) erstellt. [1](#), [4](#), [5](#), [6–8](#), [10–13](#), [21](#), [23](#), [25–28](#), [42](#), [43](#), [47](#), [67](#)

**atomar** Das Attribut **atomar** kann auf [Aussagen](#), [Formeln](#) und [Symbole](#) angewendet werden. [Atomar](#) sind solche, die keine echten [Unterobjekte](#) gleicher [Objektart](#) enthalten. [15](#), [17](#), [18](#), [30](#), [58](#), [61](#), [65](#), [siehe](#) [zerlegbar](#)

**Ausgabeschema** Ein Schema, mit dem bestimmte mathematische [Objekte](#) ausgegeben werden sollen. [1](#), [7](#), [10](#), [11](#), [42](#), [44](#), [46](#), [58](#)

**Aussage** [Wikipedia](#) [[34](#)] schreibt dazu (Zitat ohne Verweise ins Internet):

<sup>3)</sup> alternativ: **ähnlich**

Eine **Aussage** im Sinn der aristotelischen Logik ist ein sprachliches Gebilde, von dem es sinnvoll ist zu *fragen*, ob es wahr oder falsch ist (so genanntes Aristotelisches Zweitwertigkeitsprinzip). Es ist nicht erforderlich, *sagen* zu können, ob das Gebilde wahr oder falsch ist. Es genügt, dass die Frage nach Wahrheit („Zutreffen“) oder Falschheit („Nicht-Zutreffen“) sinnvoll ist, – was zum Beispiel bei Fragesätzen, Ausrufen und Wünschen nicht der Fall ist. Aussagen sind somit Sätze, die Sachverhalte beschreiben und denen man einen Wahrheitswert zuordnen kann.

11–13, 14, 15, 17, 18, 25, 26, 28, 29, 35, 38–41, 58, 59, 62–65, 67

**Aussagenlogik** Wikipedia [29] schreibt dazu (Zitat ohne Verweise ins Internet):

Die **Aussagenlogik** ist ein Teilgebiet der Logik, das sich mit Aussagen und deren Verknüpfung durch Junktoren befasst, ausgehend von strukturlosen Elementaraussagen (Atomen), denen ein Wahrheitswert zugeordnet wird. In der *klassischen Aussagenlogik* wird jeder Aussage genau einer der zwei Wahrheitswerte „wahr“ und „falsch“ zugeordnet. Der Wahrheitswert einer zusammengesetzten Aussage lässt sich ohne zusätzliche Informationen aus den Wahrheitswerten ihrer Teilaussagen bestimmen.

23, 27–29, 31, 32, , 64, siehe Aussage , Junktor , Logik , Prädikatenlogik & Wahrheitswert

**Axiom** Eine **Formel** , die unbewiesen als wahr angesehen wird. 1, 4–7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 35, 36, 42, 43, 45, 57–61, siehe  $X$  &  $\mathcal{X}$

**Axiomensystem** Eine Menge von **Axiomen**. 32,

## B

**Basisregel** Eine **Schlussregel** , die nicht mehr auf andere zurückgeführt wird. Obwohl das auch auf die **Identitätsregeln** zutrifft, werden diese hier aber nicht dazu gezählt. 34–37, 39, 47, 61, 64

**Baustein** >>> Beschreibung fehlt noch <<< 12

**beschränkt** Eine **Schlussregel** heißt **beschränkt** , wenn sie nur endlich viele Voraussetzungen und Folgerungen hat. 25, 26, 59

**beweisbar** Synonym zu **ableitbar** . 24, 34, , 53, 58

**Beweis** Eine zulässige Ableitung von **Folgerungen** aus gegebenen **Voraussetzungen**. 1, 4–10, 11, 12, 13, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 37, 38, 40, 42–44, 46, 55, 58, 60, 61, 66

**Beweisschritt** Eine Vorschrift, wie aus vorgegebenen **Aussagen** (den **Voraussetzungen**) weitere (die **Folgerungen**) folgen. 4, 11, 13, 21, 27, 39, 55, 59, siehe  $b$ ,  $B$  &  $\vec{b}$

**Beweisschrittfolge** Eine Folge von **Beweisschritten**. 27, , 59

**Beweisschrittmenge** Eine Menge von **Beweisschritten**, insbesondere die Menge der Glieder einer **Beweisschrittfolge** . 27,

**binär** Eine **Operation** , **Funktion** oder **Relation** heißt **binär**, wenn ihre **Stelligkeit** gleich 2 ist. , siehe **unär**

## D

**logische Darstellung** >>> Beschreibung fehlt noch <<< 12,

**Definition** Eine Definition mit Hilfe des Symbols  $\langle := \rangle$ .  $\langle\langle A := B \rangle\rangle$  steht für „ $A$  ist definitionsgemäß gleich  $B$ “ für **Objekte**  $A$  und  $B$ . Gewissermaßen ist  $A$  nur eine andere Schreibweise für  $B$ . 17, 21, 22, 31, 34, 53, 61, 63, siehe **Metadefinition**

**Definitionsbereich** einer **Funktion** . 19, , 61, siehe **dom**, **Quellbereich** & **Funktion**

**Dummy** Dummy Begriff für das Glossar 4,

## E

**echt** Attribut für ??? 14, 15, 67

**Eigenschaft, interessierende** Solche Eigenschaften von **Objekten**, die im aktuellen Zusammenhang von Interesse sind, z. B. einen bestimmten Wert zu haben, Element einer bestimmten Menge zu sein, ein bestimmtes **Objekt** zu bezeichnen, usw. 16, 58, 61, 62, 66

**Element** Wikipedia [35] schreibt dazu (Zitat ohne Verweise ins Internet):

Ein **Element** in der Mathematik ist immer im Rahmen der Mengenlehre oder Klassenlogik zu verstehen. Die grundlegende Relation, wenn  $x$  ein Element ist und  $M$  eine Menge oder Klasse ist, lautet:

„ $x$  ist Element von  $M$ “ oder mit Hilfe des Elementzeichens „ $x \in M$ “.

, siehe Menge , Mengenlehre & Relation

**Elementoperation** > > > Beschreibung fehlt noch < < <

**Elementrelation** > > > Beschreibung fehlt noch < < <

**Ergebnis** Eine **Ableitung** : Ein **Ergebnis** eines **Beweis** es. 26, 56, 60, siehe **e**,  $\mathcal{E}$  &  $\vdash_{\mathcal{E}}$

**Ergebnismenge** Eine **Ableitungsmenge** : Die Menge  $\mathcal{E}$  der **Ergebnisse** eines **Beweis** es.

**Ersetzung** Eine **Funktion** zur **Umwandlung** einer **Formel** mittels **Ersetzung** in eine gleichwertige. Die **Ersetzung** heißt **zulässig** , wenn sie vorgegebene Regeln erfüllt. 22, 26, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 53, 55, 60, 61, 66, 67

**Ersetzungsmenge** Eine Menge von **Ersetzungen**, meistens mit  $\mathcal{E}$  bezeichnet.

## F

**Fachbegriff** Ein Name für einen mathematischen Begriff. 5, 6–8, 11, 42–44, 46, 60

**Fachgebiet** Ein Teil der Mathematik mit einer zugehörigen Basis aus **Axiomen**, **Sätzen**, **Fachbegriffen** und Darstellungsweisen. 5, 6–8, 11, 42–44, 46, 64

**falsch** Ein metasprachlicher **Wahrheitswert** in Textform. 14, 19, 29, , 53, 55, siehe *wahr*, *false* &  $\perp$

-, **leere** Eine **Folge** heißt **leer**, wenn ihre Länge 0 ist, d. h. wenn sie keine **Komponenten** besitzt. , 60, siehe **len**, **Folge** & **Tupel**

**Folge** Ein **Folge**<sup>4)</sup>  $\vec{a}$  ist eine Aneinanderreihung von **Komponenten**  $a_i, i \in \mathbb{N}_0$ , geschrieben  $(a_1, a_2, \dots)$ . Sind alle **Komponenten** Elemente einer Menge  $M$ , so heißt  $\vec{a}$  ein **Folge** auf  $M$ . Bricht die **Folge** ab, d. h. gibt es ein  $n \in \mathbb{N}_0$  mit  $\vec{a} = (a_1, \dots, a_n)$ , so heißt die **Folge** **endlich** von der **Länge**  $n$ . Ist die Länge  $n = 0$ , so sprechen wir von der **leeren Folge** und bezeichnen sie mit  $\langle\langle() \rangle\rangle$ . Eine endliche **Folge** der Länge  $n$  heißt auch **n-Tupel** und die leere **Folge** demnach 0-**Tupel** . 12, 18, , 56, 60, 61, siehe **len**, **leere Folge** & **Tupel**

**Folgerung** Eine **Ableitung** : Die **Folgerungen** einer **Schlussregel**  $\frac{\mathcal{V}}{\mathcal{F}}$  bzw.  $\frac{\mathcal{V}}{\mathcal{F}}$  sind die Elemente aus  $\mathcal{F}$  bzw.  $\vdash_{\mathcal{F}}$ . Die **Voraussetzungen** werden normalerweise mit  $\mathbf{v}_i$  bezeichnet. 11, 12, 21, 24, 25, 27, 35, 38–40, 55, 59, 60, 64, 65, siehe **Schlussregel**

**Folgerungsmenge** Eine **Ableitungsmenge** : Die Menge  $\mathcal{F}$  der **Folgerungen** einer **Schlussregel** bzw. eines **Beweis** es.

**Formationsregel** > > > Beschreibung fehlt noch < < < 12

<sup>4)</sup> alternativ: **Sequenz**

- , **allgemeingültige** Eine **Formel** heißt **allgemeingültig**, wenn sie aus den **Axiomen** und **allgemeingültigen Schlussregeln** abgeleitet werden kann. 26
- , **aussagenlogische** Eine **Formel** heißt **aussagenlogisch**, wenn sie ein Element von  $\mathcal{L}^A$  ist. 30, 56
- Formel** Unter einer **Formel** verstehen wir stets eine mathematische **Formel**. Diese kann aus einem einzigen **Symbol** bestehen (**atomare Formel**), andererseits aber auch mehrdimensional sein, lässt sich dann aber mittels geeigneter **Definitionen** immer eindeutig als eine **Zeichenfolge** schreiben. **Sätze**, **Beweise** und **Schlussregeln** betrachten wir *nicht* als **Formeln**. 1, 4, 10, 12–14, 16, 18, 21–28, 30, 31, 34–36, 58–61, 63–67
- Formelmenge** Eine Menge von **Formeln**, oft mit  $\mathcal{L}$  bezeichnet. Man nennt  $\mathcal{L}$  auch eine **Sprache** und ihre Elemente **Wörter**, insbesondere dann, wenn es eindeutige Regeln zur Konstruktion von  $\mathcal{L}$  gibt. Wir bevorzugen "**Formel**" und "**Formelmenge**". 12, 23, 24, 31, 32, 56, 58, 61, 65
- Funktion** Eine  $n$ -stellige **Funktion**  $f$  von einer Menge  $A = A_1 \times \dots \times A_n$ , dem **Definitionsbereich**, in eine Menge  $B$ , den **Zielbereich**, ist eine  $(n+1)$ -stellige **Relation**  $(G, A_1, \dots, A_n, B)$  derart, dass es für jedes  $\vec{a} = (a_1, \dots, a_n)$  mit  $a_i \in A_i$  genau ein  $b \in B$  gibt mit  $(a_1, \dots, a_n, b) \in f$ . Dieses  $b$  wird auch mit  $\langle\langle f(a_1, \dots, a_n) \rangle\rangle$ ,  $\langle\langle f a_1 \dots a_n \rangle\rangle$ ,  $\langle\langle f(\vec{a}) \rangle\rangle$  oder  $\langle\langle f \vec{a} \rangle\rangle$  bezeichnet. Schreibweise:  $\langle\langle f : A \rightarrow B \rangle\rangle$  bzw.  $\langle\langle f : A_1 \times \dots \times A_n \rightarrow B \rangle\rangle$  19, 20, 26, 28, 56, 57, 59–61, 63–67
- Funktionswert** einer **Funktion**. 19,
- G**
- Gleichheit** Eine **Gleichheitsrelation**: Zwei Objekte  $A$  und  $B$  sind *gleich* (dasselbe; identisch),  $A = B$ , wenn sie in den **interessierenden Eigenschaften** für  $=$  übereinstimmen. 16,, 53, 54, 61
- Gleichheitsrelation** Eine mit **Gleichheit** verwandte **Relation**:  $=$ ,  $\neq$ ,  $\equiv$  und  $\not\equiv$ . 16, 22, 58, 61, 62, 66
- Graph** einer **Funktion** oder **Relation**. 19,, 56, *siehe graph*
- I**
- Identitätsregel** Eigentlich eine **Basisregel** zur Identität. Da die **Identitätsregeln** nur zur Rechtfertigung der **Ersetzung** verwendet werden, werden sie hier nicht zu den **Basisregeln** gezählt. 35, 36, 59, 61
- J**
- , **binärer** >>> Beschreibung fehlt noch <<< 28
- , **unärer** >>> Beschreibung fehlt noch <<< 28
- Junktor** Eine aussagenlogische **Operation**. Da die Werte einer aussagenlogischen **Operation** **Wahrheitswerte** sind, kann man einen **Junktor** auch als **Relation** verstehen. 15, 16, 20–22, 28–31, 34, 53, 54, 56, 61
- Junktorsymbol** Ein **Symbol** für einen **Junktor**.<sup>5)</sup> 28, 30, 56
- K**
- Klammerung** >>> Beschreibung fehlt noch <<< 30,, 56
- Komponente** Die **Komponenten** einer **Folge**  $\vec{a} = (a_1, a_2, \dots)$  sind die  $a_i$ .  $a_i$  heißt die  $i$ -te **Komponente** von  $\vec{a}$ . , 56, 60, 61, *siehe Folge & Tupel*
- , **aussagenlogische** Eine **Konstante** heißt **aussagenlogisch**, wenn sie ein Element von  $\mathcal{J}_c$  ist. 28

<sup>5)</sup> Entsprechend *Funktionssymbol, Operationssymbol, Relationssymbol*, usw.



**Konstante** [Wikipedia](#) [39] schreibt dazu (Zitat ohne Fußnote und Verweise ins Internet):

Allgemein ist eine **Konstante** (von lateinisch *constans* „feststehend“) ein Zeichen beziehungsweise ein Sprachausdruck mit einer „genau bestimmte[n] Bedeutung, die im Laufe der Überlegungen unverändert bleibt“[1]. Die Konstante ist damit ein Gegenbegriff zur Variablen.

, 61, siehe [Variable](#)

**Kontraposition** Die allgemeingültige [Aussage](#):  $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\neg\beta \rightarrow \neg\alpha)$ . 41, 47,

**Kontravalenz** Eine [Gleichheitsrelation](#): Zwei Objekte  $A$  und  $B$  sind *nicht äquivalent* (nicht ähnlich),  $A \neq B$ , wenn sie in mindestens einer [interessierenden Eigenschaft](#) für  $\equiv$  nicht übereinstimmen. 16, 29,

## L

**Logik** [Wikipedia](#) [40] schreibt dazu (Zitat ohne altgriechischen Text, Fußnote und Verweise ins Internet):

Mit **Logik** (von altgriechisch [...], ‚denkende Kunst‘, ‚Vorgehensweise‘) oder auch **Folgerichtigkeit** wird im Allgemeinen das vernünftige Schlussfolgern und im Besonderen dessen Lehre – die **Schlussfolgerungslehre** oder auch **Denklehre** – bezeichnet. In der Logik wird die Struktur von Argumenten im Hinblick auf ihre Gültigkeit untersucht, unabhängig vom Inhalt der Aussagen. Bereits in diesem Sinne spricht man auch von „formaler“ Logik. Traditionell ist die Logik ein Teil der Philosophie. Ursprünglich hat sich die traditionelle Logik in Nachbarschaft zur Rhetorik entwickelt. Seit dem 20. Jahrhundert versteht man unter Logik überwiegend symbolische Logik, die auch als grundlegende Strukturwissenschaft, z. B. innerhalb der Mathematik und der theoretischen Informatik, behandelt wird.

5, , siehe [Aussage](#) , [Aussagenlogik](#) & [Prädikatenlogik](#)

## M

-, **leere** Die **leere Menge** ist die einzige [Menge](#) ohne Elemente. Sie wird mit  $\emptyset$  bezeichnet. 24, 34, 56

**Menge** [Wikipedia](#) [41] schreibt dazu (Zitat ohne Verweise ins Internet):

Eine **Menge** ist ein Verbund, eine Zusammenfassung von einzelnen Elementen. Die *Menge* ist eines der wichtigsten und grundlegenden Konzepte der Mathematik, mit ihrer Betrachtung beschäftigt sich die Mengenlehre.

Bei der Beschreibung einer Menge geht es ausschließlich um die Frage, welche Elemente in ihr enthalten sind. Es wird nicht danach gefragt, ob ein Element mehrmals enthalten ist oder ob es eine Reihenfolge unter den Elementen gibt. Eine Menge muss kein Element enthalten – es gibt genau eine Menge ohne Elemente, die „leere Menge“. In der Mathematik sind die Elemente einer Menge häufig Zahlen, Punkte eines Raumes oder ihrerseits Mengen. Das Konzept ist jedoch auf beliebige Objekte anwendbar: z. B. in der Statistik auf Stichproben, in der Medizin auf Patientenakten, am Marktstand auf eine Tüte mit Früchten.

Ist die Reihenfolge der Elemente von Bedeutung, dann spricht man von einer endlichen oder unendlichen Folge, wenn sich die Folgenglieder mit den natürlichen Zahlen aufzählen lassen (das erste, das zweite, usw.). Endliche Folgen heißen auch Tupel. In einem Tupel oder einer Folge können Elemente auch mehrfach vorkommen. Ein Gebilde, das wie eine Menge Elemente enthält, wobei es zusätzlich auf die Anzahl der Exemplare jedes Elements ankommt, jedoch nicht auf die Reihenfolge, heißt Multimenge.

, 56, 62, siehe [Element](#) , [Folge](#) , [leere Menge](#) , & [Tupel](#)

**Mengenlehre** [Wikipedia](#) [42] schreibt dazu (Zitat ohne Verweise ins Internet):

Die **Mengenlehre** ist ein grundlegendes Teilgebiet der Mathematik, das sich mit der Untersuchung von Mengen, also von Zusammenfassungen von Objekten, beschäftigt. Die gesamte Mathematik, wie sie heute üblicherweise gelehrt wird, ist in der Sprache der Mengenlehre formuliert und baut auf den Axiomen der Mengenlehre auf. Die meisten mathematischen Objekte, die in Teilbereichen wie Algebra, Analysis, Geometrie, Stochastik oder Topologie behandelt werden, um nur einige wenige zu nennen, lassen sich als Mengen definieren. Gemessen daran ist die Mengenlehre eine recht junge Wissenschaft; erst nach der Überwindung der Grundlagenkrise der Mathematik im frühen 20. Jahrhundert konnte die Mengenlehre ihren heutigen, zentralen und grundlegenden Platz in der Mathematik einnehmen.

5, 29, 33, , 64, siehe [Axiom](#) , [Objekt](#) & [Menge](#)

**Mengenoperation** >>> Beschreibung fehlt noch <<<

**Mengenrelation** >>> Beschreibung fehlt noch <<< 17

**Metadefinition** Eine [Definition](#) in [Metasprache](#) mit Hilfe des *Metadefinitionssymbols*  $\langle \Leftrightarrow \rangle$ .  $\langle \langle A \Leftrightarrow B \rangle \rangle$  steht für „*A ist definitionsgemäß äquivalent zu B*“ für [Aussagen](#) *A* und *B*. Gewissermaßen ist *A* nur eine andere Schreibweise für *B*. 17, 22, , 53, siehe [Definition](#)

**Metaformel** Eine [Formel](#) der [formalen Metasprache](#). 14, 63

**Metajunktor** >>> Beschreibung fehlt noch <<<

**Metaoperation** Eine [Operation](#) der [Metasprache](#) :  $\&$ ,  $\parallel$  oder  $|$ . 15, 21, 22, 24, 53

**Metarelation** Eine [Relation](#) der [Metasprache](#) :  $\Rightarrow$ ,  $\Leftarrow$  oder  $\Leftrightarrow$ . 15, 53

-, **formale** Eine [Metasprache](#) , deren Ausdrucksmittel [Formeln](#) sind. In diesem Dokument gehören die meisten [Formeln](#) dazu und werden daher als [Metaformeln](#) bezeichnet. Die Definition der Bedeutung der [Metaformeln](#) ist mehr beschreibend und nicht so exakt wie bei den [Formeln](#) der Mathematik, den hier sogenannten [Objektformeln](#). 4, 14, 63

**Metasprache** Eine [Sprache](#) , in der [Aussagen](#) über Elemente einer anderen [Sprache](#) getroffen werden können. In diesem Dokument ist dies immer die normale Umgangssprache. 13, 14, , 63, siehe [Objektsprache](#)

**Metasymbol** Ein [Symbol](#) der [formalen Metasprache](#). 14, siehe [Objektsymbol](#)

**Metavariable** Eine [Variable](#) der [formalen Metasprache](#).

**Monotonieregel** Eine [Schlussregel](#) . 34, 35, , 55, siehe (MR)

## N

**Negation** Die [Negation](#) (zu) einer binären [Relation](#)  $(G, A, B)$  ist die [Relation](#)  $(H, A, B)$  mit  $H = (A \times B) \setminus G$ . Üblicherweise wird das zugehörige Relationssymbol mit einem schrägen oder vertikalen Strich durchgestrichen. 17, 20, 63

**Notation, Polnische** Bei der [Polnischen Notationen](#) stehen die Operanden bzw. Argumente von [Relationen](#) und [Funktionen](#) stets rechts von den Relations- und Funktionssymbolen. Dadurch kann auf Gliederungszeichen wie Klammern und Kommata verzichtet werden. Noch einfacher für Computer ist die [umgekehrte Polnische Notation](#), bei der die Operanden und Argumente links von den Symbolen stehen. 28, 30, 56, 63

## O

**Oberaussage** Eine [Aussage](#)  $A$  ist genau dann eine **Oberaussage** einer [Aussage](#)  $B$ , wenn  $B$  eine [Unteraussage](#) von  $A$  ist.

**Objektart** >>> Beschreibung fehlt noch <<< [16](#), [58](#), [66](#)

**Objektformel** Eine [Formel](#) der [Objektsprache](#) . [14](#), [63](#)

**Objekt** [Symbole](#), [Formeln](#) und [Aussagen](#) sowie Mengen, [Zeichenfolgen](#), Zahlen; ganz allgemein reale oder gedachte Dinge an sich. [16–18](#), [58–60](#), [66](#)

**Objektsprache** Je nach der aktuellen (mathematischen) Umgebung die [Formeln](#) der [Aussagenlogik](#), der [Prädikatenlogik](#), der [Mengenlehre](#) oder eines anderen [Fachgebiet](#) s. [13](#), [14](#), [64](#)

**Objektsymbol** Ein [Symbol](#) der [Objektsprache](#) . [14](#), [17](#), , siehe [Metasymbol](#)

**Operation** Eine — meistens binäre, d. h. zweiwertige — Funktion  $M^n \rightarrow M$ . Für eine binäre [Operation](#)  $\otimes : M \times M \rightarrow M$  schreibt man meistens  $x \otimes y$  statt  $\otimes(x, y)$ . [15](#), [16](#), [20–22](#), [28](#), [29](#), [53](#), [59](#), [61](#), [63](#), [64](#), [66](#)

**Operationssymbol** Ein [Symbol](#) für eine [Operation](#) .

## P

**Potenzmenge** Die [Potenzmenge](#)  $\mathfrak{P}(M)$  einer Menge  $M$  ist die Menge ihrer Teilmengen. [23](#), , [56](#), [64](#)

**Prädikat** Ein Element der [Prädikatenlogik](#) . — Z. B. kann man eine Gruppe als ein zweistelliges [Prädikat](#) Gruppe( $G, +$ ) definieren, in dem  $G$  eine Menge und  $+$  eine [Operation](#), d. h. eine binäre (zweistellige) Funktion  $+: G \times G \rightarrow G$  ist, so dass die Gruppenaxiome erfüllt sind. , [64](#)

**Prädikatenlogik** [Wikipedia](#) [[43](#)] schreibt dazu (Zitat ohne Verweise ins Internet):

Die **Prädikatenlogiken** (auch **Quantorenlogiken**) bilden eine Familie logischer Systeme, die es erlauben, einen weiten und in der Praxis vieler Wissenschaften und deren Anwendungen wichtigen Bereich von Argumenten zu formalisieren und auf ihre Gültigkeit zu überprüfen. Auf Grund dieser Eigenschaft spielt die Prädikatenlogik eine große Rolle in der Logik sowie in Mathematik, Informatik, Linguistik und Philosophie.

[23](#), [27](#), [28](#), [33](#), , [64](#), siehe [Aussagenlogik](#) & [Logik](#)

## Q

**Quellbereich** einer partiellen [Funktion](#) . , siehe [src](#), [Definitionsbereich](#) & [Funktion](#)

## R

**Relation** Eine  $n$ -stellige [Relation](#)  $R$  ist ein  $(1+n)$ -[Tupel](#)  $(G, A_1, \dots, A_n)$  mit  $G \subseteq A_1 \times \dots \times A_n$ . [14–17](#), [19–22](#), [24](#), [28](#), [53](#), [56–59](#), [61](#), [63–66](#)

## S

-, **formaler** Formale Darstellung eines mathematischen [Satz](#) s. [25](#), [26](#), [55](#), siehe (FS)

**Satz** Eine mathematische [Aussage](#), dass bestimmte [Folgerungen](#) aus gegebenen [Voraussetzungen](#) abgeleitet werden können. [1](#), [4–7](#), [10](#), [11](#), [12](#), [13](#), [28](#), [34](#), [42–44](#), [58](#), [60](#), [61](#), [64](#)

-, **allgemeingültig** Eine [Schlussregel](#) heißt **allgemeingültig**, wenn sie aus den [Basisregeln](#) und schon bekannten [allgemeingültigen Schlussregeln](#) abgeleitet werden kann. [27](#), [34](#), [38](#), [39](#), [41](#), [47](#), [61](#), [64](#), [65](#)

**Schlussregelmeng**e Eine Menge von [Schlussregeln](#), meistens mit  $\mathcal{C}$  bezeichnet. , siehe  $\mathcal{C}$

**Schlussregel** Eine [Schlussregel](#)  $\frac{\mathcal{V}}{\mathcal{F}}$  entspricht der [Aussage](#) :

„Wenn alle **Voraussetzungen**  $v$  aus  $\mathcal{V}$  zutreffen, dann auch alle **Folgerungen**  $f$  aus  $\mathcal{F}$ .“

Wenn diese **Aussage** zutrifft, kann die Schlussregel zur **zulässigen Umwandlung** von **Formeln** dienen. 22, 23, 24–26, 27, 34–41, 43, 54, 55, 58–61, 63, 64, 66, siehe C & C

**Schnittregel** Eine **allgemeingültige Schlussregel**. 37, 38, 39, 47, , 55, siehe (SR)

-, **Boolesche** Die **logische Signatur**  $\{\neg, \wedge, \vee\}$ . 31

-, **logische** Abweichend von der Definition von **Signatur** in **Wikipedia** ist eine **logische Signatur** eine Teilmenge von  $\mathcal{J}$ , ausreichend um damit und mit  $\mathcal{Q}$  und Klammerung alle anderen Elemente aus  $\mathcal{J}$  zu definieren. 31, 32, 65

**Signatur** **Wikipedia** [47] schreibt dazu (Zitat ohne Verweise ins Internet):

In der mathematischen Logik besteht eine **Signatur** aus der Menge der Symbole, die in der betrachteten Sprache zu den üblichen, rein logischen Symbolen hinzukommt, und einer Abbildung, die jedem Symbol der Signatur eine Stelligkeit eindeutig zuordnet. Während die logischen Symbole wie  $\forall, \exists, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \neg$  stets als „für alle“, „es gibt ein“, „und“, „oder“, „folgt“, „äquivalent zu“ bzw. „nicht“ interpretiert werden, können durch die semantische Interpretation der Symbole der Signatur verschiedene Strukturen (insbesondere Modelle von Aussagen der Logik) unterschieden werden. Die Signatur ist der spezifische Teil einer elementaren Sprache.

, 65, siehe **Logik**, **Sprache**, **Stelligkeit** & **Symbol**

-, **aussagenlogische** >>> Beschreibung fehlt noch <<< 30

**Sprachebene** >>> Beschreibung fehlt noch <<< 13

**Sprache** — Siehe **Formelmenge**. 14, 18, 26, 27, , 55, 56, 61, 63, 67

**Stelligkeit** einer **Funktion** oder **Relation**. 19, , 57, 59, 66, siehe  $\text{stelf}$  &  $\text{stelf}_r$

-, **zusammengesetztes** >>> Beschreibung fehlt noch <<< 17,

**Symbol** Ein **einfaches Symbol** ist ein druckbares typographisches Zeichen, das als Einheit angesehen wird. Ein **zusammengesetztes Symbol** besteht aus mehreren einfachen **Symbolen**. Im Einzelfall muss für ein Symbol definiert werden, ob es als **atomar** gilt oder in welche **atomaren Symbole** es **zerlegt** werden kann und somit als **zerlegbar** gilt. 5, 13, 16–18, 29, 55, 57, 58, 61, 63–65, 67, siehe **Metasymbol** & **Objektsymbol**

## T

**Trägermenge** einer **Relation**. 19, 55, siehe *car*

**Tupelmenge** Die **Tupelmenge**  $\mathfrak{T}(M)$  einer Menge  $M$  ist die Menge aller  $n$ -Tupel aus  $M^n$  für alle  $n \in \mathbb{N}_0$ . 23, , 65

**Tupel** Ein  $n$ -**Tupel** <sup>6)</sup>  $\vec{a}$  ist eine endliche Folge<sup>7)</sup>  $(a_1, \dots, a_n)$  **von** seinen **Komponenten**  $a_i$ . Sind alle Komponenten Elemente einer Menge  $M$ , so heißt  $\vec{a}$  ein  $n$ -**Tupel auf**  $M$ . 18, 19, 23, 26, , 56, 57, 60, 64, 65

## U

**Umkehrrelation** Die **Umkehrrelation** zu einer binären **Relation**  $(G, A, B)$  ist die **Relation**  $(H, B, A)$  mit  $H = \{(b, a) \mid (a, b) \in G\}$ . Üblicherweise wird das zugehörige Relationssymbol gespiegelt. 17, 19, 20, 53, 65

<sup>6)</sup> alternativ: **Vektor**

<sup>7)</sup> alternativ: **Sequenz**

-, **zulässige** Eine **Umwandlung** heißt **zulässig**, wenn sie Element einer vorgegebenen Menge von **Umwandlungen** oder eine daraus zulässigerweise abgeleitete **Umwandlung** ist. 25, 34, 35, *siehe* **Umwandlung**

**Umwandlungsfolge** Eine Folge von **Umwandlungen**. 27, , *siehe*  $T$ ,  $\mathcal{T}$  & **Umwandlung**

**Umwandlungsregel** > > > Beschreibung fehlt noch < < < 12

**Umwandlung** Eine Umformung oder Erzeugung einer **Formel** aus einer vorgegebenen Menge von **Formeln**, d. h. die Anwendung einer **Schlussregel**. 12, 27, 36, 57, 58, 60, 65–67, *siehe*  $T$ ,  $\mathcal{T}$  & **zulässige Umwandlung**

**unär** Eine **Operation**, **Funktion** oder **Relation** heißt **unär**, wenn ihre **Stelligkeit** gleich 1 ist. , *siehe* **binär**

**Ungleichheit** Eine **Gleichheitsrelation**: Zwei Objekte  $A$  und  $B$  sind *nicht gleich* (nicht dasselbe; nicht identisch),  $A \neq B$ , wenn sie in mindestens einer **interessierenden Eigenschaft** für  $=$  nicht übereinstimmen. 16, 17,

## V

**Variable** Wikipedia [50] schreibt dazu (Zitat ohne Fußnoten und Verweise ins Internet):

Eine **Variable** ist ein Name für eine Leerstelle in einem logischen oder mathematischen Ausdruck.[1] Der Begriff leitet sich vom lateinischen Adjektiv *variabilis* (veränderlich) ab. Gleichwertig werden auch die Begriffe *Platzhalter* oder *Veränderliche* benutzt. Als „Variable“ dienten früher Wörter oder Symbole, heute verwendet man zur mathematischen Notation in der Regel Buchstaben als Zeichen. Wird anstelle der Variablen ein konkretes Objekt eingesetzt, so ist darauf zu achten, dass überall dort, wo die Variable auftritt, auch dasselbe Objekt benutzt wird.

, 56, 63, *siehe* **Konstante**

**vergleichbar** Zwei **Objekte**  $A$  und  $B$  sind **vergleichbar**, wenn beide von derselben **Objektart** sind, d. h. wenn beide z. B. jeweils Mengen, **Zeichenfolgen**, Zahlen, usw. sind. Dabei muss bei **Formeln** zwischen der **Formel** an sich und ihrem **Wert** oder **Ergebnis** unterschieden werden. 16, 35, 66

**Vertauschung** Die **Vertauschung** von zwei unabhängigen Teil-**Formeln** ( $\alpha$  und  $\beta$ ) in einer anderen **Formel** ( $\gamma$ )

— Formal:  $\gamma(\alpha \leftrightarrow \beta)$ . Die **Vertauschung** ist eine spezielle Form der **Ersetzung**. 32, 35, 36, 53

**Voraussetzungsmenge** Eine **Ableitungsmenge**: Die Menge  $\mathcal{V}$  der **Voraussetzungen** einer **Schlussregel** bzw. eines **Beweis es**.

**Voraussetzung** Eine **Ableitung**: Die **Voraussetzungen** einer **Schlussregel**  $\frac{\mathcal{V}}{\mathcal{F}}$  bzw.  $\frac{\mathcal{V}}{\mathcal{F}}$  sind die Elemente aus  $\mathcal{V}$  bzw.  $\vdash_{\mathcal{V}}$ . Die **Voraussetzungen** werden normalerweise mit  $\mathbf{v}_i$  bezeichnet. 11, 12, 21, 24, 25, 27, 35, 36, 38–40, 57, 59, 60, 64–66, *siehe* **Schlussregel**

## W

**wahr** Ein metasprachlicher **Wahrheitswert** in Textform. 14, 19, 29, , 54, 57, *siehe* **falsch**, **true** &  $\top$

**Wahrheitswert** Wikipedia [51] schreibt dazu (Zitat ohne Verweise ins Internet):

Ein **Wahrheitswert** ist in Logik und Mathematik ein logischer Wert, den eine Aussage in Bezug auf Wahrheit annehmen kann.

14, 16, 28, 29, 47, 53–55, 57, 60, 61, 66

**Wertebereich** einer **Funktion**. , *siehe* **ran**, **Zielbereich** & **Funktion**

**Wikipedia** Wikipedia [28] schreibt dazu (Zitat):

Wikipedia ist ein Projekt zum Aufbau einer [Internet-]Enzyklopädie aus freien Inhalten.

[14](#), [32](#), [33](#), , [58–60](#), [62–66](#)

**Wort**    Synonym: [Formel](#) — Ein Element einer [Sprache](#) . [18](#), , [61](#), *siehe* [Formelmenge](#)

## Y

-, XXX   >>> Beschreibung fehlt noch <<<

YYY   >>> Beschreibung fehlt noch <<<

## Z

**Zahl, natürliche**   >>> Beschreibung fehlt noch <<<

**Zeichenfolge**   Eine Folge von [Symbolen](#), wobei Leerstellen und sonstiger Zwischenraum nicht zählen und nur zur besseren Darstellung dienen. Dabei sind als spezielle [Symbole](#) auch [Zeichenketten](#) erlaubt, solange die Zerlegung eindeutig bleibt. Z. B. kann  $\langle \sin \rangle$  als ein einzelnes [Symbol](#) — für die Sinusfunktion — aufgefasst werden, aber auch als Folge von den Buchstaben  $\langle s \rangle$ ,  $\langle i \rangle$  und  $\langle n \rangle$ . [Formeln](#) werden immer als [Zeichenfolgen](#) aufgefasst. [12](#), [16–18](#), [23](#), [61](#), [64](#), [66](#), [67](#), *siehe* [Zeichenkette](#)

**Zeichenkette**   Eine Folge von (typographischen) Zeichen, auch Leerstellen und sonstigem Zwischenraum. [16](#), [18](#), [31](#), [67](#), *siehe* [Zeichenfolge](#)

**zerlegbar**   Eine [Aussage](#) , [Formel](#) oder [Symbol](#) , die eine [echte Unteraussage](#), [Unterformel](#) bzw. [Untersymbol](#) enthalten, heißt **zerlegbar**. [15](#), [17](#), [18](#), [30](#), [65](#), *siehe* [atomar](#)

**Zielbereich**   einer [Funktion](#) . [20](#), , [61](#), *siehe* [tar](#), [Wertebereich](#) & [Funktion](#)

**Ziel**   Ein **Ziel** ist in diesem Dokument eine Anforderungen an [ASBA](#). [7](#), [8](#)

**zulässig**   Eine Eigenschaft von [Formel](#) , [Umwandlung](#) und [Ersetzung](#) . [35](#), [36](#), [58](#), [60](#), [65](#), *siehe* [Formel](#) , [Umwandlung](#) & [Ersetzung](#)