관절가동범위 보고서

DR.PMA · RANGE OF MOTION

연구코드
견본-001

측정일	거리 · 높이	측정자	다음 측정	측정 방식
2026.10.15	250 · 100cm	S01	4주 뒤	카메라 10동작


89 점 · B

관절가동범위 종합 · 참고값 AAOS 성인 가동범위 · B 양호


관절 7곳 중 4곳이 참고값에 닿았습니다 · 발목이 가장 좁습니다

좌우 차이는 어깨 굴곡(16°)이 가장 큽니다 · 4주 뒤 같은 조건으로 다시 재기


어깨 제한 — 83점



굴곡
좌 158° 우 142° /180




신전
좌 48° 우 44° /60




외전
좌 165° 우 151° /180

고관절 주의 — 92점




굴곡
좌 112° 우 118° /120




외전
좌 38° 우 41° /45

목 정상 — 100



굴곡
좌 48° 우 47° /45

팔꿈치 정상 — 93




굴곡
좌 141° 우 139° /150

무릎 정상 — 99




굴곡
좌 132° 우 136° /135

발목 제한 — 73




배측굴곡
좌 16° 우 13° /20

체간 정상 — 91



굴곡
좌 74° 우 72° /80

부위별 점수



할 운동

좁은 관절을 늘리는 운동 · 주 5회

어깨 83점



벽 슬라이드
등·팔꿈치·손등을 벽에 붙인 채 팔 올리기
10회 × 2세트



가슴 펴기
등 뒤로 깍지 끼고 어깨를 뒤로, 가슴을 위로
30초 × 3회

고관절 92점



고관절 앞 늘이기
한쪽 무릎 꿇고 골반을 앞으로 밀기
30초 × 3회



옆으로 누워 다리 들기
발끝은 앞을 향하게, 골반이 뒤로 돌지 않게
15회 × 3세트

발목 73점



카프 레이즈
뒤꿈치를 천천히 들었다 더 천천히 내리기
15회 × 3세트



수건 당기기
발가락으로 수건을 뒤꿈치 쪽으로 끌어오기
15회 × 3세트

종합 소견 전체 가동범위는 89점(B 양호)입니다. 관절 7곳 가운데 4곳이 참고값에 닿았습니다. 낮은 곳은 어깨 83점, 고관절 92점, 발목 73점입니다. 그 가운데 발목 배측굴곡이 우측에서 참고값의 65%로 가장 좁습니다. 카프 레이즈·수건 당기기를 주 5회 하십시오. 좌우 차이는 어깨 굴곡에서 16°로 가장 큽니다. 좁은 쪽을 더 하십시오. 4주 뒤 같은 조건으로 다시 재어 변화를 보십시오.

큰 숫자 = 잰 각도 · /숫자 = 참고값(AAOS 계열 성인 가동범위, 각도계 값). 핑크 = 참고값의 80% 미만(제한) · 주의 80~89% · 정상 90% 이상. 카메라 추정이라 각도계와 체계적 차이가 있을 수 있어, 못 미친다고 제한이 있다는 뜻은 아닙니다. 점수는 좌·우를 참고값으로 나눈 비율의 평균이며 넘긴 만큼은 세지 않습니다(A 90↑ · B 80~89 · C 70~79 · D 70↓). 같은 조건으로 잰 값끼리의 변화를 보십시오. 의료기기가 아닙니다.

운동 보고서

DR.PMA · EXERCISE REPORT

연구코드
견본-001

보고일	기간	처방 기준	권장	측정자
2026.10.15	9.18 ~ 10.15	관절가동범위	주 5회	S01

10 일 / 28일

지난 4주 운동 · 앱에 기록된 운동만 셉니다(체력측정은 빼고)

주 2.5회 했습니다 · 권장(주 5회)의 50%

평균 힘든 정도 5.2/10 · 가장 아팠을 때 3/10

4주 달력 · 칠한 날 = 운동한 날

18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15


운동별 기록

최근 10.12까지 4주 · 지난번과 비교 · 좋아진 값 블루 · 주의할 값 핑크

운동	처방	한 횟수·시간	지난번	동작 깊이(최고)	목표	힘듦	통증
벽 슬라이드 양쪽 · 10.12	10회 × 2세트	30회	24회	141°	145°	6	1
카프 레이즈 좌측 · 10.12	15회 × 3세트	28회	30회	117°	125°	7	3
가슴 펴기 좌측 · 10.12	30초 × 3회	90초	90초	–	–	3	0
브릿지 좌측 · 10.12	12회 × 3세트	36회	33회	–	–	5	0
힙 힌지 좌측 · 10.12	12회 × 3세트	36회	30회	118°	115°	6	0

운동한 양 · 주별

7일씩 · 운동한 날 수



체력측정


10.15 · 기준은 국민체력100 어르신 자료가 있는 검사만

30초 의자 앉았다 일어서기 처음 측정 · 기준 없음(기록만)	14 회
눈 감고 한발서기 처음 측정 · 기준 없음(기록만)	11.4 초
제자리 점프 체공시간 처음 측정 · 기준 없음(기록만)	0.41 초
1분 스쿼트 처음 측정 · 기준 없음(기록만)	27 회

정리 4주 동안 **10일** 운동했습니다(주 2.5회, 권장 주 5회). 앞 2주 6일, 뒤 2주 4일로 줄었습니다. 지난번보다 횟수·시간이나 동작 깊이가 는 운동은 **벽 슬라이드, 브릿지, 힙 힌지**입니다. 횟수·시간이 준 운동은 **카프 레이즈**입니다. 목표 각도(잠정값)에 못 미친 운동은 **벽 슬라이드(141°/145°), 카프 레이즈(117°/125°), 힙 힌지(118°/115°)**입니다. 통증이 기록된 운동은 **벽 슬라이드(1/10), 카프 레이즈(3/10)**입니다 — 통증이 없는 범위로 횟수나 세트를 줄이고, 통증이 이어지면 전문가와 상의하십시오. 다음 4주도 **주 5회**를 목표로 하십시오.

다음 4주 운동


관절가동범위 결과에 맞춘 처방 · 주 5회



강화
카프 레이즈
15회 × 3세트



강화
수건 당기기
15회 × 3세트



강화
벽 슬라이드
10회 × 2세트



늘이기
가슴 펴기
30초 × 3회



늘이기
고관절 앞 늘이기
30초 × 3회



강화
옆으로 누워 다리 들기
15회 × 3세트

운동 기록은 앱에서 운동할 때 자동으로 남은 것만 셉니다. 처방은 앱의 기본 처방량입니다. 동작 깊이·목표 각도는 잠정값이며 참고범위가 아닙니다. "지난번"은 같은 종목의 바로 전 기록이며, 촬영 거리·높이가 다르면 각도는 견주지 않았습니다. 기준: 국민체력100 어르신 측정자료(공공데이터포털, 2013~2026, 40만 6천 건)에서 계산한 성·연령대별 백분위. 인증 등급이 아니라 자료 안에서의 상대 위치입니다. 의료기기가 아닙니다.