

Punto ENARM -- Preguntas Gineco-Obstetricia

77 tarjetas de @PuntoENARM (feb-sep 2026). Enunciado = dato clave que pregunta el ENARM. [[Nota]] = patología existente en el vault.

Feb 2026 (11)

- **N343** (Mon Feb 16): HEMORRAGIA DEL TERCER TRIMESTRE: SANGRADO TRANSVAGINAL DESPUÉS DE LAS 20 SDG -- [[Hemorragia Obstétrica]]
- **N344** (Mon Feb 16): PRINCIPALES CAUSAS DE HEMORRAGIA EN TERCER TRIMESTRE: PLACENTA PREVIA Y DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA NORMOINCERTA -- [[Hemorragia Obstétrica]]
- **N345** (Mon Feb 16): CARACTERÍSTICA CLÍNICA DE PLACENTA PREVIA: SANGRADO ROJO RUTILANTE, INDOLORO -- [[Hemorragia Obstétrica]]
- **N346** (Tue Feb 17): CARACTERÍSTICA CLÍNICA DE DPPNI: DOLOR ABDOMINAL + ÚTERO HIPERTÓNICO + SANGRADO OSCURO -- [[patologías/Emergencias Obstétricas]]
- **N347** (Tue Feb 17): ESTUDIO DE ELECCIÓN PARA DIAGNÓSTICO DE PLACENTA PREVIA: ULTRASONIDO TRANSVAGINAL -- [[Hemorragia Obstétrica]]
- **N348** (Tue Feb 17): EN SOSPECHA DE PLACENTA PREVIA ESTÁ CONTRAINDICADO EL TACTO VAGINAL -- [[Hemorragia Obstétrica]]
- **N349** (Tue Feb 17): CLASIFICACIÓN DE PLACENTA PREVIA: TOTAL, PARCIAL, MARGINAL Y DE INSERCIÓN BAJA
- **N350** (Tue Feb 17): FACTOR DE RIESGO MÁS IMPORTANTE PARA PLACENTA PREVIA: CESÁREA PREVIA
- **N351** (Wed Feb 18): COMPLICACIÓN MÁS GRAVE DE DPPNI: COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA -- [[Emergencias Obstétricas]]
- **N352** (Wed Feb 18): EN PLACENTA PREVIA TOTAL LA VÍA DE RESOLUCIÓN ES CESÁREA
- **N353** (Wed Feb 18): EN DPPNI CON INESTABILIDAD HEMODINÁMICA LA RESOLUCIÓN ES INMEDIATA -- [[Hemorragia Obstétrica]]

Apr 2026 (20)

- **N603** (Tue Apr 07): SE CONSIDERA MACROSOMIA >4000 GRAMOS
- **N681** (Tue Apr 21): LA PREECLAMPSIA SE DEFINE COMO HTA DE NOVO DESPUÉS DE LAS 20 SDG CON PROTEINURIA O DATOS DE DAÑO A ÓRGANO BLANCO -- [[Trastornos Hipertensivos del Embarazo]]
- **N682** (Tue Apr 21): LA PREECLAMPSIA SEVERA PUEDE PRESENTAR TROMBOCITOPENIA, DAÑO RENAL, DAÑO HEPÁTICO, EDEMA PULMONAR O DATOS NEUROLÓGICOS -- [[Trastornos Hipertensivos del Embarazo]]
- **N683** (Tue Apr 21): EL TRATAMIENTO DE ELECCIÓN PARA PROFILAXIS Y MANEJO DE ECLAMPSIA ES SULFATO DE MAGNESIO -- [[Trastornos Hipertensivos del Embarazo]]
- **N685** (Tue Apr 21): LA ECLAMPSIA ES LA PRESENCIA DE CONVULSIONES EN UNA PACIENTE CON PREECLAMPSIA -- [[Trastornos Hipertensivos del Embarazo]]
- **N686** (Wed Apr 22): LA HEMORRAGIA POSPARTO MÁS FRECUENTEMENTE ES POR ATONÍA UTERINA -- [[patologías/Hemorragia Obstétrica]]

- **N687** (Wed Apr 22): OXITOCINA ES UTEROTÓNICO DE PRIMERA LÍNEA EN HEMORRAGIA POSPARTO -- [[Hemorragia Obstétrica]]
- **N688** (Wed Apr 22): LA DOSIS PROFILÁCTICA FRECUENTEMENTE REFERIDA DE OXITOCINA ES 10 UI IM O IV EN MANEJO ACTIVO DEL ALUMBRAMIENTO -- [[Trabajo de Parto Normal]]
- **N689** (Wed Apr 22): LAS 4T DE HEMORRAGIA POSPARTO SON TONE, TRAUMA, TISSUE Y THROMBIN -- [[Hemorragia Obstétrica]]
- **N690** (Wed Apr 22): LA CAUSA MÁS FRECUENTE DE HEMORRAGIA DEL PRIMER TRIMESTRE ES ABORTO -- [[Aborto]]
- **N691** (Thu Apr 23): LA CAUSA MÁS FRECUENTE DE HEMORRAGIA DEL TERCER TRIMESTRE ES PLACENTA PREVIA O DPPNI -- [[Hemorragia Obstétrica]]
- **N692** (Thu Apr 23): EL TACTO VAGINAL ESTÁ CONTRAINDICADO EN SOSPECHA DE PLACENTA PREVIA
- **N693** (Thu Apr 23): EL SIGNO CLÁSICO DE DPPNI ES DOLOR, HIPERTONÍA UTERINA Y SANGRADO OSCURO -- [[Hemorragia Obstétrica]]
- **N694** (Thu Apr 23): LA RPM ES RUPTURA DE MEMBRANAS ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO -- [[Ruptura Prematura de Membranas]]
- **N695** (Thu Apr 23): EN AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO ENTRE 24-34 SDG SE INDICA MADURACIÓN PULMONAR -- [[Parto Pretermino]]
- **N696** (Fri Apr 24): BETAMETASONA ES ESQUEMA CLÁSICO PARA MADURACIÓN PULMONAR -- [[patologías/Parto Pretermino]]
- **N697** (Fri Apr 24): NIFEDIPINO ES TOCOLÍTICO DE PRIMERA LÍNEA EN MUCHOS ESQUEMAS -- [[Parto Pretérmino]]
- **N698** (Fri Apr 24): EN <32 SDG EL SULFATO DE MAGNESIO SE USA TAMBIÉN PARA NEUROPROTECCIÓN FETAL -- [[Parto Pretermino]]
- **N699** (Fri Apr 24): LA DISTOCIA DE HOMBROS SE MANEJA INICIALMENTE CON MANIOBRA DE MCROBERTS -- [[Distocias y Parto Vaginal Instrumentado]]
- **N700** (Fri Apr 24): LA MANIOBRA DE WOODS ES UNA MANIOBRA DE SEGUNDA LÍNEA EN DISTOCIA DE HOMBROS -- [[Distocias y Parto Vaginal Instrumentado]]

May 2026 (24)

- **N801** (Mon May 25): EL CANCER CERVICOUTERINO SE ASOCIA PRINCIPALMENTE A VPH 16 Y 18 -- [[Cáncer Cervicouterino]]
- **N802** (Mon May 25): EL FACTOR DE RIESGO MAS IMPORTANTE PARA CANCER CERVICOUTERINO ES INFECCION POR VPH -- [[Cáncer Cervicouterino]]
- **N803** (Mon May 25): EL PAPANICOLAOU ES EL METODO DE TAMIZAJE PARA CANCER CERVICOUTERINO -- [[Cáncer Cervicouterino]]
- **N804** (Mon May 25): LA COLPOSCOPIA ESTA INDICADA EN PAPANICOLAOU ANORMAL -- [[Cáncer Cervicouterino]]
- **N805** (Mon May 25): EL CANCER DE MAMA ES EL CANCER MAS FRECUENTE EN MUJERES -- [[Cáncer Mamario]]
- **N807** (Tue May 26): EL CUADRANTE SUPERIOR EXTERNO ES EL SITIO MAS FRECUENTE DE CANCER DE MAMA -- [[Cáncer Mamario]]
- **N808** (Tue May 26): LA MASTOGRAFIA ES EL ESTUDIO DE TAMIZAJE PARA CANCER DE MAMA -- [[Cáncer Mamario]]
- **N809** (Tue May 26): EL SISTEMA BI-RADS SE UTILIZA PARA CLASIFICAR HALLAZGOS MAMARIOS -- [[Cáncer Mamario]]
- **N810** (Tue May 26): EL TRATAMIENTO DE CANCER DE MAMA DEPENDE DEL ESTADIO Y RECEPTORES HORMONALES -- [[Cáncer Mamario]]

- **N811** (Wed May 27): EL SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO SE ASOCIA A HIPERANDROGENISMO Y ANOVULACION -- [[Síndrome de Ovarios Poliquísticos]]
- **N812** (Wed May 27): LOS CRITERIOS DE ROTTERDAM SE UTILIZAN PARA DIAGNOSTICO DE SOP -- [[Síndrome de Ovarios Poliquísticos]]
- **N813** (Wed May 27): EL TRATAMIENTO INICIAL DEL SOP ES PERDIDA DE PESO Y CAMBIOS EN ESTILO DE VIDA -- [[Síndrome de Ovarios Poliquísticos]]
- **N814** (Wed May 27): LA METFORMINA SE UTILIZA EN SOP CON RESISTENCIA A INSULINA -- [[Síndrome de Ovarios Poliquísticos]]
- **N815** (Wed May 27): EL ANTICONCEPTIVO ORAL COMBINADO INHIBE LA OVULACION -- [[Anticoncepción y Planificación Familiar]]
- **N816** (Thu May 28): LOS ANTICONCEPTIVOS COMBINADOS ESTAN CONTRAINDICADOS EN TROMBOSIS Y TABAQUISMO >35 AÑOS -- [[patologías/Anticoncepción y Planificación Familiar]]
- **N817** (Thu May 28): EL DIU DE COBRE ACTUA PRINCIPALMENTE POR EFECTO ESPERMICIDA LOCAL -- [[Anticoncepción y Planificación Familiar]]
- **N818** (Thu May 28): EL IMPLANTE SUBDERMICO ES UNO DE LOS METODOS ANTICONCEPTIVOS MAS EFECTIVOS -- [[Anticoncepción y Planificación Familiar]]
- **N819** (Thu May 28): LA ANTICONCEPCION DE EMERGENCIA ES MAS EFECTIVA EN LAS PRIMERAS 72 HORAS -- [[Anticoncepción y Planificación Familiar]]
- **N820** (Thu May 28): LEVONORGESTREL ES EL FARMACO MAS UTILIZADO EN ANTICONCEPCION DE EMERGENCIA -- [[Anticoncepción y Planificación Familiar]]
- **N821** (Fri May 29): EL CANCER DE ENDOMETRIO ES EL CANCER GINECOLOGICO MAS FRECUENTE -- [[Cáncer Endometrial]]
- **N822** (Fri May 29): EL PRINCIPAL FACTOR DE RIESGO PARA CANCER DE ENDOMETRIO ES HIPERESTROGENISMO SIN OPOSICION -- [[Cáncer Endometrial]]
- **N823** (Fri May 29): EL SANGRADO UTERINO POSMENOPAUSICO ES CANCER DE ENDOMETRIO HASTA DEMOSTRAR LO CONTRARIO -- [[Cáncer Endometrial]]
- **N824** (Fri May 29): EL ESTUDIO INICIAL EN SOSPECHA DE CANCER DE ENDOMETRIO ES ULTRASONIDO TRANSVAGINAL -- [[Cáncer Endometrial]]
- **N825** (Fri May 29): EL DIAGNOSTICO DEFINITIVO DE CANCER DE ENDOMETRIO ES HISTOPATOLOGICO -- [[Cáncer Endometrial]]

Jun 2026 (18)

- **N826** (Mon Jun 01): EL CANCER DE OVARIO ES LA PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE POR CANCER GINECOLOGICO -- [[patologías/Neoplasias Ováricas]]
- **N827** (Mon Jun 01): EL TUMOR EPITELIAL ES EL TIPO MAS FRECUENTE DE CANCER DE OVARIO -- [[Neoplasias Ováricas]]
- **N828** (Mon Jun 01): EL MARCADOR TUMORAL MAS UTILIZADO EN CANCER DE OVARIO ES CA-125 -- [[Neoplasias Ováricas]]
- **N829** (Mon Jun 01): LA TRIADA DE MEIGS ES FIBROMA OVARICO, ASCITIS Y DERRAME PLEURAL -- [[Neoplasias Ováricas]]
- **N830** (Mon Jun 01): EL EMBARAZO ECTOPICO SE IMPLANTA MAS FRECUENTEMENTE EN LA TROMPA DE FALOPIO -- [[Embarazo Ectópico]]
- **N831** (Tue Jun 02): EL SITIO MAS FRECUENTE DE EMBARAZO ECTOPICO ES LA AMPULA TUBARIA -- [[Embarazo Ectópico]]
- **N832** (Tue Jun 02): LA TRIADA CLASICA DE EMBARAZO ECTOPICO ES DOLOR ABDOMINAL, AMENORREA Y SANGRADO TRANSVAGINAL -- [[Embarazo Ectópico]]
- **N833** (Tue Jun 02): EL ESTUDIO DE ELECCION EN EMBARAZO ECTOPICO ES USG TRANSVAGINAL MAS BHCG -- [[Embarazo Ectópico]]

- **N834** (Tue Jun 02): EL MANEJO MEDICO DEL EMBARAZO ECTOPICO ES METOTREXATO -- [[Embarazo Ectópico]]
- **N835** (Tue Jun 02): LA ENDOMETRIOSIS ES LA PRESENCIA DE TEJIDO ENDOMETRIAL FUERA DEL UTERO -- [[Endometriosis]]
- **N836** (Tue Jun 02): EL SINTOMA MAS FRECUENTE DE ENDOMETRIOSIS ES DISMENORREA -- [[patologías/Endometriosis]]
- **N837** (Tue Jun 02): EL GOLD ESTANDAR DIAGNOSTICO DE ENDOMETRIOSIS ES LAPAROSCOPIA -- [[Endometriosis]]
- **N838** (Tue Jun 02): EL MIOMA UTERINO ES EL TUMOR BENIGNO MAS FRECUENTE EN MUJERES -- [[Miomatosis Uterina]]
- **N839** (Tue Jun 02): EL SINTOMA MAS FRECUENTE DE MIOMATOSIS ES SANGRADO UTERINO ANORMAL -- [[Miomatosis Uterina]]
- **N840** (Tue Jun 02): EL LEIOMIOSARCOMA ES UNA NEOPLASIA MALIGNA DEL MUSCULO LISO UTERINO
- **N918** (Thu Jun 25): LA PROFILAXIS INTRAPARTO CON PENICILINA DISMINUYE EL RIESGO DE INFECCIÓN POR ESTREPTOCOCCO DEL GRUPO B
- **N922** (Thu Jun 25): EL AGENTE ETIOLÓGICO DE LA SÍFILIS CONGÉNITA ES TREPONEMA PALLIDUM -- [[Sífilis (Treponema pallidum)]]
- **N932** (Tue Jun 30): EL VIRUS DE LA RUBÉOLA EN EL PRIMER TRIMESTRE TIENE MAYOR RIESGO DE EMBRIOPATÍA -- [[Infecciones Congénitas y Perinatales (TORCH y otras)]]

Jul 2026 (2)

- **N966** (Thu Jul 09): LOS ANTICONCEPTIVOS COMBINADOS AUMENTAN EL RIESGO DE COLELITIASIS CUANDO CONTIENEN MÁS DE 50 MCG DE ESTRÓGENOS -- [[patologías/Anticoncepción y Planificación Familiar]]
- **N1006** (Tue Jul 21): LA BETAMETASONA PRENATAL DISMINUYE EL RIESGO DE ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA -- [[patologías/Síndrome de Dificultad Respiratoria Neonatal]]

Aug 2026 (2)

- **N1071** (Mon Aug 10): LAS CAUSAS GINECOOBSTÉTRICAS DE ABDOMEN AGUDO INCLUYEN EMBARAZO ECTÓPICO ROTO, ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA Y TORSIÓN DE QUISTE OVÁRICO -- [[Dolor Abdominal Agudo]]
- **N1108** (Fri Aug 21): LA PRINCIPAL CAUSA DE RETENCIÓN URINARIA EN LA MUJER ES EL PROLAPSO PÉLVICO -- [[Disfunción Genitourinaria]]