Módulo 2

CONCEPTOS BÁSICOS DE ESTADÍSTICA

Curso de Posgrado: "Modelado y estimación de ocupación para poblaciones y comunidades de especies bajo enfoque Bayesiano"

CCT CONICET Mendoza
24 - 28 Abril 2023



Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Argentina











¿QUÉ ES UN MODELO?

- Abstracción de la realidad
- Los usamos todos los días
 - Conceptuales
 - Físicos
 - Gráficos
 - Analíticos
 - Numéricos
 - Empíricos o estadísticos





Modeli	Prior weight	Likelihood ¹	Posterior weight
	$p(m_i)$	$p(x m_i)$	$p(m_i x)$
No effect	0.00001	0.00257	0.00000
Bird group	0.00001	0.02219	0.00000
Tree	0.57830	0.58101	0.16351
Tree + Bird group	0.42160	4.07702	0.83649
Forest	0.00001	0.18890	0.00000

logit
$$(\psi_i) = \alpha_{psi} + \beta_{x1} * x1_i$$

¹Likelihood values where multiplied by 1E+237 to eliminate excessive zeroes




Figura 2.1. Diagrama de flujos de las realimentaciones de diversos tipos de modelos que pueder utilizarse para comprender mejor un problema en la biología de la conservación.

(Conroy & Carroll 2009, Conroy et al. 2015)

MODELOS

- Cualitativo
 - ej. descripción general de un área
- Cuantitativo
 - Resultado preciso

- Discretos
 - ej. abundancia
- Continuos
 - ej. densidad

MODELOS

- Determinístico
 - No hay incertidumbre
- Estocástico
 - Distribuciones de probabilidad

$$A + B = C$$



$$A + B + X = C + Incertidumbre$$

CLAVES PARA ELABORAR MODELOS

- Definir claramente el objetivo
 - No incluir mas de lo necesario!
 - Escala
 - Parámetros poblacionales,







'a Defectabilidad'

CLAVES PARA ELABORAR MODELOS

- Definir componentes
 - Parámetros: lo que tratamos de estimar
 - Constante o variable
 - Fijo o aleatorio)
 - Variables
 - Respuesta o dependiente: lo que tratamos de modelar
 - Predictiva o independiente: a la derecha de la ecuación. Explicatoria.

MODELOS ESTADISTICOS

- Producir inferencias confiables para explicar el mundo natural – Resultados replicables y defendibles
 - Datos colectados siguiendo un diseño apropiado.
 - Analizar datos con un modelo apropiado: tener en cuenta el diseño y usar los principios de probabilidad y estadística para hacer inferencias válidas

MODELOS ESTADÍSTICOS

Estos modelos son construidos alrededor de valores aleatorios o **estadísticos** que son observados como datos de una muestra.

Estadísticos: Cualquier función de los datos muestreales (ej. media, varianza, percentiles)

MODELOS VERSUS REALIDAD

- En ciencias biológicas no podemos esperar encontrar la verdad exacta, o alcanzar la realidad con un set finito de datos.
 - Dimensiones infinitas vs. Muestras finitas
- El error observacional o de medición se refiere a la diferencia entre un valor medido de una cantidad y su valor verdadero

MODELOS VERSUS REALIDAD

- Inferencia basada en un buen modelo aproximado.
 - inferencia condicional a los datos
- No existe un único modelo que explique la realidad...

¿Cómo encontramos el modelo que "mejor" la explica?

 Naturaleza estocástica del mundo natural explicada por medio de variables aleatorias

Es una característica que exhibe una variabilidad entre unidades o elementos con dicha característica

- Los posibles valores de una variable aleatoria tiene valores posibles que pueden ser representados con una abstracción matemática: distribución de probabilidad
- La distribución de probabilidad le asigna a cada evento de una variable aleatoria, una probabilidad de ocurrir.

- Una probabilidad puede pensarse como una medida de incertidumbre de un evento aleatorio
 - Si X tiene P=1 de ocurrir , estamos seguros que X ocurre
 - Si P=0 entonces estamos seguros que X no ocurre
 - Si P=0.5 estamos igual de seguros que X ocurre y que no


El valor "X" es una variable aleatoria

- Es un modelo que describe la relación entre los valores de una variable aleatoria y la probabilidad de asumir esos valores
- Describe todas las posibles posibilidades de ocurrencia, para que la suma de todas las probabilidades sea 1.

- El error de observación o de medición generalmente es tratado en la estadística como normalmente distribuido con media 0
- En ecología de poblaciones y comunidades las cantidades focales como abundancia o riqueza son típicamente medidas en conteos que son menores a lo que realmente hay (nos "perdemos" individuos)
- Este error necesita otros tipos de distribuciones

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS

Histograma de la muestra (N=1000)




FUNCION DE DENSIDAD DE PROBABILIDAD (PDF)


Histograma de la muestra (

PDF

No hay valor exacto de pb. pq es continuo (densidad)



FUNCION PROBABILIDAD DE DISTRIBUCION (CDF)



Probabilidad que una variable aleatoria *X* (continua) sea menor o igual a un valor particular

FUNCIONES DE PROBABILIDAD

Las funciones de densidad (o masa) de una probabilidad (PDF o PMF)

f(y) dependen de una o mas cantidades, llamadas parámetros

Variables aleatorias discretas

Bernoulli: Dos valores posibles, 1 evento

Binomial: Dos valores posibles, > 1 evento

Multinomial >1 valor posibles, >1 evento

Poisson: Valores discretos, no negativos



puede tomar solo un número contable de valores distintos como 0, 1, 2, 3, 4, 5... 100, 1 millón, etc.

Variables aleatorias continuas

Uniforme: Probabilidad uniforme, a $\leq x \leq b$

Normal: (- , +)

Beta: 0 < x < 1

Gamma: 0 <u><</u> x < +

puede tomar un número infinito de valores posibles.


Un **estimador** de un parámetro poblacional, se basa en un muestreo aleatorio.


Estimador es una variable aleatoria con una distribución estadística.



Medidas de comportamiento estadístico de un estimador:

- Precisión: Es una medida del error del muestreo
- Sesgo: Diferencia entre el valor observado y la realidad
- Exactitud: Precisión + Sesgo





Si tratamos a una variable aleatoria continua de distribución normal (ej. Peso, altura), puede o no ser preciso, pero los errores a cada lado de la distribución en mediciones sucesiovas son iguales (insesgado)

Para conteos de variables discretas (abundancia o "presencia/ausencia")

- No es lo mismo contar de más o de menos
- Al contar de menos (no detectar un organismo) –
 Falsos negativos
- Presencia/ausencia (y) es representada por una Bernoulli (2 valores posibles, I evento)

No es insesgado (no se cancelan los errores)

BONDAD DE AJUSTE

- Diferencia entre valores esperados bajo un modelo y lo observado
- Ejemplo, test de Chi cuadrado

$$X^{2} = \sum_{i=1}^{n} \frac{(O_{i} - E_{i})^{2}}{E_{i}}$$

 χ^2 (estimado) > χ^2 (crítico/tabla) No hay ajuste

MÉTODOS PARA ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS

Métodos frecuentistas

Estiman la verosimilitud de observar los datos Se basan en la frecuencia esperada de que esos datos sean observados si el mismo procedimiento de recolección de datos y análisis fuese implementado muchas veces

TEST DE HIPÓTESIS NULA (verosimilitud de observar datos extremos p≤ 0,05)
MÉTODOS DE TEORÍA DE LA INFORMACIÓN

MÉTODO DE TEORÍA DE INFORMACIÓN (Information theoretic)

- Definición a priori del set de modelos candidatos (hipótesis)
- Los datos se utilizan pare evaluar el soporte relativo de diferentes modelos.
- El mejor modelo es aquel que pierde la menor cantidad de información.
- Compromisos entre el ajuste del modelo (+parámetros) y la varianza del estimador (parámetros = parsimonia) por medio de una optimización.

PROBABILIDAD y VEROSIMILITUD

Función de probabilidad

Parámetros, modelo, tamaño muestral -> CONOCIDO

¿Cuál es la probabilidad de observar un evento X?

$$f(x|\theta)$$

Función de verosimilitud ("Likelihood")

Datos (observados), modelo (asumido) → CONOCIDO

¿Cuál/es son los parámetros que relacionan los datos al modelo?

$$L(\theta|x)$$

 $L(\theta|datos, modelo)$

METODO DE MAXIMA VEROSIMILITUD

- Con los datos colectados queremos estimar los valores de los parámetros que los explican
- Seleccionar los valores de los parámetros para maximizar la función de verosimilitud

 $L(\theta|datos, modelo)$

MÉTODO DE MÁXIMA VEROSIMILITUD MLE ("Maximum likelihood estimation")

Ejemplo Binomial

VEROSIMILI TUD:
$$L(p | n, x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x (1-p)^{n-x}$$

$$L(p \mid n, x) = \binom{n}{x} p^{x} (1-p)^{n-x}$$

n = 10 trampas de ratones

x = 0 capturado, x = 0 no capturado


 $x = \{0,1,1,1,0,1,1,0,0,1\}$

¿Cuál es la probabilidad p de captura?

MÉTODO DE MÁXIMA VEROSIMILITUD

¿Cuál es la probabilidad p de captura?

$$L(p \mid n, x) = \binom{n}{x} p^{x} (1-p)^{n-x}$$



MÉTODO DE MÁXIMA VEROSIMILITUD

¿Cuál es la probabilidad p de captura?

$$L(p \mid n, x) = \binom{n}{x} p^{x} (1-p)^{n-x}$$

Hoja de cálculo

METODO DE MAXIMA VEROSIMILITUD (MLE)

1) Aplico In (p sigue siendo igual)

$$L(p \mid n, x) = {10 \choose 6} p^{6} (1-p)^{4}$$

$$\ln L(p \mid n, x) = \ln \binom{10}{6} + 6 \ln p + 4 \ln(1-p)$$

2) Derivo con respecto a p (busco máximo)

$$\frac{\ln L(p)}{\partial p} = \frac{6}{p} - \frac{4}{1-p} = 0$$

$$\hat{p} = 6/(6+4) = 0.6$$

REFERENCIAS

- Burnham, K. P., and D. R. Anderson. 2002. Model selection and multimodel inference: a practical information-theoretic approach. 2nd edition. Springer, New York.
- Conroy, M. J., and J. P. Carroll. 2009. Quantitative conservation of vertebrates.
 Wiley-Blackwell, Chichester, West Sussex, UK; Hoboken, NJ.
- Kéry, M. 2010. Introduction to WinBUGS for Ecologists: A Bayesian Approach to Regression, ANOVA and Related Analyses. Access Online via Elsevier.
- Marc Kery & J. Andy Royle. 2016. Applied hierarchical modeling in ecology.
 Modeling distribution, abundance and species richness using R and BUGS.
 Volume 1: Prelude and Static models. Academic Press
- Williams, B., J. Nichols, and M. Conroy. 2002. Analysis and Management of Animal Populations: Modeling, Estimation, and Decision Making. Academic Press, San Diego, CA.