

Seminarios de Cálculo

Rubén Oncala

Curso 2025/26

1 Derivadas de una variable

Para las siguientes funciones:

$$f_{\pm}(x) = 2 \pm 3x + x^2 + 7x^3$$

$$f_2(x) = \frac{1}{3x} + \frac{2}{5x^2} + \frac{4}{3x^3}$$

$$f_3(x) = \frac{5 - 15x}{2x + 5x^2}$$

$$f_4(x) = 4e^{-(3x-2)^2}$$

$$f_5(x) = \ln\left(\frac{3x}{4x^2 + 2}\right)$$

$$f_7(x) = \frac{\tan(2x)}{3x + 1}$$

$$f_6(x) = \sin(3x + 2) \cdot e^{-x^2/10}$$

- Resuelve la primera y segunda derivada.
- Encuentra los extremos relativos, calcifícalos en máximos o mínimos,
- Encuentra los puntos de inflexión.
- Determina los límites de la función, estudia discontinuidades.
- Haz un esquema de la función y comprueba tus resultados con ordenado (geogebra)

Pista: Piensa en las soluciones de las funciones trigonométricas $\sin(ax + b)$, $\cos(ax + b)$ y $\tan(ax + b)$ antes de decidir los extremos relativos.

2 Derivadas de varias variable

Para las siguientes funciones determina:

$$\text{Max:} \quad g_1(x, y) = -(x - 3)^2 - (y - 4)^2 + 10.5 \quad P = (2, 3) \quad \bar{v} = (2, -2)$$

$$\text{Min:} \quad g_2(x, y) = +(x - 3)^2 + (y - 4)^2 + 10.5 \quad P = (1, 1) \quad \bar{v} = (-2, 3)$$

$$\text{Silla:} \quad g_3(x, y) = +(x - 3)^2 - (y - 4)^2 + 10.5 \quad P = (3, 4) \quad \bar{v} = (1, 1)$$

$$g_4(x, y) = 5x^2 + 2y^2 + 3xy \quad P = (3, 4) \quad \bar{v} = (1, 1)$$

$$g_5(x, y) = 2e^{4x^2+3y^2-5} \quad P = (3, 4) \quad \bar{v} = (1, 1)$$

$$g_6(x, y, z) = x y^2 z^3 + \ln \left(\frac{xy}{z^2 - 1} \right) \quad P = (-3, 2, 2) \quad \bar{v} = (2, 4, 5)$$

- El vector gradiente.
- La dirección de mayor crecimiento de la función y el valor de la pendiente en el punto P .
- Los extremos relativos, clasifícalos en máximos, mínimos o puntos de silla.
- La derivada direccional en el punto P y en la dirección del vector \bar{v} .
- Comprueba los resultados con ordenador (geogebra).

3 Integrales y EDOS

Para las ecuaciones diferenciales con condiciones de contorno

$$\begin{array}{lll} \frac{dT}{dt} = \kappa (T - 25) & T(t = 0) = 100 & T(t = 5) = 80 \\ \frac{dM}{dt} = \kappa M (t^2 + t + 1) & M(t = 2) = 10 & M(t = 8) = 1.3 \\ \frac{dY}{dt} = Y^2 e^{-\kappa t} & Y(t = -2) = 3 & Y(t = 7) = 1 \end{array}$$

- Obtén la solución general de la ecuación.
- Obtén el valor de la constante κ para las condiciones de contorno.
- Usando la constante κ obtenida, haz predicciones para $t = 5$.