# Seminarios de Cálculo

### Rubén Oncala ruben.oncalamesa@ceu.es

Curso 2025/26

#### 1 Derivadas de una variable

Para las siguientes funciones:

$$f_1(x) = 2 + 3x + x^2 + 7x^3 \tag{1}$$

$$f_2(x) = \frac{1}{3x} + \frac{2}{5x^2} + \frac{4}{3x^3}$$

$$f_3(x) = \frac{5 - 15x}{2x + 5x^2}$$
(2)

$$f_3(x) = \frac{5 - 15x}{2x + 5x^2} \tag{3}$$

$$f_4(x) = 4e^{-(3x-2)^2} (4)$$

$$f_5(x) = \ln\left(\frac{3x}{4x^2 + 2}\right) \tag{5}$$

$$f_7(x) = \frac{\tan(2x)}{3x+1} \tag{6}$$

$$f_6(x) = \sin(3x+2) \cdot e^{-x/10} \tag{7}$$

- Resuelve la primera y segunda derivada.
- Encuentra los extremos relativos, calcifícalos en máximos o mínimos, encuentra los puntos de inflexión.
- Representa gráficamente las funciones con el ordenador, comprueba tus resultados. Haz un esquema de la función a mano.
- Determina los límites de la función, estudia discontinuidades.

Pista: Estudia con ordenador las soluciones de las funciones trigonométricas  $\sin(ax+b)$ ,  $\cos(ax+b)$  y  $\tan(ax+b)$  antes de decidir los extremos relativos.

## 2 Derivadas de varias variable

Para las siguientes funciones

$$g_1(x,y) = 5x^2 + 2y^2 + 3xy \tag{8}$$

$$g_2(x,y) = 2e^{4x^2 + 3y^2 - 5} (9)$$

$$g_3(x, y, z) = xz + yx^2 + \ln(\frac{1}{z^2 - 1})$$
(10)

- Determina el vector gradiente
- Determina la dirección de mayor crecimiento de la función y el valor de la pendiente en el punto  $P=(p_x,p_y,p_z)=(1,0,1)$ .
- Determina los límites relativos, clasifícalos
- Determina la derivada direccional en el punto P y en la dirección del vector  $V=(v_x,v_y,v_z)=(1,-2,3).$
- Representa la función y comprueba los resultados con ordenador

### Integrales y EDOS 3

Para las siguientes funciones

$$h_1(x) = 2 + 3x + 5x^3 (11)$$

$$h_2(x) = \frac{27}{30x + 10}$$

$$h_3(x) = e^{2x^2 + 5}$$
(12)

$$h_3(x) = e^{2x^2 + 5} (13)$$

- Obtén una expresión general de la primitiva
- $\bullet$  Calcula la integral definida entre los puntos  $x_1=1$  y  $x_2=5.$  Es igual al área entre la función y el eje-x?
- Representa gráficamente la función y comprueba la integral con ordenador
- Resuelve las ecuaciones diferenciales  $h'(x) = h_i(x)$ , determina la solución general h(x) y predice h(3) imponiendo la condición h(1) = 1.
- Comprueba la solución y la predicción con ordenador.