

PROTOCOLO DE RETO ORAL / REINTRODUCCIÓN PROGRESIVA

Gastroenterología Pediátrica — Plan Personalizado de Enfrentamiento

Paciente:

Fecha Nac.:

Peso / Talla:

Alimentación:

Fórmula

Fórmula Reto:

Base:

1. CONSIDERACIONES PREVIAS PARA LOS PADRES

- **Requisito de salud:** debe estar completamente sano. No inicie el reto si presenta fiebre, infección, diarrea, moco/sangre en heces o brote en piel en los últimos 7 días.
- **Lactancia Materna:** Si la madre amamanta, debe mantener la dieta de exclusión estricta durante esta semana para que la única variable sea la fórmula del tetero.
- **Horario:** Ofrezca los teteros de transición durante la mañana o tarde para vigilar su respuesta.

2. ESQUEMA DE PROGRESIÓN DIARIA (VOLUMEN DE TOMA HABITUAL:)

Modo de preparación: Vierta siempre primero las a temperatura adecuada. Luego agregue las medidas en polvo indicadas de cada fórmula y mezcle bien.

Día	Agua Base	Fórmula Base (Extensamente Hidrolizada - FEH)	Fórmula Nueva (Para Iniciar Reto)	Instrucciones
Día 1		medidas		Agregar ml de la fórmula para iniciar reto (ya lista) al tetero base.
Día 2		medidas	0 medida (polvo)	Mezclar ambas medidas en polvo en las oz de agua.
Día 3		medidas	0 medidas (polvo)	Transición al 33% de la fórmula para iniciar reto.
Día 4		medidas	0 medidas (polvo)	Transición al 50% de cada fórmula.
Día 5		medidas	0 medidas (polvo)	Predominio de la fórmula para iniciar reto (66%).
Día 6		medidas	0 medidas (polvo)	Casi total de la fórmula para iniciar reto.
Día 7+			medidas	Transición 100% completada.



SIGNOS DE ALARMA EN

— SUSPENDA EL RETO SI PRESENTA:

- **Digestivos:** Vómitos repetidos, diarrea, moco o hebras de sangre en la deposición, llanto inconsolable por cólico, distensión abdominal.
- **Cutáneos:** Brotes o ronchas en piel, enrojecimiento, inflamación de labios o párpados.
- **Respiratorios / Generales:** Dificultad para respirar, silbido al respirar, rechazo de tomas, letargo.

Conducta ante síntomas: Suspenda la fórmula para iniciar reto inmediatamente, vuelva al tetero 100% con Fórmula Extensamente Hidrolizada (FEH), registre la reacción en la tabla.

3. DIARIO DE REGISTRO DE TOLERANCIA

Día	¿Toleró Tetero?	Deposiciones (Frecuencia / Consistencia / Moco)	Observaciones (Cólicos, Piel, Sueño)
Día 1			

Día	¿Toleró Tetero?	Deposiciones (Frecuencia / Consistencia / Moco)	Observaciones (Cólicos, Piel, Sueño)
Día 2			
Día 3			
Día 4			
Día 5			
Día 6			
Día 7			

Firma / Sello Médico Gastroenterólogo Pediátrico

Teléfono / Contacto de Emergencia

Documento médico personalizado para

Válido bajo indicación y seguimiento de Gastroenterología Pediátrica.

