Logica

Mattia Nicolis Matteo Drago

A.A. 2025-26

Indice

Introduzione alla logica **5**
Numeri naturali 5

Logica proposizionale **7**
Sintassi 7
Linguaggio formale 7
Linguaggio proposizionale 7
Proposizioni 8
Funzioni ricorsive 9
Semantica 10
Proprietà di $\models$ 13
Sistemi deduttivi 15
Deduzione naturale 15
Regole deduttive per i connettivi 16
Regole della congiunzione ($\wedge$) 16
Regole della disgiunzione ($\vee$) 17
Regole dell'implicazione ($\rightarrow$) 17
Regole del bottom ($\perp$) 17

Introduzione alla logica

La **logica** si occupa di formalizzare i ragionamenti matematici utilizzando il linguaggio matematico.

Ciò è dovuto al fatto che il linguaggio naturale è ambiguo per la descrizione di teorimi.

La logica si divide in:

- **logica formale**: che a sua volta si divide in
  - *logica simbolica*
  - *Logica matematica*: studia la calcolabilità [studiata a fondamenti]
- **logica filosofica**: ha a che fare con il linguaggio naturale

Numeri naturali

Dal punto di vista intuitivo i numeri sono un insieme infinito:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$$

per i quali sono definite le operazioni standard aritmetiche elementari.

Peano definì in maniera rigorosa i numeri naturali.

Definizione: numeri naturali

I **numeri naturali** sono una tupla:

$$\langle \mathbb{N}, 0, succ \rangle$$

Su quetsa tupla, sono definite 4 assiomi (teoremi che non si dimostrano):

1. $0 \in \mathbb{N}$
2. $succ : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ (operazione unaria iniettiva)
3. $0 \notin \mathrm{Im}(succ)$ (zero non è successore di nessuno)
4. (**Principio di induzione**) per ogni $\mathbb{P} \subseteq \mathbb{N}$ valgono le seguenti proprietà:
   - $0 \in \mathbb{P}$
   - $\forall n \in \mathbb{N}, (n \in \mathbb{P} \to succ(n) \in \mathbb{P})$

   $\Rightarrow \mathbb{P} = \mathbb{N}$

Logica proposizionale

La logica è lo studio del ragionamento deduttivo su delle entità linguistiche che indentifichiamo essere le proposizioni.
La logica classica è la branca che studia le poposizioni: frasi che possono avere due valori di verità, **VERO** o **FALSO**.

Sintassi

Esempi di proposizione:

1. Verona è una città del Veneto → **proposizione VERA**
2. Glu stidenti di questa classe sono al primo anno → **proposizione FALSA**
3. Fuori sta piovendo → **proposizione FALSA**
4. Come ti chiami? → **NON è una proposizione**

Vogliamo rendere questo linguaggio formale → bisogna individuare dei simboli.
Una volta identificate le assunzioni, dobbiamo rappresentarle mediante simboli...
es: P, Q, R

Esempio:
Se c'è il sole, allora devi mettere la crema

Linguaggio formale

Dato un alfabeto A denotiamo con A^* l'insieme di tutte le stringhe su A.

Definizione: Linguaggio

Un linguaggio sull'alfabeto A è una coppia $\langle A, L \rangle$ dove $L \subseteq A^*$
- Ogni sottoinsieme di A^* definisce un linguaggio

Linguaggio proposizionale

Ha due entità sintattiche fondamentali:

- i simboli proposizionali: formalizzano generiche proposizioni elementari
- i connettivi: simboli associati ai connettivi linguistici

Proposizioni

Sono entità linguistiche che possono essere vere o false.
Si dividono in:

- elementari: nessuna stringa propria costituisce una sottostringa
- composte: composte da più sentenze tramite l'uso dei connettivi

Connettivi logici

$\rightarrow$	se ... allora
$\wedge$	and
$\vee$	or
$\leftrightarrow$	se e solo se
$\neg$	negazione
$\perp$	assurdo

Se apro la finestra **allora** farà fresco.
Io mangio **e** lui beve.
Lui è a casa **o** lavora?

Definizione: Alfabeto $\mathcal{L}$

L'alfabeto $\mathcal{L}$ della logica prop ha i seguenti simboli:
- insieme numberabile di simboli proposizionali: $AT_{prop} = \{p_0, p_1, \dots\}$
- connettivi: $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\perp$
- simboli ausiliari: servono per costruire il linguaggio ma non ne fanno parte, per esempio le parentesi tonde ()

Le proposizioni semplici vengono definite **atomi** oppure **proposizioni atomiche**.

Definizione: Appartenenza insieme prop

L'insieme prop delle proposizioni è definito come il più piccolo insieme P di stringhe su $\mathcal{L}$ tali che:
- $AT_{prop} \subseteq$ P.
- $\perp \in$ P.
- se $\phi, \psi \in$ P allora $(\phi \wedge \psi), (\phi \vee \psi), (\phi \rightarrow \psi) \in P$

Esempio:
$(p_1 \rightarrow p_2) \in$ PROP $\rightarrow$ Completa
$p_7 \vee p_4 \notin$ PROP $\rightarrow$ Mancano le parentesi
$((\perp \vee p_7) \wedge (\neg p_4)) \in$ PROP $\rightarrow$ Completa

Notazione

Chiamiamo AT $= AT_{prop} \cup \{\perp\}$
a) $\neg\phi$ denotiamo $(\phi \rightarrow \perp)$
b) $\phi \equiv \psi$ denotiamo $((\phi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \phi))$

Convenzione

1. Omettiamo le parentesi più esterne $(\psi \to \phi)$ diventa $\psi \to \phi$
2. Scriviamo $\neg\psi$ anzichè $(\neg\psi)$
3. $\wedge$ e $\vee$ legano più forte di $\to$ e $\equiv$ $\phi_1 \wedge \phi_2 \to \psi_1 \vee \psi_2$ sta per $(\phi_1 \wedge \phi_2) \to (\psi_1 \vee \psi_2)$

Funzioni ricorsive su Prop

Definizione: Funzione $\mathscr{L}$ lunghezza

Funzione $\mathscr{L}$:PROP $\to \mathbb{N}$ che ad ogni $\phi \in PROP$ associa la sua lunghezza

1. $\mathscr{L}(\phi) = 1$ se $\phi \in AT$
2. $\mathscr{L}(\phi \text{ o } \psi) = 3 + \mathscr{L}(\phi) + \mathscr{L}(\psi)$ con o $\in \{\wedge, \vee, \to\}$
3. $\mathscr{L}(\neg\phi) = 3 + \mathscr{L}(\phi)$

il **+3** indica le due parentesi tonde e il connettivo

Esercizio - Definiamo il numero di parentesi tonde in una formula

b(φ) $\to$ numero di parentesi in una formula proposizionale

- b(φ) = 0 con $\varphi \in$ AT
- b((φ o ϕ)) = 2 + b(φ) con o $\in \{\wedge, \vee, \to\}$
- b(($\neg\varphi$)) = 2 + b(φ)

Esercizio - Definizione di parsing tree

Definiamo il parsing tree di una proposizione

- T(φ) = $\cdot\varphi$ con $\varphi \in$ AT
- T(φ o ψ) = $\cdot$(T(φ), T(ψ)) con o $\in \{\wedge, \vee, \to\}$
- T($\neg\varphi$) = $\neg$(T(φ))

Una volta definito costruiamo il *parsing tree*[1] della proposizione



[1]Parsing tree: visualizzazione ad albero di una stringa

Definizione: Rango r di una formula

- $r(\varphi) = 0 \qquad \varphi \in \mathrm{AT}$
- $r(\varphi \text{ o } \psi) = 1 + \max\{r(\varphi), r(\psi)\} \qquad \text{con o} \in \{\vee, \wedge, \rightarrow\}$
- $r(\neg\varphi) = 1 + \mathrm{r}(\varphi)$

Definizione: Sottoformula Sub

- $\mathrm{Sub}(\varphi) = \{\varphi\} \qquad \varphi \in \mathrm{AT}$
- $\mathrm{Sub}(\varphi \text{ o } \psi) = \mathrm{Sub}(\varphi) \cup \mathrm{Sub}(\psi) \cup \{\varphi \text{ o } \psi\} \qquad \text{con o} \in \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$
- $\mathrm{Sub}(\neg\varphi) = \mathrm{Sub}(\varphi) \cup \{(\neg\varphi)\}$

Esercizio - Calcola il rango della seguente espressione:
$(\neg p_2 \rightarrow (p_3 \vee (p_1 \leftrightarrows p_2)))\wedge \neg p_3$

$r(\varphi \wedge \psi) = 1 + \max\{(\neg p_2 \rightarrow (p_3 \vee (p_1 \leftrightarrow p_2))), \neg p_3\}$
$r(\varphi \wedge \psi) = 1 + \max\{1+\max\{1+0, p_3 \vee (p_1 \leftrightarrow p_2)\}, 1+0\}$
$r(\varphi \wedge \psi) = 1 + \max\{1+\max\{1,1+\max\{0,0\}\},1\}$
$r(\varphi \wedge \psi) = 1 + \max\{1+\max\{1,1\},1\}$
$r(\varphi \wedge \psi) = 1 + \max\{2,1\} = 1+2 = 3$

Definizione: Numero di connettivi $\#(\varphi)$

- $\#(\varphi) = 0$
- $\#(\varphi \vee \psi) = 1 + \#\varphi + \#\psi$
- $\#(\neg\varphi) = 1 + \#\varphi$

Esercizio - Dimostrare che per ogni $\phi \in$ PROP vale $r(\phi) \leq \#\phi$

Questo è un esempio di dimostrazione per induzione:

Proposizione

Se $\phi \in \mathrm{SF}[\psi]$ e $\phi \neq \psi$ allora $r[\phi] < r[\psi]$

Semantica

La **semantica** si occupa di attribuire un significato sintattico alle proposizioni (vero - 1 o falso - 0).

Definizione: valutazione di verità

E' una funzione $\sigma : PROP \to \{0, 1\}$ tale che:

- $\sigma(\bot) = 0$
- $\sigma(\neg\varphi) = 1$ se e solo se $\sigma(\varphi) = 0$
- $\sigma(\phi \wedge \psi) \Leftrightarrow \sigma(\phi) = \sigma(\psi) = 1$
- $\sigma(\phi \vee \psi) \Leftrightarrow \sigma(\phi) = 1$ oppure $\sigma(\psi) = 1$
- $\sigma(\phi \to \psi) \Leftrightarrow \sigma(\phi) = 1$ allora $\sigma(\psi) = 1$

Questa definizione per la funzione di valutazione è pressochè la formulzazione matematica delle **tavole di verità**.

A	B	$A \wedge B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

AND

A	B	$A \vee B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

OR

A	B	$A \to B$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

IMPLICAZIONE

A	$\neg A$
0	1
1	0

NOT

Definizione: valutazione atomica

Funzione $v : AT \to \{0, 1\}$ tali che $v(\bot) = 0$

Proposizione

Per ogni valutazione v esiste ed è unica una *valutazione di verità* $[\![-]\!]_v$ tale che per ogni $p \in \mathbf{AT}$, $[\![p]\!]_v = v(p)$.

Definizione: concordanza

Dato un insieme finito P di simboli proposizionali, si dice che due valutazioni v, v' **concordano** su P se $v_{|P} = v'_{|P}$.

La proposizione precedente ci dice che l'insieme di tutte le possibili valutazione ha le stessa cardinalità di $\mathbb{N}$.

Un'altra proprietà delle valutazione è stabilita dalla seguente proposizione.

Proposizione

Se $P(\phi)$ è l'insieme dei simboli proposizionali che occorrono in una formula ϕ e v, v' due valutazioni che concordano su $P(\phi)$ allora $[\![\phi]\!]_v = [\![\phi]\!]_{v'}$.

Se un problema è vero in tutte le sue valutazioni, allora è **decidibile** e viene detto **tautologia**.

Si estende la valutazione di verità a un insieme arbitrario di proposizioni Γ:

$$[\![\Gamma]\!]_v = 1 \text{ se e solo se per ogni } \alpha \in \Gamma,\ [\![\alpha]\!]_v = 1$$

Tuttavia si pone attenzione al fatto che se $[\![\phi]\!]_v \neq 1$, allora non significa che per ogni $\alpha \in \Gamma$ si ha $[\![\alpha]\!]_v = 0$, al contrario si intende che esiste almeno un $\alpha \in \Gamma$ tale per cui $[\![\alpha]\!]_v = 0$.

Viceversa è più forte affermare che $[\![\Gamma]\!]_v = 0$, in quanto per questo caso ogni $\alpha \in \Gamma$ ha valutazione $[\![\alpha]\!]_v = 0$.

Partendo dal concetto di valutazione dell formule, è possibile definire cosa significhi che da un insieme Γ di proposizioni **segue logicamente** una proposizione φ, o in altre parole che φ sia **conseguenza logica** di Γ.

Definizione: conseguenza logica

Dato un insieme Γ di formule, si dice che la formual φ è conseguenza logica dalle formule in Γ e si scrive $\Gamma \models \varphi$, se per ogni valutazione v, $[\![\Gamma]\!]_v = 1 \Rightarrow [\![\varphi]\!]_v = 1$.

La formula φ è detta **soddisfacibile** se esiste una valutazione v tale che $[\![\varphi]\!]_v = 1$, altrimenti risulta essere **insoddisfacibile**.

A sua volta un insieme di formule Γ è soddisfacibile se esiste una valutazione v tale che per ogni $\varphi \in \Gamma$ si ha $[\![\Gamma]\!]_v = 1$, altrimenti si dice insoddisfacibile.

Notazione

- si scrive $\models \varphi$ al posto di $\phi \models \varphi$
- si scrive $\psi_1, \ldots, \psi_n \models \varphi$ al posto di $\{\psi_1, \ldots, \psi_n\} \models \varphi$
- Γ, Σ, Δ sono insiemi arbitrari di formule
- si scrive $\Gamma, \Sigma, \psi \models \varphi$ al posto di $\Gamma \cup \Delta \cup \{\psi\} \models \varphi$

Esercizio - $\models \neg\neg\varphi \to \varphi$ è una tautologia?

Dimostrazione: per ogni valutazione v.$[\![\neg\neg\varphi \to \varphi]\!]_v = 1$

$$\begin{aligned}
[\![\neg\neg\varphi \to \varphi]\!]_v = 1 \quad & \leftrightarrow \underline{[\![\neg\neg\varphi]\!]_v = 0} \text{ oppure } [\![\varphi]\!]_v = 1 \\
& \leftrightarrow \underline{[\![\neg\varphi]\!]_v = 1} \text{ oppure } [\![\varphi]\!]_v = 1 \\
& \leftrightarrow \underline{[\![\varphi]\!]_v = 0} \text{ oppure } [\![\varphi]\!]_v = 1
\end{aligned}$$

La formula è **sempre vera**

Esercizio - $\models (\varphi \to \psi) \vee (\psi \to \varphi)$ è una tautologia?

Dimostrazione: per ogni valutazione v.$[\![(\varphi \to \psi) \vee (\psi \to \varphi)]\!]_v = 1$

$$[\![(\varphi \to \psi) \vee (\psi \to \varphi)]\!]_v = 1 \quad \leftrightarrow \underline{[\![\varphi \to \psi]\!]_v = 0} \text{ oppure } \underline{[\![\psi \to \varphi]\!]_v = 1}$$

$\leftrightarrow$ ($[\![\varphi]\!]_v = 0$ oppure $[\![\psi]\!]_v = 1$) oppure ($[\![\psi]\!]_v = 0$ oppure $[\![\varphi]\!]_v = 1$)

La formula è **sempre vera**

Questo sotto è un esercizio che non ho capito (spero sia impostato correttamente)

Esercizio - Risolvere $\varphi \to \psi, \neg\psi \models \neg\varphi$

Dimostrazione: per ogni valutazione v se $[\![\varphi \to \psi]\!]_v = 1$ e $[\![\neg\psi]\!]_v = 1$ allora $[\![\neg\varphi]\!]_v = 1$
$[\![\varphi \to \psi]\!]_v = 1 \Leftrightarrow [\![\varphi]\!]_v = 0$ oppure $[\![\psi]\!]_v = 1$
$[\![\neg\psi]\!]_v = 1 \Leftrightarrow [\![\varphi]\!]_v = 0$
[$[\![\varphi]\!]_v = 0$ oppure $[\![\psi]\!]_v = 1$] $\Rightarrow [\![\varphi]\!]_v = 0$ e $[\![\psi]\!]$ oppure ($[\![\psi]\!]_v = 1$ e $[\![\psi]\!]_v = 0$)
$\to [\![\varphi]\!]_v = 0 \Rightarrow [\![\neg\varphi]\!]_v = 1$

Proprietà di $\models$

1. $\Gamma \models \psi$ e $\Delta . \psi \models \varphi \Rightarrow \Gamma, \Delta \models \varphi$
2. $\Gamma \models \varphi \vee \psi$ e $\Delta, \varphi \models \delta$ e $\varepsilon, \psi \models \delta \Rightarrow \Gamma, \Delta, \varepsilon \models \Gamma$

Dimostrazione 1

- $\Gamma \models \psi \leftrightarrow$ Per ogni valutazione v.$[\![\Gamma]\!]_v = 1 \to [\![\psi]\!]_v = 1$
- $\Delta, \psi \models \leftrightarrow$ Per ogni valutazione v.$[\![\Delta]\!]_v = 1$ e $[\![\psi]\!]_v = 1 \to [\![\varphi]\!]_v = 1$
  $\Rightarrow [\![\Gamma, \Delta]\!]_v = 1 \Rightarrow [\![\varphi]\!]_v = 1$

Dimostrazione 2

Ipotesi: $[\![\Gamma]\!]_v = 1 = [\![\Delta]\!]_v = [\![\varepsilon]\!]_v \Rightarrow [\![\delta]\!]_v = 1$

$[\![\varphi \vee \psi]\!]_v = 1$

$[\![\varphi]\!]_v = 1$ OR $[\![\psi]\!]_v = 1$

Bisogna procedere per casi:

- Se $[\![\varphi]\!]_v = 1$ allora siccome $[\![\Delta]\!]_v = 1$ allora $[\![\delta]\!]_v = 1$
- Se $[\![\psi]\!]_v = 1$ allora siccome $[\![\varepsilon]\!]_v = 1$ allora $[\![\delta]\!]_v = 1$

Esercizio - Utilizziamo le regole semantiche per dimostrare:
$\varphi_1 \wedge \varphi_2 \leftrightarrow \varphi_1' \wedge \varphi_2'$ **che è come scrivere** $\varphi_1 \wedge \varphi_1' \leftrightarrow \varphi_2 \wedge \varphi_2'$

- $\models \varphi_1 \wedge \varphi_2 \to \varphi_1' \wedge \varphi_2'$ ovvero $[\![\varphi_1 \wedge \varphi_2]\!]_v = 1 \Rightarrow [\![\varphi_1' \wedge \varphi_2']\!]_v = 1$

Dimostrazione: $[\![\varphi_1]\!]_v = 1$ e $[\![\varphi_2]\!]_v = 1 \quad \Rightarrow \quad [\![\varphi_1' \wedge \varphi_2']\!]_v = 1$

- $[\![\varphi_1]\!]_v = 1$ e $[\![\varphi_1 \wedge \varphi_1']\!]_v = 1 \quad \Rightarrow \quad [\![\varphi_1']\!]_v = 1$
  $[\![\varphi]\!]_v = 1 \Rightarrow [\![\varphi_1']\!]_v = 1$

- $[\![\varphi_2]\!]_v = 1$ e $[\![\varphi_2 \to \varphi_2']\!]_v = 1 \Rightarrow [\![\varphi_2']\!]_v = 1$
  $[\![\varphi_2]\!]_v = 1 \Rightarrow [\![\varphi_2']\!]_v = 1$
  $\Rightarrow [\![\varphi_1' \wedge \varphi_1']\!]$

Definizione: Sostituzione

Siano ψ e γ due formule e sia p $\in$ Prop. Si definisce $\psi[\mathbf{p}/\gamma]$ la formula ottenuta sostituendo nella stringa ψ ogni occorrenza di **p** con la stringa corrispondente a ψ.

Teorema - Sostituzione

Siano $\varphi, \gamma_1.\gamma_2 \in$ Prop e sia p una proposizione atomica.
Se $\models \gamma_1 \leftrightarrow \gamma_2$ allora $\models \varphi[p/\gamma_1] \leftrightarrow \varphi[p/\gamma_2]$

Dimostrazione (per induzione) su φ
Base: Sia $\varphi \in$ **AT**. Abbiamo due casi:

1. se $\varphi \neq \mathbf{p}$ allora $\varphi[\mathbf{p}/\gamma_1] = \varphi[\mathbf{p}/\gamma_2] = \varphi$ e quindi ovviamente $\models \varphi \equiv \varphi$
2. se $\varphi = \mathbf{p}$ allora $\varphi[\mathbf{p}/\gamma_1] = \gamma_1$ e $\varphi[\mathbf{p}/\gamma_2] = \gamma_2$ e quindi per ipotesi $\models \varphi[\mathbf{p}/\gamma_1] \equiv \varphi[\mathbf{p}/\gamma_1]$

Passo induttivo: Esaminiamo i vari casi
$(\varphi = \varphi_1 \to \varphi_2)$ Per ipotesi induttiva:
$\models \varphi_1[\mathbf{p}/\gamma_1] \equiv \varphi_1[\mathbf{p}/\gamma_2]$ e $\models \varphi_2[\mathbf{p}/\gamma_1] \equiv \varphi_2[\mathbf{p}/\gamma_2]$.
Ora abbiamo che $\models \varphi_1[\mathbf{p}/\gamma_1] \to \varphi[\mathbf{p}/\gamma_1] \equiv \varphi_1[\mathbf{p}/\gamma_2] \to \varphi_2[\mathbf{p}/\gamma_2]$.
Dato che $\varphi[\mathbf{p}/\gamma_1] = \varphi_1[\mathbf{p}/\gamma_1] \to \varphi_2[\mathbf{p}/\gamma_1]$ e $\varphi[\mathbf{p}/\gamma_2] = \varphi_1[\mathbf{p}/\gamma_2] \to \varphi_2[\mathbf{p}/\gamma_2]$
$(\varphi = \varphi_1 \wedge \varphi_2)$, $(\varphi = \varphi_1 \vee \varphi_2)$ Il ragionamento è analogo al caso precedente

Come risolvere le tautologie?

- Metodo 1: Utilizzare le tavole di verità $\to$ dispendioso
- Metodo 2: Utilizzare la semantica $\to$ da utilizzare in esame

Esercizio - $\models \varphi((\psi \to \sigma) \to ((\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \sigma)))$

$\models \delta \Leftrightarrow \forall$v $[\![\delta]\!]_v = 1 \Leftrightarrow ([\![\varphi]\!]_v = 1 \to [\![(\psi \to \sigma) \to (\ (\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \sigma)\ )\ ]\!]_v = 1)$
$[\![\psi \to \sigma]\!]_v = 1 \quad \Leftrightarrow \quad ([\![\varphi \to \psi]\!]_v = 1 \to [\![\varphi \to \sigma]\!]_v = 1)$
$[\![\psi \to \sigma]\!]_v = 0$ OR $[\![\varphi \to \psi]\!]_v = 0$ OR $[\![\varphi \to \sigma]\!]_v = 1$

Sistemi deduttvi

L'approcio non semantico alla logica proposizionale si basa sul concetto di **dimostrazione formale** come *deduzione*.

Definizione: sistema deduttivo

Fornisce un insieme di regole per costruire dimostrazioni formali che permettono di derivare una conclusione a partire da alcune premesse.

Quando si enuncia un **teorema** deve sempre esistere la sua **dimostrazione**.

Definizione: dimostrazione

Sequenza finita di passi logici formalemte corretti che permettono di arrivare alla **tesi** a partire dalle **ipotesi** (note anche come **premesse** o **assunzioni**).

$$\left.\begin{array}{c}\text{Ipotesi / premesse / assunzioni}\\ \vdots \\ \text{Tesi}\end{array}\right\}\text{Dimostrazione / Derivazione}$$

Tra le ipotesi e la tesi esiste una serie finita di passi indicati con ⋮che consete la cosidetta **deduzione**.

Deduzione naturale

La **deduzione naturale** è una metologia di ragionamento per costruire dimostrazioni formali basata su regole di inferenza che riflettono il modo naturale di ragionare.

Per tanto non si valutano più i valori di verità delle formule, ma si considera la loro struttura sintattica. stabilendeo delle:

- **assunzioni**: prese temporaneamente come vere
- **derivazioni** sulle formule applicando delle leggi: l'applicazione di una regola si chiama *passo di derivazione*
- **scaricamento** delle assunzioni: quando si arriva alla tesi, le assunzioni vengono eliminate

Tutte le derivazioni vengono rappresentate graficamente tramite gli **alberi di derivazione**, nei quali:

- **foglie**: rappresentano le *ipotesi*
- **nodi interni**: rappresentano i *passi di derivazione*
- **radice**: rappresenta la *tesi* da dimostrare

Definizione: derivazione completa

Una derivazione si dice completa se non ci sono più foglie aperte (tutte le assunzioni sono state scaricate).

Dimostrare $p \wedge q \vdash q \wedge p$

$$
\begin{array}{ccc}
 & q \wedge p & \\
 & / \quad \backslash & \\
 & q \qquad p & \\
\text{Assunzione} & | \qquad\quad | & \text{Assunzione} \\
 & p \wedge q \quad p \wedge q &
\end{array}
$$

Regole deduttive per i connettivi

Le **regole di derivazione** si divisono in due tipologie:

- **regole di introduzione**: le premesse vengono collegate da un connettivo logico introdotto
- **regole di eliminazione**: dalle premesse si può eliminare un connettivo logico

$$\frac{\text{premesse}}{\text{conclusione}} \quad \text{(nome regola)}$$

Le formule presenti all'interno delle parentesi [ ] sono delle ipotesi scaricate (assunte) da una specifica regola di derivazione utilizzata.

Per specificare a quale regola si riferiscono è necessario indicare un indice numerico.

Regole della congiunzione ($\wedge$)

Definizione: regole della congiunzione

$$\frac{\begin{array}{cc}\mathcal{D}_1 & \mathcal{D}_2 \\ \alpha & \beta\end{array}}{\alpha \wedge \beta}\ \boldsymbol{\wedge I} \qquad \frac{\begin{array}{c}\mathcal{D} \\ \alpha \wedge \beta\end{array}}{\alpha}\ \boldsymbol{\wedge E_l} \qquad \frac{\begin{array}{c}\mathcal{D} \\ \alpha \wedge \beta\end{array}}{\beta}\ \boldsymbol{\wedge E_r}$$

Nell'eliminazione dell'and ($\boldsymbol{\wedge E}$) è importante indicare il lato che si elimina con ($\boldsymbol{\wedge E_l}$) oppure ($\boldsymbol{\wedge E_r}$)

regola di introduzione dell'$\wedge$: se dalla derivazione $\mathcal{D}_1$ e $\mathcal{D}_2$ si arriva rispettivamente a ottenere α e β, allora si può derivare $\alpha \wedge \beta$ introducendo il connettivo dell'$\wedge$

regola di eliminazione dell'$\wedge$: se dalla derivazione $\mathcal{D}$ si arriva alla formula $\alpha \wedge \beta$, allora è possibile rimuovere il connettivo e concludere solo uno dei due rami

Esercizio

Dato il teorema $\vdash \alpha \to (\alpha \wedge \alpha)$, la sua dimostrazione naturale consiste in:

$$\dfrac{\dfrac{[\alpha]^1 \quad [\alpha]^1}{\alpha \wedge \alpha}\ \wedge I}{\alpha \to (\alpha \wedge \alpha)}\ \to I^1$$

Ipotesi da scaricare: $[\alpha]^1$

Regole della disgiunzione ($\vee$)

Definizione: regole della disgiunzione

$$\dfrac{\begin{array}{c}\mathcal{D}\\ \alpha\end{array}}{\alpha \vee \beta}\ \vee \boldsymbol{I_l} \qquad \dfrac{\begin{array}{c}\mathcal{D}\\ \beta\end{array}}{\alpha \vee \beta}\ \vee \boldsymbol{I_r} \qquad \dfrac{\begin{array}{c}\mathcal{D}_1\\ \alpha \vee \beta\end{array} \quad \begin{array}{c}[\alpha]^k\\ \mathcal{D}_2\\ \gamma\end{array} \quad \begin{array}{c}[\beta]^k\\ \mathcal{D}_3\\ \gamma\end{array}}{\gamma}\ \vee \boldsymbol{E}$$

Nell'introduzione dell'or ($\vee \boldsymbol{I}$) è importante indicare il lato che si introduce con ($\vee \boldsymbol{I_l}$) oppure ($\vee \boldsymbol{I_r}$)

Regole dell'implicazione ($\to$)

Definizione: regole dell'implicazione

$$\dfrac{\begin{array}{c}[\alpha]^k\\ \mathcal{D}\\ \beta\end{array}}{\alpha \to \beta}\ \to \boldsymbol{I^k} \qquad \dfrac{\begin{array}{c}\mathcal{D}_1\\ \alpha\end{array} \quad \begin{array}{c}\mathcal{D}_2\\ \alpha \to \beta\end{array}}{\beta}\ \to \boldsymbol{E}$$

Mentre per l'introduzione dell'implicazione ($\to \boldsymbol{I^k}$) l'ipotesi è tendenzialmente l'elemento di destra, l'eliminazione ($\to \boldsymbol{E}$) si può avere sia per β che per α, basterà cambiare le deduzioni.

Regole del bottom ($\perp$)

Definizione: regole del bottom

$$\dfrac{\perp}{\to \varphi}\ \to \boldsymbol{I^k} \qquad \dfrac{\begin{array}{c}\neg\varphi\\ \vdots\\ \perp\end{array}}{\varphi}\ \boldsymbol{RAA}$$

Osservazione $\neg\varphi \equiv \varphi \to \bot$ di conseguenza, $\neg\neg\varphi \equiv \neg\varphi \to \bot$

$$\dfrac{\begin{array}{c}[\varphi]^1\\ \vdots\\ \bot\end{array}}{\varphi \to \bot} \to \boldsymbol{I^1} \qquad\qquad \dfrac{\begin{array}{c}[\neg\varphi]^1\\ \vdots\\ \bot\end{array}}{\neg\varphi \to \bot} \to \boldsymbol{I^1}$$

Ipotesi da scaricare: $[\varphi]^1$ Ipotesi da scaricare: $[\neg\varphi]^1$

Dimostrazione: $\models \neg\neg\varphi \leftrightarrow \varphi$ è come scrivere $\models (\neg\neg\varphi \to \varphi) \wedge (\varphi \to \neg\neg\varphi)$

Esercizio - Deduzione naturale: $\models \neg\neg\varphi \leftrightarrow \varphi$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg\neg\varphi]^1\ [\neg\varphi]^2}{\bot}\to E}{\varphi}RAA^2}{\neg\neg\varphi \to \varphi}\to I^1 \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg\varphi]^4\ [\varphi]^3}{\bot}\to E}{\neg\neg\varphi}\to I^4}{\varphi \to \neg\neg\varphi}\to I^3}{\neg\neg\varphi \leftrightarrow \varphi}\wedge I$$

Ipotesi da scaricare: $[\neg\neg\varphi]^1$ $[\neg\varphi]^2$ $[\varphi]^3$ $[\neg\varphi]^4$

Le ipotesi individuate in un ramo della deduzione **devono** essere scaricare all'interno di quel ramo.

Le deduzioni naturali possono sia essere risolte attraverso la tecnica del bottom-up (a mio parare più semplice), che attraverso l'up-bottom. In alcuni casi l'utilizzo di entrambe è consigliato per poter individuare a pieno i passaggi.

Principio del terzo escluso

$\vdash \varphi \vee \varphi$ $\qquad [\![\neg\varphi \vee \neg\varphi]\!]_v = 1$ **if** $[\![\varphi]\!]_v = 1$ **oppure** $[\![\neg\varphi]\!]_v = 1 \Leftrightarrow [\![\varphi]\!]_v = 0$

quindi $[\![\varphi]\!]_v = 1$ oppure $[\![\varphi]\!]_v = 0 \to$ è una tautologia

Osserviamo questa cosa svolgendone la deduzione naturale

Esercizio - Deduzione naturale: $\vdash \varphi \vee \varphi$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad \dfrac{[\neg\varphi]^2}{(\varphi \vee \neg\varphi)}\,\vee I_l}{\bot}\,\to E}{\varphi}\,RAA^2}{(\varphi \vee \neg\varphi)}\,\vee I_l \quad [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1}{\bot}\,\to E}{\varphi \vee \neg\varphi}\,RAA^1$$

Ipotesi da scaricare:
$[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad [\neg\varphi]^2$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad \dfrac{[\varphi]^2}{(\varphi \vee \neg\varphi)}\,\vee I_l}{\bot}\,\to E}{\neg\varphi}\,\to I^2}{(\varphi \vee \neg\varphi)}\,\vee I_r \quad [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1}{\bot}\,\to E}{\varphi \vee \neg\varphi}\,RAA^1$$

Ipotesi da scaricare:
$[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad [\varphi]^2$

Leggi di De Morgan

1. $\vdash \neg(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow \neg\varphi \vee \neg\phi$

   può essere scritto come: $\neg(\varphi \wedge \psi) \to \neg\varphi \vee \neg\psi \quad \vee \quad \neg\varphi \vee \neg\psi \to \neg(\varphi \wedge \psi)$

Esercizio - Deduzione naturale: $\neg(\varphi \wedge \psi) \to \neg\varphi \vee \neg\psi$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg(\varphi \vee \psi)]^1 \quad \dfrac{[\varphi]^4 \quad [\psi]^3}{(\varphi \wedge \psi)}\,\wedge I}{\bot}\,\to E}{\neg\varphi}\,\to I^4}{(\neg\varphi \vee \neg\psi)}\,\vee I_l \quad [\neg(\neg\varphi \vee \neg\psi)]^2}{\bot}\,\to E}{(\neg\psi)}\,\to I^3}{(\neg\varphi \vee \neg\psi)}\,\vee I_r \quad [\neg(\neg\varphi \vee \neg\psi)]^2}{\bot}\,\to E}{(\neg\varphi \vee \neg\psi)}\,RAA^2}{\neg(\varphi \wedge \psi) \to (\neg\varphi \vee \neg\psi)}\,\to I^1$$

Ipotesi da scaricare: $[\neg(\varphi \wedge \psi)]^1 \quad [\neg(\neg\varphi \vee \neg\psi)]^2 \quad [\psi]^3 \quad [\varphi]^4$

Esercizio - Deduzione naturale: $\neg\varphi \vee \neg\psi \to \neg(\varphi \wedge \psi)$

$$
\dfrac{\dfrac{[\neg\varphi \vee \neg\psi]^1 \quad \dfrac{\dfrac{[\neg\varphi]^2 \quad \dfrac{[\varphi \wedge \psi]^3}{\varphi}\wedge E_l}{\bot}\to E}{\neg(\varphi \wedge \psi)}\to I^3 \quad \dfrac{\dfrac{[\neg\psi]^2 \quad \dfrac{[\varphi \wedge \psi]^3}{\psi}\wedge E_r}{\bot}\to E}{\neg(\varphi \wedge \psi)}\to I^4}{\neg(\varphi \wedge \psi)}\vee E^2}{\neg\varphi \vee \neg\phi \to \neg(\varphi \wedge \psi)}\to I^1
$$

Ipotesi da scaricare: $[\neg\varphi \vee \neg\psi]^1 \quad [\neg\varphi]^2 \quad [\neg\psi]^2 \quad [\varphi \wedge \psi]^3$

Definizione rigorosa delle Deduzioni:

Derivazioni come alberi:

Possiamo individuare le diverse componenti in una deduzione:

$$
\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\varphi]^1 \quad \dfrac{\alpha}{\varphi \to \psi}\wedge E}{\psi}\to E \quad \dfrac{\dfrac{\alpha}{\varphi \to \delta}\wedge E \quad [\varphi]^1}{\delta}\to E}{\psi \wedge \delta}\wedge I}{\varphi \to (\psi \to \delta)}\to I^1
$$

Ipotesi da scaricare: $[\varphi]^1$

Definizione: Insieme delle derivazioni

L'insieme delle derivazioni $\mathcal{D}$ è il più piccolo insieme X tale che:

- per ogni $\varphi \in PROP$ la derivazione composta da una sola formula φ è in X;
- se $\sqcap_1$ su φ, $\sqcap_2$ su $\psi \in$ X allora:

$$
\dfrac{\begin{matrix}\sqcap_1 & \sqcap_2\\ \varphi & \psi\end{matrix}}{\varphi \wedge \psi}\,(\wedge I)
$$

- se $\sqcap$ su $\varphi \wedge \psi \in$ X allora:

$$
\dfrac{\begin{matrix}\sqcap\\ \varphi \wedge \psi\end{matrix}}{\varphi}\wedge_1 E \qquad \dfrac{\begin{matrix}\sqcap\\ \varphi \wedge \psi\end{matrix}}{\psi}\wedge_2 E
$$

- se ψ su $\sqcap$ su φ allora:

$$
\dfrac{\begin{matrix}[\psi]\\ \sqcap\\ \varphi\end{matrix}}{\psi \to \varphi}\to I
$$

- se $\sqcap_1$ su φ, $\sqcap_2$ su $\varphi \to \psi \in$ X allora:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\sqcap_1\\ \varphi\end{array} \qquad \begin{array}{c}\sqcap_2\\ \varphi \to \psi\end{array}}{\psi} \to E$$

- se $\sqcap$ su $\varphi \in$ X allora:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\sqcap\\ \varphi\end{array}}{\varphi \vee \psi} \vee I \qquad \dfrac{\begin{array}{c}\sqcap\\ \varphi\end{array}}{\psi \vee \varphi} \vee I$$

- se $\sqcap$ su $\varphi \vee \psi$, se φ su $\sqcap_1$ su γ, se ψ $\sqcap_2$ su $\gamma \in$ X allora:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\sqcap\\ \varphi \vee \psi\end{array} \qquad \begin{array}{c}[\varphi]\\ \sqcap_1\\ \delta\end{array} \qquad \begin{array}{c}[\psi]\\ \sqcap\\ \delta\end{array}}{\delta} \vee E$$

- se $\neg\psi$ su $\sqcap$ su $\perp \in$ allora:

$$\dfrac{\begin{array}{c}[\neg\psi]\\ \sqcap\\ \perp\end{array}}{\psi} \perp_c$$

- se $\sqcap$ su $\perp \in$ X allora:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\sqcap\\ \perp\end{array}}{\psi} \perp_i$$