Logica

Mattia Nicolis Matteo Drago

A.A. 2025-26

Indice

Introduzione alla logica **5**
Numeri naturali 5

Logica proposizionale **7**
Sintassi 7
Linguaggio formale 7
Linguaggio proposizionale 7
Proposizioni 8
Funzioni ricorsive 9
Semantica 10
Proprietà di $\models$ 13
Sistemi deduttivi 15
Deduzione naturale 15
Regole deduttive per i connettivi 16
Regole della congiunzione ($\wedge$) 16
Regole della disgiunzione ($\vee$) 17
Regole dell'implicazione ($\rightarrow$) 17
Regole del bottom ($\perp$) 17
Principio del terzo escluso 19
Leggi di De Morgan 19
Correttezza e completezza 21
Correttezza 21
Completezza 22
Correttezza e Completezza nel sistema con tutti i connettivi 27

Introduzione alla logica

La **logica** si occupa di formalizzare i ragionamenti matematici utilizzando il linguaggio matematico.

Ciò è dovuto al fatto che il linguaggio naturale è ambiguo per la descrizione di teorimi.

La logica si divide in:

- **logica formale**: che a sua volta si divide in
  - *logica simbolica*
  - *Logica matematica*: studia la calcolabilità [studiata a fondamenti]
- **logica filosofica**: ha a che fare con il linguaggio naturale

Numeri naturali

Dal punto di vista intuitivo i numeri sono un insieme infinito:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$$

per i quali sono definite le operazioni standard aritmetiche elementari.

Peano definì in maniera rigorosa i numeri naturali.

Definizione: numeri naturali

I **numeri naturali** sono una tupla:

$$\langle \mathbb{N}, 0, succ \rangle$$

Su quetsa tupla, sono definite 4 assiomi (teoremi che non si dimostrano):

1. $0 \in \mathbb{N}$
2. $succ : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ (operazione unaria iniettiva)
3. $0 \notin \mathrm{Im}(succ)$ (zero non è successore di nessuno)
4. (**Principio di induzione**) per ogni $\mathbb{P} \subseteq \mathbb{N}$ valgono le seguenti proprietà:
   - $0 \in \mathbb{P}$
   - $\forall n \in \mathbb{N}, (n \in \mathbb{P} \to succ(n) \in \mathbb{P})$

   $\Rightarrow \mathbb{P} = \mathbb{N}$

Logica proposizionale

La logica è lo studio del ragionamento deduttivo su delle entità linguistiche che indentifichiamo essere le proposizioni.
La logica classica è la branca che studia le poposizioni: frasi che possono avere due valori di verità, **VERO** o **FALSO**.

Sintassi

Esempi di proposizione:

1. Verona è una città del Veneto → **proposizione VERA**
2. Glu stidenti di questa classe sono al primo anno → **proposizione FALSA**
3. Fuori sta piovendo → **proposizione FALSA**
4. Come ti chiami? → **NON è una proposizione**

Vogliamo rendere questo linguaggio formale → bisogna individuare dei simboli.
Una volta identificate le assunzioni, dobbiamo rappresentarle mediante simboli...
es: P, Q, R

Esempio:
Se c'è il sole, allora devi mettere la crema

Linguaggio formale

Dato un alfabeto A denotiamo con A^* l'insieme di tutte le stringhe su A.

Definizione: Linguaggio

Un linguaggio sull'alfabeto A è una coppia $\langle A, L \rangle$ dove $L \subseteq A^*$
- Ogni sottoinsieme di A^* definisce un linguaggio

Linguaggio proposizionale

Ha due entità sintattiche fondamentali:

- i simboli proposizionali: formalizzano generiche proposizioni elementari
- i connettivi: simboli associati ai connettivi linguistici

Proposizioni

Sono entità linguistiche che possono essere vere o false.
Si dividono in:

- elementari: nessuna stringa propria costituisce una sottostringa
- composte: composte da più sentenze tramite l'uso dei connettivi

Connettivi logici

$\rightarrow$	se ... allora
$\wedge$	and
$\vee$	or
$\leftrightarrow$	se e solo se
$\neg$	negazione
$\perp$	assurdo

Se apro la finestra **allora** farà fresco.
Io mangio **e** lui beve.
Lui è a casa **o** lavora?

Definizione: Alfabeto $\mathcal{L}$

L'alfabeto $\mathcal{L}$ della logica prop ha i seguenti simboli:
- insieme numberabile di simboli proposizionali: $AT_{prop} = \{p_0, p_1, \dots\}$
- connettivi: $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\perp$
- simboli ausiliari: servono per costruire il linguaggio ma non ne fanno parte, per esempio le parentesi tonde ()

Le proposizioni semplici vengono definite **atomi** oppure **proposizioni atomiche**.

Definizione: Appartenenza insieme prop

L'insieme prop delle proposizioni è definito come il più piccolo insieme P di stringhe su $\mathcal{L}$ tali che:
- $AT_{prop} \subseteq$ P.
- $\perp \in$ P.
- se $\phi, \psi \in$ P allora $(\phi \wedge \psi), (\phi \vee \psi), (\phi \rightarrow \psi) \in P$

Esempio:
$(p_1 \rightarrow p_2) \in$ PROP $\rightarrow$ Completa
$p_7 \vee p_4 \notin$ PROP $\rightarrow$ Mancano le parentesi
$((\perp \vee p_7) \wedge (\neg p_4)) \in$ PROP $\rightarrow$ Completa

Notazione

Chiamiamo AT $= AT_{prop} \cup \{\perp\}$
a) $\neg\phi$ denotiamo $(\phi \rightarrow \perp)$
b) $\phi \equiv \psi$ denotiamo $((\phi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \phi))$

Convenzione

1. Omettiamo le parentesi più esterne $(\psi \to \phi)$ diventa $\psi \to \phi$
2. Scriviamo $\neg\psi$ anzichè $(\neg\psi)$
3. $\wedge$ e $\vee$ legano più forte di $\to$ e $\equiv$ $\phi_1 \wedge \phi_2 \to \psi_1 \vee \psi_2$ sta per $(\phi_1 \wedge \phi_2) \to (\psi_1 \vee \psi_2)$

Funzioni ricorsive su Prop

Definizione: Funzione $\mathscr{L}$ lunghezza

Funzione $\mathscr{L}$:PROP $\to \mathbb{N}$ che ad ogni $\phi \in PROP$ associa la sua lunghezza

1. $\mathscr{L}(\phi) = 1$ se $\phi \in AT$
2. $\mathscr{L}(\phi \text{ o } \psi) = 3 + \mathscr{L}(\phi) + \mathscr{L}(\psi)$ con o $\in \{\wedge, \vee, \to\}$
3. $\mathscr{L}(\neg\phi) = 3 + \mathscr{L}(\phi)$

il **+3** indica le due parentesi tonde e il connettivo

Esercizio - Definiamo il numero di parentesi tonde in una formula

b(φ) $\to$ numero di parentesi in una formula proposizionale

- b(φ) = 0 con $\varphi \in$ AT
- b((φ o ϕ)) = 2 + b(φ) con o $\in \{\wedge, \vee, \to\}$
- b(($\neg\varphi$)) = 2 + b(φ)

Esercizio - Definizione di parsing tree

Definiamo il parsing tree di una proposizione

- T(φ) = $\cdot\varphi$ con $\varphi \in$ AT
- T(φ o ψ) = $\cdot$(T(φ), T(ψ)) con o $\in \{\wedge, \vee, \to\}$
- T($\neg\varphi$) = $\neg$(T(φ))

Una volta definito costruiamo il *parsing tree*[1] della proposizione



[1]Parsing tree: visualizzazione ad albero di una stringa

Definizione: Rango r di una formula

- $r(\varphi) = 0 \qquad \varphi \in \mathrm{AT}$
- $r(\varphi \text{ o } \psi) = 1 + \max\{r(\varphi), r(\psi)\} \qquad \text{con o} \in \{\vee, \wedge, \rightarrow\}$
- $r(\neg\varphi) = 1 + \mathrm{r}(\varphi)$

Definizione: Sottoformula Sub

- $\mathrm{Sub}(\varphi) = \{\varphi\} \qquad \varphi \in \mathrm{AT}$
- $\mathrm{Sub}(\varphi \text{ o } \psi) = \mathrm{Sub}(\varphi) \cup \mathrm{Sub}(\psi) \cup \{\varphi \text{ o } \psi\} \qquad \text{con o} \in \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$
- $\mathrm{Sub}(\neg\varphi) = \mathrm{Sub}(\varphi) \cup \{(\neg\varphi)\}$

Esercizio - Calcola il rango della seguente espressione:
$(\neg p_2 \rightarrow (p_3 \vee (p_1 \leftrightarrows p_2)))\wedge \neg p_3$

$r(\varphi \wedge \psi) = 1 + \max\{(\neg p_2 \rightarrow (p_3 \vee (p_1 \leftrightarrow p_2))), \neg p_3\}$
$r(\varphi \wedge \psi) = 1 + \max\{1+\max\{1+0, p_3 \vee (p_1 \leftrightarrow p_2)\}, 1+0\}$
$r(\varphi \wedge \psi) = 1 + \max\{1+\max\{1,1+\max\{0,0\}\},1\}$
$r(\varphi \wedge \psi) = 1 + \max\{1+\max\{1,1\},1\}$
$r(\varphi \wedge \psi) = 1 + \max\{2,1\} = 1+2 = 3$

Definizione: Numero di connettivi $\#(\varphi)$

- $\#(\varphi) = 0$
- $\#(\varphi \vee \psi) = 1 + \#\varphi + \#\psi$
- $\#(\neg\varphi) = 1 + \#\varphi$

Esercizio - Dimostrare che per ogni $\phi \in$ PROP vale $r(\phi) \leq \#\phi$

Questo è un esempio di dimostrazione per induzione:

Proposizione

Se $\phi \in \mathrm{SF}[\psi]$ e $\phi \neq \psi$ allora $r[\phi] < r[\psi]$

Semantica

La **semantica** si occupa di attribuire un significato sintattico alle proposizioni (vero - 1 o falso - 0).

Definizione: valutazione di verità

E' una funzione $\sigma : PROP \to \{0, 1\}$ tale che:

- $\sigma(\bot) = 0$
- $\sigma(\neg\varphi) = 1$ se e solo se $\sigma(\varphi) = 0$
- $\sigma(\phi \wedge \psi) \Leftrightarrow \sigma(\phi) = \sigma(\psi) = 1$
- $\sigma(\phi \vee \psi) \Leftrightarrow \sigma(\phi) = 1$ oppure $\sigma(\psi) = 1$
- $\sigma(\phi \to \psi) \Leftrightarrow \sigma(\phi) = 1$ allora $\sigma(\psi) = 1$

Questa definizione per la funzione di valutazione è pressochè la formulzazione matematica delle **tavole di verità**.

A	B	$A \wedge B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

AND

A	B	$A \vee B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

OR

A	B	$A \to B$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

IMPLICAZIONE

A	$\neg A$
0	1
1	0

NOT

Definizione: valutazione atomica

Funzione $v : AT \to \{0, 1\}$ tali che $v(\bot) = 0$

Proposizione

Per ogni valutazione v esiste ed è unica una *valutazione di verità* $[\![-]\!]_v$ tale che per ogni $p \in \mathbf{AT}$, $[\![p]\!]_v = v(p)$.

Definizione: concordanza

Dato un insieme finito P di simboli proposizionali, si dice che due valutazioni v, v' **concordano** su P se $v_{|P} = v'_{|P}$.

La proposizione precedente ci dice che l'insieme di tutte le possibili valutazione ha le stessa cardinalità di $\mathbb{N}$.

Un'altra proprietà delle valutazione è stabilita dalla seguente proposizione.

Proposizione

Se $P(\phi)$ è l'insieme dei simboli proposizionali che occorrono in una formula ϕ e v, v' due valutazioni che concordano su $P(\phi)$ allora $[\![\phi]\!]_v = [\![\phi]\!]_{v'}$.

Se un problema è vero in tutte le sue valutazioni, allora è **decidibile** e viene detto **tautologia**.

Si estende la valutazione di verità a un insieme arbitrario di proposizioni Γ:

$$[\![\Gamma]\!]_v = 1 \text{ se e solo se per ogni } \alpha \in \Gamma,\ [\![\alpha]\!]_v = 1$$

Tuttavia si pone attenzione al fatto che se $[\![\phi]\!]_v \neq 1$, allora non significa che per ogni $\alpha \in \Gamma$ si ha $[\![\alpha]\!]_v = 0$, al contrario si intende che esiste almeno un $\alpha \in \Gamma$ tale per cui $[\![\alpha]\!]_v = 0$.

Viceversa è più forte affermare che $[\![\Gamma]\!]_v = 0$, in quanto per questo caso ogni $\alpha \in \Gamma$ ha valutazione $[\![\alpha]\!]_v = 0$.

Partendo dal concetto di valutazione dell formule, è possibile definire cosa significhi che da un insieme Γ di proposizioni **segue logicamente** una proposizione φ, o in altre parole che φ sia **conseguenza logica** di Γ.

Definizione: conseguenza logica

Dato un insieme Γ di formule, si dice che la formual φ è conseguenza logica dalle formule in Γ e si scrive $\Gamma \models \varphi$, se per ogni valutazione v, $[\![\Gamma]\!]_v = 1 \Rightarrow [\![\varphi]\!]_v = 1$.

La formula φ è detta **soddisfacibile** se esiste una valutazione v tale che $[\![\varphi]\!]_v = 1$, altrimenti risulta essere **insoddisfacibile**.

A sua volta un insieme di formule Γ è soddisfacibile se esiste una valutazione v tale che per ogni $\varphi \in \Gamma$ si ha $[\![\Gamma]\!]_v = 1$, altrimenti si dice insoddisfacibile.

Notazione

- si scrive $\models \varphi$ al posto di $\phi \models \varphi$
- si scrive $\psi_1, \ldots, \psi_n \models \varphi$ al posto di $\{\psi_1, \ldots, \psi_n\} \models \varphi$
- Γ, Σ, Δ sono insiemi arbitrari di formule
- si scrive $\Gamma, \Sigma, \psi \models \varphi$ al posto di $\Gamma \cup \Delta \cup \{\psi\} \models \varphi$

Esercizio - $\models \neg\neg\varphi \to \varphi$ è una tautologia?

Dimostrazione: per ogni valutazione v.$[\![\neg\neg\varphi \to \varphi]\!]_v = 1$

$$\begin{aligned}
[\![\neg\neg\varphi \to \varphi]\!]_v = 1 \quad & \leftrightarrow \underline{[\![\neg\neg\varphi]\!]_v = 0} \text{ oppure } [\![\varphi]\!]_v = 1 \\
& \leftrightarrow \underline{[\![\neg\varphi]\!]_v = 1} \text{ oppure } [\![\varphi]\!]_v = 1 \\
& \leftrightarrow \underline{[\![\varphi]\!]_v = 0} \text{ oppure } [\![\varphi]\!]_v = 1
\end{aligned}$$

La formula è **sempre vera**

Esercizio - $\models (\varphi \to \psi) \vee (\psi \to \varphi)$ è una tautologia?

Dimostrazione: per ogni valutazione v.$[\![(\varphi \to \psi) \vee (\psi \to \varphi)]\!]_v = 1$

$$[\![(\varphi \to \psi) \vee (\psi \to \varphi)]\!]_v = 1 \quad \leftrightarrow \underline{[\![\varphi \to \psi]\!]_v = 0} \text{ oppure } \underline{[\![\psi \to \varphi]\!]_v = 1}$$

$\leftrightarrow$ ($[\![\varphi]\!]_v = 0$ oppure $[\![\psi]\!]_v = 1$) oppure ($[\![\psi]\!]_v = 0$ oppure $[\![\varphi]\!]_v = 1$)

La formula è **sempre vera**

Questo sotto è un esercizio che non ho capito (spero sia impostato correttamente)

Esercizio - Risolvere $\varphi \to \psi, \neg\psi \models \neg\varphi$

Dimostrazione: per ogni valutazione v se $[\![\varphi \to \psi]\!]_v = 1$ e $[\![\neg\psi]\!]_v = 1$ allora $[\![\neg\varphi]\!]_v = 1$
$[\![\varphi \to \psi]\!]_v = 1 \Leftrightarrow [\![\varphi]\!]_v = 0$ oppure $[\![\psi]\!]_v = 1$
$[\![\neg\psi]\!]_v = 1 \Leftrightarrow [\![\varphi]\!]_v = 0$
[$[\![\varphi]\!]_v = 0$ oppure $[\![\psi]\!]_v = 1$] $\Rightarrow [\![\varphi]\!]_v = 0$ e $[\![\psi]\!]$ oppure ($[\![\psi]\!]_v = 1$ e $[\![\psi]\!]_v = 0$)
$\to [\![\varphi]\!]_v = 0 \Rightarrow [\![\neg\varphi]\!]_v = 1$

Proprietà di $\models$

1. $\Gamma \models \psi$ e $\Delta . \psi \models \varphi \Rightarrow \Gamma, \Delta \models \varphi$
2. $\Gamma \models \varphi \vee \psi$ e $\Delta, \varphi \models \delta$ e $\varepsilon, \psi \models \delta \Rightarrow \Gamma, \Delta, \varepsilon \models \Gamma$

Dimostrazione 1

- $\Gamma \models \psi \leftrightarrow$ Per ogni valutazione v.$[\![\Gamma]\!]_v = 1 \to [\![\psi]\!]_v = 1$
- $\Delta, \psi \models \leftrightarrow$ Per ogni valutazione v.$[\![\Delta]\!]_v = 1$ e $[\![\psi]\!]_v = 1 \to [\![\varphi]\!]_v = 1$
  $\Rightarrow [\![\Gamma, \Delta]\!]_v = 1 \Rightarrow [\![\varphi]\!]_v = 1$

Dimostrazione 2

Ipotesi: $[\![\Gamma]\!]_v = 1 = [\![\Delta]\!]_v = [\![\varepsilon]\!]_v \Rightarrow [\![\delta]\!]_v = 1$

$[\![\varphi \vee \psi]\!]_v = 1$

$[\![\varphi]\!]_v = 1$ OR $[\![\psi]\!]_v = 1$

Bisogna procedere per casi:

- Se $[\![\varphi]\!]_v = 1$ allora siccome $[\![\Delta]\!]_v = 1$ allora $[\![\delta]\!]_v = 1$
- Se $[\![\psi]\!]_v = 1$ allora siccome $[\![\varepsilon]\!]_v = 1$ allora $[\![\delta]\!]_v = 1$

Esercizio - Utilizziamo le regole semantiche per dimostrare:
$\varphi_1 \wedge \varphi_2 \leftrightarrow \varphi_1' \wedge \varphi_2'$ **che è come scrivere** $\varphi_1 \wedge \varphi_1' \leftrightarrow \varphi_2 \wedge \varphi_2'$

- $\models \varphi_1 \wedge \varphi_2 \to \varphi_1' \wedge \varphi_2'$ ovvero $[\![\varphi_1 \wedge \varphi_2]\!]_v = 1 \Rightarrow [\![\varphi_1' \wedge \varphi_2']\!]_v = 1$

Dimostrazione: $[\![\varphi_1]\!]_v = 1$ e $[\![\varphi_2]\!]_v = 1 \quad \Rightarrow \quad [\![\varphi_1' \wedge \varphi_2']\!]_v = 1$

- $[\![\varphi_1]\!]_v = 1$ e $[\![\varphi_1 \wedge \varphi_1']\!]_v = 1 \quad \Rightarrow \quad [\![\varphi_1']\!]_v = 1$
  $[\![\varphi]\!]_v = 1 \Rightarrow [\![\varphi_1']\!]_v = 1$

- $[\![\varphi_2]\!]_v = 1$ e $[\![\varphi_2 \to \varphi_2']\!]_v = 1 \Rightarrow [\![\varphi_2']\!]_v = 1$
  $[\![\varphi_2]\!]_v = 1 \Rightarrow [\![\varphi_2']\!]_v = 1$
  $\Rightarrow [\![\varphi_1' \wedge \varphi_1']\!]$

Definizione: Sostituzione

Siano ψ e γ due formule e sia p $\in$ Prop. Si definisce $\psi[\mathbf{p}/\gamma]$ la formula ottenuta sostituendo nella stringa ψ ogni occorrenza di **p** con la stringa corrispondente a ψ.

Teorema: Sostituzione

Siano $\varphi, \gamma_1.\gamma_2 \in$ Prop e sia p una proposizione atomica.
Se $\models \gamma_1 \leftrightarrow \gamma_2$ allora $\models \varphi[p/\gamma_1] \leftrightarrow \varphi[p/\gamma_2]$

Dimostrazione (per induzione) su φ
Base: Sia $\varphi \in$ **AT**. Abbiamo due casi:

1. se $\varphi \neq \mathbf{p}$ allora $\varphi[\mathbf{p}/\gamma_1] = \varphi[\mathbf{p}/\gamma_2] = \varphi$ e quindi ovviamente $\models \varphi \equiv \varphi$
2. se $\varphi = \mathbf{p}$ allora $\varphi[\mathbf{p}/\gamma_1] = \gamma_1$ e $\varphi[\mathbf{p}/\gamma_2] = \gamma_2$ e quindi per ipotesi $\models \varphi[\mathbf{p}/\gamma_1] \equiv \varphi[\mathbf{p}/\gamma_1]$

Passo induttivo: Esaminiamo i vari casi
$(\varphi = \varphi_1 \to \varphi_2)$ Per ipotesi induttiva:
$\models \varphi_1[\mathbf{p}/\gamma_1] \equiv \varphi_1[\mathbf{p}/\gamma_2]$ e $\models \varphi_2[\mathbf{p}/\gamma_1] \equiv \varphi_2[\mathbf{p}/\gamma_2]$.
Ora abbiamo che $\models \varphi_1[\mathbf{p}/\gamma_1] \to \varphi[\mathbf{p}/\gamma_1] \equiv \varphi_1[\mathbf{p}/\gamma_2] \to \varphi_2[\mathbf{p}/\gamma_2]$.
Dato che $\varphi[\mathbf{p}/\gamma_1] = \varphi_1[\mathbf{p}/\gamma_1] \to \varphi_2[\mathbf{p}/\gamma_1]$ e $\varphi[\mathbf{p}/\gamma_2] = \varphi_1[\mathbf{p}/\gamma_2] \to \varphi_2[\mathbf{p}/\gamma_2]$
$(\varphi = \varphi_1 \wedge \varphi_2)$, $(\varphi = \varphi_1 \vee \varphi_2)$ Il ragionamento è analogo al caso precedente

Come risolvere le tautologie?

- Metodo 1: Utilizzare le tavole di verità $\to$ dispendioso
- Metodo 2: Utilizzare la semantica $\to$ da utilizzare in esame

Esercizio - $\models \varphi((\psi \to \sigma) \to ((\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \sigma)))$

$\models \delta \Leftrightarrow \forall$v $[\![\delta]\!]_v = 1 \Leftrightarrow ([\![\varphi]\!]_v = 1 \to [\![(\psi \to \sigma) \to (\ (\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \sigma)\ )\ ]\!]_v = 1)$
$[\![\psi \to \sigma]\!]_v = 1 \quad \Leftrightarrow \quad ([\![\varphi \to \psi]\!]_v = 1 \to [\![\varphi \to \sigma]\!]_v = 1)$
$[\![\psi \to \sigma]\!]_v = 0$ OR $[\![\varphi \to \psi]\!]_v = 0$ OR $[\![\varphi \to \sigma]\!]_v = 1$

Sistemi deduttvi

L'approcio non semantico alla logica proposizionale si basa sul concetto di **dimostrazione formale** come *deduzione*.

Definizione: sistema deduttivo

Fornisce un insieme di regole per costruire dimostrazioni formali che permettono di derivare una conclusione a partire da alcune premesse.

Quando si enuncia un **teorema** deve sempre esistere la sua **dimostrazione**.

Definizione: dimostrazione

Sequenza finita di passi logici formalemte corretti che permettono di arrivare alla **tesi** a partire dalle **ipotesi** (note anche come **premesse** o **assunzioni**).

$$\left.\begin{array}{c}\text{Ipotesi / premesse / assunzioni}\\ \vdots \\ \text{Tesi}\end{array}\right\}\text{Dimostrazione / Derivazione}$$

Tra le ipotesi e la tesi esiste una serie finita di passi indicati con ⋮che consete la cosidetta **deduzione**.

Deduzione naturale

La **deduzione naturale** è una metologia di ragionamento per costruire dimostrazioni formali basata su regole di inferenza che riflettono il modo naturale di ragionare.

Per tanto non si valutano più i valori di verità delle formule, ma si considera la loro struttura sintattica. stabilendeo delle:

- **assunzioni**: prese temporaneamente come vere
- **derivazioni** sulle formule applicando delle leggi: l'applicazione di una regola si chiama *passo di derivazione*
- **scaricamento** delle assunzioni: quando si arriva alla tesi, le assunzioni vengono eliminate

Tutte le derivazioni vengono rappresentate graficamente tramite gli **alberi di derivazione**, nei quali:

- **foglie**: rappresentano le *ipotesi*
- **nodi interni**: rappresentano i *passi di derivazione*
- **radice**: rappresenta la *tesi* da dimostrare

Definizione: derivazione completa

Una derivazione si dice completa se non ci sono più foglie aperte (tutte le assunzioni sono state scaricate).

Dimostrare $p \wedge q \vdash q \wedge p$

$$
\begin{array}{ccc}
 & q \wedge p & \\
 & / \quad \backslash & \\
 & q \qquad p & \\
\text{Assunzione} & | \qquad\quad | & \text{Assunzione} \\
 & p \wedge q \quad p \wedge q &
\end{array}
$$

Regole deduttive per i connettivi

Le **regole di derivazione** si divisono in due tipologie:

- **regole di introduzione**: le premesse vengono collegate da un connettivo logico introdotto
- **regole di eliminazione**: dalle premesse si può eliminare un connettivo logico

$$\frac{\text{premesse}}{\text{conclusione}} \quad \text{(nome regola)}$$

Le formule presenti all'interno delle parentesi [ ] sono delle ipotesi scaricate (assunte) da una specifica regola di derivazione utilizzata.

Per specificare a quale regola si riferiscono è necessario indicare un indice numerico.

Regole della congiunzione ($\wedge$)

Definizione: regole della congiunzione

$$\frac{\begin{array}{cc}\mathcal{D}_1 & \mathcal{D}_2 \\ \alpha & \beta\end{array}}{\alpha \wedge \beta}\ \boldsymbol{\wedge I} \qquad \frac{\begin{array}{c}\mathcal{D} \\ \alpha \wedge \beta\end{array}}{\alpha}\ \boldsymbol{\wedge E_l} \qquad \frac{\begin{array}{c}\mathcal{D} \\ \alpha \wedge \beta\end{array}}{\beta}\ \boldsymbol{\wedge E_r}$$

Nell'eliminazione dell'and ($\boldsymbol{\wedge E}$) è importante indicare il lato che si elimina con ($\boldsymbol{\wedge E_l}$) oppure ($\boldsymbol{\wedge E_r}$)

regola di introduzione dell'$\wedge$: se dalla derivazione $\mathcal{D}_1$ e $\mathcal{D}_2$ si arriva rispettivamente a ottenere α e β, allora si può derivare $\alpha \wedge \beta$ introducendo il connettivo dell'$\wedge$

regola di eliminazione dell'$\wedge$: se dalla derivazione $\mathcal{D}$ si arriva alla formula $\alpha \wedge \beta$, allora è possibile rimuovere il connettivo e concludere solo uno dei due rami

Esercizio

Dato il teorema $\vdash \alpha \to (\alpha \wedge \alpha)$, la sua dimostrazione naturale consiste in:

$$\dfrac{\dfrac{[\alpha]^1 \quad [\alpha]^1}{\alpha \wedge \alpha}\ \wedge I}{\alpha \to (\alpha \wedge \alpha)}\ \to I^1$$

Ipotesi da scaricare: $[\alpha]^1$

Regole della disgiunzione ($\vee$)

Definizione: regole della disgiunzione

$$\dfrac{\begin{array}{c}\mathcal{D}\\ \alpha\end{array}}{\alpha \vee \beta}\ \vee \boldsymbol{I_l} \qquad \dfrac{\begin{array}{c}\mathcal{D}\\ \beta\end{array}}{\alpha \vee \beta}\ \vee \boldsymbol{I_r} \qquad \dfrac{\begin{array}{c}\mathcal{D}_1\\ \alpha \vee \beta\end{array} \quad \begin{array}{c}[\alpha]^k\\ \mathcal{D}_2\\ \gamma\end{array} \quad \begin{array}{c}[\beta]^k\\ \mathcal{D}_3\\ \gamma\end{array}}{\gamma}\ \vee \boldsymbol{E}$$

Nell'introduzione dell'or ($\vee \boldsymbol{I}$) è importante indicare il lato che si introduce con ($\vee \boldsymbol{I_l}$) oppure ($\vee \boldsymbol{I_r}$)

Regole dell'implicazione ($\to$)

Definizione: regole dell'implicazione

$$\dfrac{\begin{array}{c}[\alpha]^k\\ \mathcal{D}\\ \beta\end{array}}{\alpha \to \beta}\ \to \boldsymbol{I^k} \qquad \dfrac{\begin{array}{c}\mathcal{D}_1\\ \alpha\end{array} \quad \begin{array}{c}\mathcal{D}_2\\ \alpha \to \beta\end{array}}{\beta}\ \to \boldsymbol{E}$$

Mentre per l'introduzione dell'implicazione ($\to \boldsymbol{I^k}$) l'ipotesi è tendenzialmente l'elemento di destra, l'eliminazione ($\to \boldsymbol{E}$) si può avere sia per β che per α, basterà cambiare le deduzioni.

Regole del bottom ($\perp$)

Definizione: regole del bottom

$$\dfrac{\perp}{\perp \to \varphi}\ \to \boldsymbol{I^k} \qquad \dfrac{\begin{array}{c}\neg\varphi\\ \vdots\\ \perp\end{array}}{\varphi}\ \boldsymbol{RAA}$$

Osservazione $\neg\varphi \equiv \varphi \to \bot$ di conseguenza, $\neg\neg\varphi \equiv \neg\varphi \to \bot$

$$\dfrac{\begin{array}{c}[\varphi]^1\\ \vdots \\ \bot\end{array}}{\varphi \to \bot} \to \boldsymbol{I^1} \qquad \dfrac{\begin{array}{c}[\neg\varphi]^1\\ \vdots \\ \bot\end{array}}{\neg\varphi \to \bot} \to \boldsymbol{I^1}$$

Ipotesi da scaricare: $[\varphi]^1$ Ipotesi da scaricare: $[\neg\varphi]^1$

Esercizio - Dimostrare $\models \neg\neg\varphi \leftrightarrow \varphi$

Scrivere $\models \neg\neg\varphi \leftrightarrow \varphi$ è come scrivere $\models (\neg\neg\varphi \to \varphi) \wedge (\varphi \to \neg\neg\varphi)$
Per svolgere l'esercizio si è liberi di usare una o l'altra forma, a seconda della difficoltà.
<u>Deduzione naturale:</u> $\models \neg\neg\varphi \leftrightarrow \varphi$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg\neg\varphi]^1\ [\neg\varphi]^2}{\bot}\to E}{\varphi}RAA^2}{\neg\neg\varphi \to \varphi}\to I^1 \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg\varphi]^4\ [\varphi]^3}{\bot}\to E}{\neg\neg\varphi}\to I^4}{\varphi \to \neg\neg\varphi}\to I^3}{\neg\neg\varphi \leftrightarrow \varphi}\wedge I$$

Ipotesi da scaricare: $[\neg\neg\varphi]^1$ $[\neg\varphi]^2$ $[\varphi]^3$ $[\neg\varphi]^4$
Le ipotesi individuate in un ramo della deduzione **devono** essere scaricare all'interno di quel ramo.

Le deduzioni naturali possono sia essere risolte attraverso la tecnica del **bottom-up** (a mio parare più semplice), che attraverso l'**up-bottom**. In alcuni casi l'utilizzo di entrambe è consigliato per poter individuare a pieno i passaggi.

Principio del terzo esluso

$\vdash \varphi \vee \varphi$ $\qquad$ $[\![\neg\varphi \vee \neg\varphi]\!]_v = 1$ **if** $[\![\varphi]\!]_v = 1$ **oppure** $[\![\neg\varphi]\!]_v = 1 \Leftrightarrow [\![\varphi]\!]_v = 0$

quindi $[\![\varphi]\!]_v = 1$ oppure $[\![\varphi]\!]_v = 0 \rightarrow$ è una tautologia

Esercizio - Deduzione naturale: $\vdash \varphi \vee \varphi$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad \dfrac{[\neg\varphi]^2}{(\varphi \vee \neg\varphi)}\,\vee I_l}{\bot}\,\rightarrow E}{\varphi}\,RAA^2}{\dfrac{\dfrac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad (\varphi \vee \neg\varphi)}{\bot}\,\rightarrow E}{\varphi \vee \neg\varphi}\,RAA^1}\,\vee I_l}$$

Ipotesi da scaricare:
$[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad [\neg\varphi]^2$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad \dfrac{[\varphi]^2}{(\varphi \vee \neg\varphi)}\,\vee I_l}{\bot}\,\rightarrow E}{\neg\varphi}\,\rightarrow I^2}{\dfrac{\dfrac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad (\varphi \vee \neg\varphi)}{\bot}\,\rightarrow E}{\varphi \vee \neg\varphi}\,RAA^1}\,\vee I_r}$$

Ipotesi da scaricare:
$[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad [\varphi]^2$

Leggi di De Morgan

1. $\vdash \neg(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow \neg\varphi \vee \neg\phi$

   può essere scritto come: $\neg(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \neg\varphi \vee \neg\psi \quad \vee \quad \neg\varphi \vee \neg\psi \rightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)$

Svolgiamone la deduzione naturale:

Esercizio - Deduzione naturale: $\neg(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \neg\varphi \vee \neg\psi$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg(\varphi \vee \psi)]^1 \quad \dfrac{[\varphi]^4 \quad [\psi]^3}{(\varphi \wedge \psi)}\,\wedge I}{\bot}\,\rightarrow E}{\neg\varphi}\,\rightarrow I^4}{\dfrac{[\neg(\neg\varphi \vee \neg\psi)]^2 \quad (\neg\varphi \vee \neg\psi)}{\bot}\,\rightarrow E}\,\vee I_l}{(\neg\psi)}\,\rightarrow I^3}{\dfrac{[\neg(\neg\varphi \vee \neg\psi)]^2 \quad (\neg\varphi \vee \neg\psi)}{\bot}\,\rightarrow E}\,\vee I_r}{(\neg\varphi \vee \neg\psi)}\,RAA^2}{\neg(\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\neg\varphi \vee \neg\psi)}\,\rightarrow I^1$$

Ipotesi da scaricare: $[\neg(\varphi \wedge \psi)]^1 \quad [\neg(\neg\varphi \vee \neg\psi)]^2 \quad [\psi]^3 \quad [\varphi]^4$

Esercizio - Deduzione naturale: $\neg\varphi \vee \neg\psi \to \neg(\varphi \wedge \psi)$

$$\dfrac{\dfrac{[\neg\varphi \vee \neg\psi]^1 \quad \dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg\varphi]^2 \quad \dfrac{[\varphi \wedge \psi]^3}{\varphi}\wedge E_l}{\bot}\to E}{\neg(\varphi \wedge \psi)}\to I^3 \quad \dfrac{\dfrac{[\neg\psi]^2 \quad \dfrac{[\varphi \wedge \psi]^3}{\psi}\wedge E_r}{\bot}\to E}{\neg(\varphi \wedge \psi)}\to I^4}{}}{\neg(\varphi \wedge \psi)}\vee E^2}{\neg\varphi \vee \neg\phi \to \neg(\varphi \wedge \psi)}\to I^1$$

Ipotesi da scaricare: $[\neg\varphi \vee \neg\psi]^1 \quad [\neg\varphi]^2 \quad [\neg\psi]^2 \quad [\varphi \wedge \psi]^3$

Possiamo individuare le diverse componenti in una deduzione:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\varphi]^1 \quad \dfrac{\alpha}{\varphi \to \psi}\wedge E}{\psi}\to E \quad \dfrac{\dfrac{\alpha}{\varphi \to \delta}\wedge E \quad [\varphi]^1}{\delta}\to E}{\psi \wedge \delta}\wedge I}{\varphi \to (\psi \to \delta)}\to I^1$$

Ipotesi da scaricare: $[\varphi]^1$

Definizione: Insieme delle derivazioni

L'insieme delle derivazioni $\mathcal{D}$ è il più piccolo insieme X tale che:

- per ogni $\varphi \in PROP$ la derivazione composta da una sola formula φ è in X;
- se $\underset{\varphi}{\sqcap_1}, \underset{\psi}{\sqcap_2} \in$ X allora:

$$\dfrac{\begin{matrix}\sqcap_1 & \sqcap_2\\ \varphi & \psi\end{matrix}}{\varphi \wedge \psi}\ (\wedge I)$$

- se $\underset{\varphi\wedge\psi}{\sqcap} \in$ X allora:

$$\dfrac{\begin{matrix}\sqcap\\ \varphi \wedge \psi\end{matrix}}{\varphi}\wedge_1 E \qquad \dfrac{\begin{matrix}\sqcap\\ \varphi \wedge \psi\end{matrix}}{\psi}\wedge_2 E$$

- se $\overset{\psi}{\underset{\varphi}{\sqcap}}$ allora:

$$\dfrac{\begin{matrix}[\psi]\\ \sqcap\\ \varphi\end{matrix}}{}\to I$$

- se $\underset{\varphi}{\sqcap_1}$, $\underset{\varphi\to\psi}{\sqcap_2} \in$ X allora:

$$\dfrac{\overset{\sqcap_1}{\varphi} \qquad \overset{\sqcap_2}{\varphi \to \psi}}{\psi \to \varphi} \to E$$

- se $\underset{\varphi}{\sqcap} \in$ X allora:

$$\dfrac{\overset{\sqcap}{\varphi}}{\varphi \vee \psi} \vee I \qquad\qquad \dfrac{\overset{\sqcap}{\varphi}}{\psi \vee \varphi} \vee I$$

- se $\underset{\varphi\vee\psi}{\sqcap}$, $\overset{\varphi}{\underset{\gamma}{\sqcap_1}}$, $\overset{\psi}{\underset{\gamma}{\sqcap_2}} \in$ X allora:

$$\dfrac{\overset{\sqcap}{\varphi \vee \psi} \qquad \overset{[\varphi]}{\overset{\sqcap_1}{\delta}} \qquad \overset{[\psi]}{\overset{\sqcap}{\delta}}}{\delta} \vee E$$

- se $\overset{\neg\psi}{\underset{\bot}{\sqcap}} \in$ X allora:

$$\dfrac{\overset{[\neg\psi]}{\overset{\sqcap}{\bot}}}{\psi} \bot_c$$

- se $\underset{\bot}{\sqcap} \in$ X allora:

$$\dfrac{\overset{\sqcap}{\bot}}{\psi} \bot_i$$

Correttezza e completezza

Correttezza

Il primo passo da eseguire è quello di dimostrare che la deduzione naturale sia corretta.

La **correttezza** consiste che se da Γ si deriva φ ($\Gamma \vdash \varphi$), allora φ è conseguenza logica logica di Γ ($\Gamma \models \varphi$).

Lemma: Correttezza

Per ogni φ e per tutte derivazioni in Π, se $\underset{\varphi}{\Pi}$ allora $\mathrm{Hp}(\Pi) \models \varphi$.

La dimostrazione procede per induzione sull'altezza delle derivazioni:
$\Rightarrow$ **caso base**: se $\Pi = \varphi$, allora dato che $\varphi \models \varphi$ abbiamo la tesi
$\Rightarrow$ **passo induttivo**: per casi sull'ultima regola della derivazione Π

Teorema: Correttezza / Soundness

$$\Gamma \vdash \varphi \Rightarrow \Gamma \models \varphi$$

Dimostrazione
Se $\Gamma \vdash \varphi$ allora esiste una derivazione $\underset{\varphi}{\Pi}$ tale che $\mathrm{Hp}[\Pi] \subseteq \Gamma$.
Per il Lemma 2 abbiamo che $\mathrm{Hp}[\Pi] \models \varphi$ e per il Lemma 1 concludiamo che:

$$\Gamma \models \varphi$$

Una conseguenza del teorema di correttezza è la **non** contraddittorietà della deduzione naturale.

Teorema

$$\nvdash$$

Dimostrazione
Supponiamo che $\vdash \bot$, allora per la correttezza avremmo che $\models \bot$ che è impossibile.

Completezza

La **completezza** consiste nel dimostare che $\Gamma \models \varphi \Rightarrow \Gamma \vdash \varphi$: se una formula è corretta, allora è anche derivabile.

Per dimostarlo, dobbiamo utilizzare due concetti:

1. consistenza
2. soddisfacibilità

Definizione: consistenza

Si dice che un insieme $\Gamma \subseteq PROP$ è **incosistente** se $\Gamma \vdash \bot$, altrimenti si dice **consistente** ($\Gamma \nvdash \bot$).

Soddisfacibilità e **consistenza** sono fortemente legati tra di loro.
L'obiettivo principale è quello di dimostare che ogni insieme conistente di formule è soddisfacibile, ma è facile dimostare l'implicazione inversa (ogni insieme soddisfacibile di formule è consistente).

Proposizione

$$\Gamma \vdash \bot \Rightarrow \forall v, [\![\Gamma]\!]_v \neq 1$$

Dimostrazione
Se $\Gamma \vdash \bot$ allora, per la correttezza, $\Gamma \models \bot$ e, quindi, per la definizione di conseguenza logica non esiste nessuna valutazione v tale che $[\![\Gamma]\!]_v = 1$.

Per contrapposizione abbiamo, quindi che se Γ è soddisfacibile allora Γ è consistente.

Introduciamo un concetto un pò più forte della consistenza: **consistenza massimale**.

Definizione: insieme consistente massimale (opzione 1)

Sia $\mathcal{C} = \{\Gamma : \Gamma \subseteq PROP \text{ e } \Gamma \nvdash \bot\}$.
Si definiscono **massimali consistenti** gli elementi massimali dell'ordine parziale $\langle \mathcal{C}, \subseteq \rangle$.

Definizione: insieme consistente massimale (opzione 2)

Un insieme di formule Γ si dice **massimale consistente** se è consistente e non esiste un insieme $\Delta \neq \Gamma$ tale che $\Gamma \subseteq \Delta$.

Una caratteristica importante degli insiemi consistenti di formule è che possono estesi ad insiemi massimali consistenti.

Proposizione

Ogni insieme consistente Γ è contenuto in (almeno) un insieme massimale consistente.

Dimostrazione
Fissiamo un'enumerazione $(\varphi_i)_{i<\omega}$ di tutte le formule proposizionali.

Definiamo induttivamente la seguente sucessione $(\Gamma_i)_{i<\omega}$ di insiemi di formule:

- $\Gamma_0 = \Gamma$
- $\Gamma_{i+1} = \begin{cases} \Gamma_i \cup \Gamma_i \cup \varphi_i \nvdash \bot \\ \Gamma_i \text{ altrimenti} \end{cases}$

Dimostriamo che:

1. $\forall\ i.\ \Gamma_i \subseteq \Gamma_{i+1} \Rightarrow$ verifico correttezza (vero per costruzione)
2. $\forall\ i.\ \Gamma_i \nvdash \bot \Rightarrow$ si parte da un insieme consistente e ad ogni passo della costruzione preserva la consistenza (vero per induzione)
3. $\Gamma^* = \cup_{i \in \mathbb{N}} \Gamma_i$ è massimale conistente

Per quest'ultimo caso, dimostriamo per prima cosa che Γ^* è *consistente*.
Supponiamo che $\Gamma^* \vdash \bot$, allora esiste un sottoinsieme finito Σ di Γ tale che $\Gamma \vdash \bot$.
Dato che Σ non può essere vuoto abbiamo che $\Sigma = \{\varphi_1, \ldots, \varphi_n\}$.
Esistono, quindi, n elementi $\Gamma_{i_1}, \ldots, \Gamma_{i_n}$ non necessariamente diversi tali che $\varphi_1 \in$

$\Gamma_{i_1}, \ldots, \varphi_n \in \Gamma_{i_n}$.
Sia $m = max\{i_1, \ldots, i_n\}$, ovviamente $\Sigma \subseteq \Gamma_m$ e, quindi, $\Gamma_m \vdash \bot$ contraddicendo la seconda ipotesi.

Dimostriamo che Γ^* è *massimale*.
Supponiamo che esista $\Delta \neq \Gamma^*$ consistente tale che $\Gamma^* \subseteq \Delta$.
Per un certo indice k, $\varphi_k \in \Delta - \Gamma^*$, e per costruzione $\varphi_k \in \Gamma_{k+1}$ (altrimenti $\Gamma_k \cup \{\varphi_k\} \vdash \bot$) e conseguentemente $\Delta \vdash \bot$, e quindi $\varphi_k \in \Gamma^*$ contraddicendo l'assunzione.

Gli insiemi massimali godono di importanti **proprietà**.

Proposizione

Sia Γ massimale consistente allora:

1. $\Gamma \vdash \varphi \Leftrightarrow \varphi \in \Gamma$: insiemi massimali consistenti sono chiusi per derivabilità
2. $\forall \varphi, \varphi \in \Gamma$ oppure $\neg\varphi \in \Gamma$
3. $\varphi \wedge \psi \in \Gamma \Leftrightarrow (\varphi \in \Gamma$ e $\psi \in \Gamma)$
4. $\forall \varphi$ e $\psi, \varphi \to \psi \in \Gamma \Leftrightarrow (\varphi \in \Gamma \to \psi \in \Gamma)$

Dimostrazione

1. supponiamo che $\varphi \notin \Gamma$, per la massimamilità di Γ abbiamo che $\Gamma, \varphi \vdash \bot$, e oer le regole dell'implicazione $\Gamma \vdash \neg\varphi$ e, quindi, Γ è inconistente $\Rightarrow$ **assurdo**. Vicerversa, per definizione della relazione $\vdash$ tenendo conto che φ è una derivazione, se $\varphi \in \Gamma$, allora $\Gamma \vdash \varphi$.
2. se $\varphi \in \Gamma$, allora per la massimalità di Γ abbiamo che $\Gamma, \varphi \vdash \bot$ e, quindi, $\Gamma \vdash \neg\varphi$ e per la prima ipotesi $\neg\varphi \in \Gamma$
3. $\varphi \wedge \psi \in \Gamma \underset{\text{per (1)}}{\Leftrightarrow} \Gamma \vdash \varphi \wedge \psi \underset{\text{per le regole del calcolo}}{\Leftrightarrow} \Gamma \vdash \varphi$ e $\Gamma \vdash \psi \underset{\text{per (1)}}{\Leftrightarrow} \varphi \in \Gamma$ e $\psi \in \Gamma$
4. se $\varphi \to \psi \in \Gamma$ allora $\Gamma \vdash \varphi \to \psi$; se $\varphi \in \Gamma$, allora $\Gamma \vdash \varphi$ e, quindi, per $\to E$, $\Gamma \vdash \psi$ ed per il punto 1 $\psi \in \Gamma$.
   Abbiamo due casi:
   (a) $\varphi \notin \Gamma$
   $\varphi \notin \Gamma \underset{\text{per (1) e (2)}}{\Leftarrow} \Gamma \vdash \neg\varphi$
   $\underset{(\text{per } \bot_I \text{ e } \to \text{I})}{\Leftarrow} \Gamma \vdash \varphi \to \psi$
   (b) $\varphi \in \Gamma$
   $\varphi \in \Gamma \underset{\text{per ipotesi}}{\Rightarrow} \psi \in \Gamma \underset{\text{per (1)}}{\Leftrightarrow} \Gamma \vdash \psi \underset{\text{per}\to I}{\Rightarrow} \Gamma \vdash \varphi \to \psi \underset{(\text{per (1)})}{\Leftrightarrow} \varphi \to \psi \in \Gamma$

Lemma: insieme consistente massimale

Sia Γ un insieme massimale conistente, allora esiste v tale che $[\![\Gamma]\!]_v = 1$.

Dimostrazione

Sia v la valutazione tale che per ogni simbolo proposizionale p, $v(p) = 1 \leftrightarrow p \in \Gamma$.
Dimostriamo che $[\![\varphi]\!]_v = 1 \Leftrightarrow \varphi \in \Gamma$.

Procediamo per induzione sul rango di v:
$\Rightarrow$ **caso base**: ovvio per definizione di v
$\Rightarrow$ **passo induttivo**: procediamo per casi

$\boldsymbol{\varphi = \bot}$: vero in $[\![\bot]\!] = 0$
$\boldsymbol{\varphi = \psi \wedge \gamma}$: $\psi \wedge \gamma \in \Gamma \Leftrightarrow \psi \in \Gamma$ e $\gamma \in \Gamma \underset{\text{per l'i.i}}{\Leftrightarrow} [\![\psi]\!]_v = 1$
$\boldsymbol{\varphi = \psi \to \gamma}$: $\psi \to \gamma \in \Gamma \Leftrightarrow (\psi \in \Gamma \Leftarrow \gamma \in \Gamma) \underset{\text{per l'i.I}}{\Leftrightarrow} ([\![\psi]\!]_v = 1 \Rightarrow [\![\gamma]\!]_v = 1) \Leftrightarrow$
$[\![\psi \to \gamma]\!]_v = 1$

Corollario

Se Γ è conistente allora Γ è soddisfacibile.

Dimostrazione
Sappiamo che Γ è contenuto in un insieme massimale consistente Δ soddisfacibile, ovvero esiste v tale che $[\![\Delta]\!]_v = 1$ e dato che $\Gamma \subseteq \Delta$ abbiamo che $[\![\Gamma]\!]_v = 1$.

Teorema: completezza

$$\Gamma \models \varphi \Rightarrow \Gamma \vdash \varphi$$

Dimostrazione
Se $\Gamma \not\vdash \varphi$, allora $\Gamma, \neg\varphi$ è inconistente, quindi, esiste una valutazione v tale che $[\![\Gamma]\!]_v = 1$ e $[\![\varphi]\!]_v = 0$ e, quindi, $\Gamma \not\models \varphi$.

Esempio

$$NK^* = NK_p \setminus \left\{ \frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} \wedge I \right\} \cup \left\{ \overline{\varphi \to (\psi \to (\varphi \wedge \psi))}^{Ax} \right\}$$

Dimostrazione

$\Gamma \vdash_{NK^*} \varphi \Leftrightarrow \Gamma \vdash_{NK_p} \varphi \Rightarrow$ Per induzione sull'altezza della derivazione

<u>Base</u>: se $\sqcap_{NK^*}$ è φ allora $\sqcap_{NK_p} = \sqcap NK^*$

<u>Passo induttivo</u>: se $\sqcap_{NK^*}$ si conclude come una regola r diversa da Ax, allora basta applicare l'ipotesi induttiva.

$$\Pi_{NK^*} = \Pi'_{NK^*} \frac{\varphi_i}{\varphi} r \underset{\text{i.i.}}{\longrightarrow} \Pi'_{NK_p} \frac{\varphi_i}{\varphi} r \in \Pi_{NK_p}$$

Se $\sqcap_{NK*} = \underset{\text{Ax}}{\sqcap}_{NK*}$ allora basta sostituire all'Ax la derivazione di Nk_p di $\varphi \to (\psi \to (\varphi \wedge \psi))$

$$\frac{[\varphi]^1 \quad [\psi]^2}{\varphi \wedge \psi} \wedge I$$

$$\dfrac{\dfrac{}{\psi \to (\varphi \wedge \psi)}\to I^2}{\varphi \to (\psi \to (\varphi \wedge \psi))}\to I^1$$

Ipotesi da scaricare: $[\varphi]^1 \qquad [\psi]^2$

$\Leftarrow$ <u>Caso base</u>: (come visto prima)

<u>Passo induttivo</u>: se $\sqcap_{Nk_p}$ si conclude con una regola r diversa da ($\wedge$ I), allora basta applicare l'ipotesi induttiva.

$$\Pi'_{NK_p} \quad \dfrac{\varphi_1 \qquad \varphi_2}{\varphi_1 \wedge \varphi_2}(\wedge I) \quad \underset{\text{i.i.}}{\longrightarrow} \quad \Pi'_{NK^*}$$

$$\dfrac{\varphi_2 \qquad \dfrac{\varphi_1 \qquad \varphi_1 \to (\varphi_2 \to (\varphi_1 \wedge \varphi_2))}{\varphi_2 \to (\varphi_1 \wedge \varphi_2)}(\to E)}{\varphi_1 \wedge \varphi_2}(\to E)$$

Esercizio - 3a. $\Gamma = \{p_1 \leftrightarrow (p_0 \wedge \neg p_2), p_2 \to p_0\}$

<u>**Dimostrazione**</u> $\Gamma \nvdash p_1 \to p_2$
Dalla correttezza $\Gamma \nvDash p_1 \to p_2 \Rightarrow \nvdash p_1 \to p_2$
Definiamo v. $[\![p_1 \to p_2]\!]_v = 0$ e $[\![p_1 \Leftrightarrow (p_0 \wedge \neg p_2)]\!]_v = 1$ e $[\![p_2 \to P_0]\!]_v = 1$
$\mathrm{v}(p_1) = 1 \qquad \mathrm{v}(p_2) = 0 \qquad \mathrm{v}(p_0) = 1$

Esercizio - 3c. $\vdash (\varphi \to \psi) \to ((\psi \to \gamma) \to (\varphi \to \gamma))$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\psi \to \gamma]^2 \qquad \dfrac{[\varphi \to \psi]^1 \quad [\varphi]^3}{\psi}\to E}{\gamma}\to E}{(\varphi \to \gamma)}\to I^3}{(\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \gamma)}\to I^2}{(\varphi \to \psi) \to ((\psi \to \gamma) \to (\varphi \to \gamma))}\to I^1$$

Ipotesi da scaricare: $[(\varphi \to \psi)]^1 \; [(\psi \to \gamma)]^2 \; [\varphi]^3$

Esercizio - 4. Un insieme Γ è completo se per ogni φ, $\Gamma \vdash \varphi$ oppure $\Gamma \vdash \neg\varphi$ Dimostrare che l'insieme di tutti i simboli propositizionali $AF = \{p_0, p_1 \dots p_n\}$ è completa

Per assurdo, supponiamo AF non completo.
Allora $\exists\varphi$ t.c. AF $\nvdash \varphi$ e AF $\nvdash \neg\varphi$
Dalla correttezza abbiamo che AF $\nvdash \varphi \to$ AF $\nvDash \varphi$ da cui si ha v. $[\![\varphi]\!]_v = 0$ e che AF $\nvdash \neg\varphi$ e AF $\nvDash \neg\neg\varphi$ da cui si ha v. $[\![\varphi]\!]_v = 1$

Esercizio - 5. $\neg\varphi \vdash (\varphi \to \psi) \leftrightarrow \neg\varphi$

MI SONO RESO CONTO CHE NON CAPISCO CHE CAZZO ABBIA FATTO

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\varphi]^1 \quad [\neg\varphi]}{\bot}\to E}{\psi}\bot_i}{\varphi \to \psi}\to I^1 \quad \dfrac{\dfrac{\neg\varphi \quad [\varphi]^2}{\bot}\to E}{\neg\varphi}\to I^2}{(\varphi \to \psi) \leftrightarrow \neg\varphi}\leftrightarrow$$

Ipotesi da scaricare: $[\varphi]^1$ $[\varphi]^2$

Correttezza e Completezza nel sistema con tutti i connettivi

Due approcci per estendere il risultato al linguaggio $\mathcal{L}$ con tutti i connettivi:

- Metodo diretto: tratta esplicitamente la disgiunzione
- Metodo indiretto: dimostra correttezza e completezza di tutto il sistema sfruttando correttezza e completezza del sistema senza disgiunzione

Metodo diretto
Si basa sull'estensione dei risultati dimostrati nella Proposizione 9 e nel Lemma 10.

Metodo indiretto
Il metodo indiretto considera due nozioni di derivazione $\vdash \vdash_*$, rispettivamente per le formule in $\mathcal{L}$ (con tutte le regole) e $\mathcal{L}_*$ (in cui sono state eliminate le regole di introduzione ed eliminazione di $\vee$) e la seguente traduzione $(.)*$ da $\mathcal{L}$ a $\mathcal{L}^*$

- $(\varphi)^* = \varphi$ se $\varphi \in \mathbf{AT}$
- $(\varphi \circ \psi)^* = \varphi * \circ \psi *$ per $\circ \in \{\to, \wedge\}$
- $(\varphi \vee \psi)^* = \neg(\neg\varphi * \wedge \neg\psi *)$

Una banale induzione permette di dimostrare che:

Proposizione

Se φ è una $\mathcal{L}$-formula allora per ogni v, $[\![\varphi]\!]_v = [\![\varphi^*]\!]_v$ e conseguentemente $\models \varphi \leftrightarrow \varphi^*$

Proposizione

Se φ è una $\mathcal{L}$-formula allora $\vdash \varphi \leftrightarrow \varphi^*$

Dimostrazione: (per induzione sul rango di φ)
Base: se $\varphi \in \mathbf{AT}$ allora $\varphi = \varphi^*$

Passo induttivo:

- Se $\varphi = \varphi_1 \circ \varphi_2$ con $\circ \in \{\rightarrow, \wedge\}$ allora $(\varphi_1 \circ \varphi_2)^* = (\varphi_1)^* \circ (\varphi_2)^*$. Per i.i $\vdash \varphi_1 \leftrightarrow (\varphi_1)^*$ e $\vdash \varphi_2 \leftrightarrow (\varphi_2)^*$, da cui si deriva $\varphi \leftrightarrow \varphi^*$
- Se $\varphi = \varphi_1 \vee \varphi_2$, allora $(\varphi_1 \vee \varphi_2)^* = \neg(\neg(\varphi_1)^*) \wedge \neg((\varphi_1)^*)$. Per i.i. $\vdash \varphi_1 \leftrightarrow (\varphi_1)^*$ e $\vdash \varphi_2 \leftrightarrow (\varphi_2)^*$, da cui si deriva $\vdash (\varphi_1 \vee \varphi_2)^* \leftrightarrow \neg(\neg\varphi_1 \wedge (\neg\varphi_2))$ e dato che $\vdash \neg(\neg\varphi_1) \wedge \neg\varphi_2 \leftrightarrow \varphi_1 \vee \varphi_2$ abbiamo la tesi.

Correttezza in $\mathcal{L}$

Proposizione

Se φ è una $\mathcal{L}^*$-formula allora $\vdash \varphi \Leftrightarrow. \vdash_* \varphi$

La dimostrazione segue dal fatto che $\varphi^* = \varphi$

Teorema: (Correttezza)

Se $\Gamma \cup \{\varphi\} \subseteq \mathbf{Fbf}_{\mathcal{L}}$ allora $\Gamma \vdash \varphi \Rightarrow \Gamma \vDash \varphi$

Dimostrazione
Se $\Gamma \vdash \varphi$ allora $\Gamma^* \vdash \varphi^*$ e per la soundness per $\mathcal{L}^*, \Gamma^* \vDash \varphi^*$, e per la proposizione precedente $\Gamma^* \vDash \varphi^*$

Completezza di $\mathcal{L}$

Teorema: (Correttezza e Completezza)

$$\Gamma \vDash \varphi \Leftrightarrow \Gamma \vdash \varphi$$

Dimostrazione

$$\Gamma \vDash \varphi \Leftrightarrow \Gamma^* \vDash \varphi^* \overset{\text{(per correttezza e completezza di } \mathcal{L})}{\Leftrightarrow} \Gamma^* \vdash \varphi^* \Leftrightarrow \Gamma \vdash \varphi$$

Esercizio - $\varphi = \varphi_1 \vee \varphi_2$

Data v. $\mathrm{v}(\varphi) = 1$ per ogni $\varphi \in \Gamma$
Dimostrazione: $[\![\varphi_1 \vee \varphi_2]\!]_v = 1 \leftrightarrow [\![\varphi_1]\!]_v$ oppure $[\![\varphi_2]\!]_v = 1$
Di conseguenza: $\varphi_1 \in \Gamma$ e $\varphi_2 \in \Gamma$
Dalla prop $\quad \varphi_1 \vee \varphi_2 \in \Gamma \Leftrightarrow \varphi_1 \in \Gamma$ oppure $\varphi_2 \in \Gamma$