

Экономное использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) во время пандемии COVID-19

		Маски типа N95	Капюшоны с фильтрующим респиратором типа PAPR/CAPR	Хирургические маски	Маски специального назначения	Банданы или самодельные маски	Медицинский халат
Экономите запас СИЗ?	Требования к средствам	• Проверка плотности прилегания	• Изделие серийного производства	• Изделие серийного производства	• На этом этапе не используются	• На этом этапе не используются	• Изделие серийного производства
	Допустимый срок использования	• 8 часов • Прекратить использование при видимых загрязнениях • См. ниже указания по использованию масок*	• Прекратить использование в случае повреждения • Допускается передача другим медработникам	• Прекратить использование при видимом загрязнении или повреждении	• Неприменимо	• Неприменимо	• Повторное использование одним медработником при работе с одним пациентом • Прекратить использование при видимых загрязнениях
Критически низкий запас СИЗ?	Требования к средствам	• Проверка плотности прилегания • Без проверки плотности прилегания • Промышленные маски	• Изделие несерийного производства	• Изделие серийного производства	• Маски специального назначения, не одобренные национальным институтом охраны труда (НИОТ)	• Бандана • Изготовлено в домашних условиях • Неспециализированное изделие	• Изделие серийного производства • Изготовлено в домашних условиях • Плащи и халаты для пациентов
	Допустимый срок использования	• Прекратить использование, если маска неплотно прилегает	• Прекратить использование в случае повреждения	• Допускается повторное использование после дезинфекции	• По возможности дезинфицировать и использовать повторно	• Допускается повторное использование после дезинфекции	• Допускается использование несколькими пациентами • Прекратить использование при видимых загрязнениях

* Маски N95 следует выбрасывать в указанных далее случаях.

- После процедур с выделением аэрозолей.
- Если на них попала кровь или другие физиологические жидкости пациентов.

- После близкого контакта с заболевшим COVID-19 или после выхода из помещения, в котором оказывается помощь таким больным.

По возможности сократите применение СИЗ

- Избегайте личного контакта.
 - о Оказывайте медицинские услуги дистанционно.
 - о Закрепите за каждым пациентом 1 сотрудника.
 - о Для работы с больными COVID-19 назначьте специальный персонал.
- Не допускайте в палаты, где находятся пациенты с подтвержденным COVID-19, персонал, не занятый их обслуживанием.

Экономьте запас СИЗ

- Используйте маски N95 только для пациентов с подтвержденным диагнозом или подозрением на COVID-19 и при процедурах с выделением аэрозолей.
- Вместо масок N95 используйте защитные средства, например респираторы с соответствующими фильтрами или картриджами и фильтрующие респираторы с принудительной подачей воздуха (PAPR).
- Используйте СИЗ, которые можно дезинфицировать и повторно использовать, например защитные очки, многоразовые лицевые щитки и тканевые халаты.

Подробные сведения и актуальную информацию см. на сайте tpchd.org/coronavirus.

Рекомендации по надлежащему использованию СИЗ приведены на странице: cdc.gov/infectioncontrol.