

코로나19 팬데믹 기간 동안 PPE 아껴 쓰기

		N95 마스크	PAPR/CAPR 후드	수술용 마스크	시설 설계 마스크	반다나 또는 직접 만든 마스크	가운
PPE 아껴 쓰기?	장비 옵션.	• 착용감 검증.	• 상업용.	• 상업용.	• 지금은 사용하지 말 것.	• 지금은 사용하지 말 것.	• 상업용.
	사용 기간.	• 8시간. • 더러우면 사용 중단. • 마스크 폐기 시점은 아래 참조*.	• 파손된 경우 사용 중단. • 의료종사자 간 공유.	• 더럽거나 손상된 경우 사용 중단.	• 해당 안 됨.	• 해당 안 됨.	• 동일한 의료 종사자가 동일한 환자와 접촉 시 재사용. • 더러우면 사용 중단.
PPE 재고가 매우 낮은 경우?	장비 옵션.	• 착용감 검증. • 착용감 검증 안 됨. • 산업용.	• 비상업용.	• 상업용.	• NIOSH 미승인 시설 설계 마스크.	• 반다나. • 직접 만든 마스크. • 시설 설계 아님.	• 상업용. • 직접 만든 마스크. • 판초 및 환자복.
	사용 기간.	• 마스크가 제대로 밀폐되지 않으면 사용 중단.	• 파손된 경우 사용 중단.	• 살균 후 재사용.	• 가능하다면 살균 후 재사용.	• 살균 후 재사용.	• 1명 이상의 환자에게 사용. • 더러우면 사용 중단.

*다음 경우 N95 마스크 폐기:

- 에어로졸 발생 시술 후
- 환자의 혈액이나 기타 체액이 묻은 경우

- 코로나19 확진자와 밀접 접촉했거나 확진자 치료 병동에서 나온 후

가능하면 PPE 사용 줄이기

- 대면 접촉을 제한하세요.
 - 가상 진료를 하세요.
 - 각 환자당 담당자 1명을 지정하세요.
 - 코로나19 확진자 치료 전담 직원을 지정하세요.
- 코로나19 확진자 병실에 불필요한 직원들의 출입을 금하세요.

PPE 아껴 쓰기

- 코로나19 확진자 또는 의심자 접촉 시 또는 에어로졸 발생 시술 시에만 N95 마스크를 사용하세요.
- N95 마스크 대신 적절한 필터나 카트리지가 장착된 마스크와 같은 보호 장비를 사용하세요.
- 고글, 재사용 가능한 페이스 실드 및 천 소재 가운 등 살균 후 재사용이 가능한 PPE를 사용하세요.