

Tipirin ang PPE Sa Panahon ng COVID-19

		Mga N95 mask	Mga PAPR/CAPR na hood	Mga surgical mask	Mga mask na dinisenyo ng pasilidad	Bandana o mga mask na gawa sa bahay	Mga gown
Pagtitipid sa PPE?	Mga kagamitan na pagpipilian.	• Fit-tested.	• Komersyal ang pagkakagawa.	• Komersyal ang pagkakagawa.	• Huwag gamitin sa ngayon.	• Huwag gamitin sa ngayon.	• Komersyal ang pagkakagawa.
	Gaano katagal dapat gamitin.	• 8 oras. • Itiigil kapag mukha nang marumi. • Tingnan sa ibaba kung kailan dapat itapon ang mga mask*.	• Stop when broken. • Ibahagi sa pagitan ng mga healthcare worker.	• Itigil kapag mukhang marumi o kapag nasira.	• Hindi angkop.	• Hindi angkop.	• Gamiting muli ng parehong healthcare worker sa parehong pasyente. • Itiigil kapag mukha nang marumi.
Kulang na kulang sa PPE?	Mga kagamitan na pagpipilian.	• Fit-tested. • Non-fit tested. • Industriyal.	• Di-komersyal ang pagkakagawa.	• Komersyal ang pagkakagawa.	• Mga mask na dinisenyo ng pasilidad na hindi aprubado ng NIOSH.	• Bandana. • Gawa sa bahay. • Hindi dinisenyo ng pasilidad.	• Komersyal ang pagkakagawa. • Gawa sa bahay. • Mga poncho at gown ng pasyente.
	Gaano katagal dapat gamitin.	• Itigil kapag hindi na dumidikit ang mask.	• Itigil kapag nasira.	• I-disinfect at gamitin uli.	• I-disinfect at gamiting muli kung posible.	• I-disinfect at gamitin uli.	• Gamitin para sa mahigit sa 1 pasyente. • Itiigil kapag mukha nang marumi.

*Itapon ang mga N95 mask pagkatapos:

- Gumamit ng mga aerosol.
- Malagyan ng dugo o iba pang likido ng katawan mula sa pasyente.

- Malapitang pakikisalamuha sa o paglababas mula sa lugar kung saan inaalaan ang isang taong may COVID-19.

Bawasan ang paggamit ng PPE kung posible.

- Limitahan ang mga tuwirang pakikipag-ugnayan.
 - o Maglaan ng pangangalaga sa virtual na paraan.
 - o Magtalaga ng 1 manggagawa para sa bawat pasyente.
 - o Magtalaga ng tukoy na kawani na mag-aalaga sa mga pasyente ng COVID-19.
- Panatilihin ang mga di-kinakailangang kawani sa labas ng kuwarto ng mga kumpirmadong pasyente ng COVID-19.

Tipirin ang PPE.

- Gamitin lang ang mga N95 mask para sa mga kumpirmado o hinihinalang pasyente ng COVID-19 o kapag gumagamit ng mga aerosol.
- Gumamit ng proteksyon tulad ng mga respirator na may tamang mga filter o cartridge at PAPRs sa halip na mga N95 mask.
- Gumamit ng PPE na maaaring i-disinfect at gamiting muli tulad ng goggles, mga pantakip sa mukha na pwedeng gamiting muli at mga telang gown.