

# Conservar el EEP durante la COVID-19

		Máscaras N95	Capuchas PAPR/CAPR	Máscaras quirúrgicas	Máscaras diseñadas para instalaciones	Bandana o máscaras caseras	Batas
¿Conservar el EEP?	Opciones de dispositivos.	• Probado.	• Hechas comercialmente.	• Hechas comercialmente.	• No usar en este momento.	• No usar en este momento.	• Hechas comercialmente.
	Cuánto tiempo usarlo.	• 8 horas. • Descartarlo cuando parezca sucio. • Vea cuándo hay que tirar las máscaras a continuación*.	• Descartarlas cuando se rompan. • Compartir entre los trabajadores de la salud.	• Descartarlo cuando parezcan sucias o dañadas.	• No se aplica.	• No se aplica.	• El mismo trabajador de la salud debe reutilizarla al asistir al mismo paciente. • Descartarlo cuando parezca sucio.
¿EEP extremadamente bajo?	Opciones de dispositivos.	• Probado. • Sin prueba. • Industrial.	• No están hechas comercialmente.	• Hechas comercialmente.	• Máscaras diseñadas por las instalaciones; no aprobadas por el NIOSH.	• Bandana. • Hechas en casa. • No diseñadas por una instalación.	• Hechas comercialmente. • Hechas en casa. • Ponchos y batas para pacientes.
	Cuánto tiempo usarlo.	• Descartarlo cuando la máscara ya no selle.	• Descartarlas cuando se rompan.	• Desinfectar y reutilizar.	• Desinfectar y reutilizar si es posible.	• Desinfectar y reutilizar.	• Usar con más de 1 paciente. • Descartarlo cuando parezca sucio.

**\*Desechar las máscaras N95 después de:**

- Procedimientos con aerosoles.
- Recoge sangre u otros fluidos corporales de los pacientes.

- Contacto cercano o salida de un área de cuidado de alguien con COVID-19.

## Reducir el uso de EEP si es posible.

- Limitar las interacciones cara a cara.
  - o Proporcionar cuidados de forma virtual.
  - o Asignar 1 trabajador por cada paciente.
  - o Asignar personal específico para trabajar con los pacientes de COVID-19.
- Mantener al personal innecesario fuera de las habitaciones con pacientes con COVID-19 confirmados.

## Conservar el EEP.

- Usar solo máscaras N95 para pacientes confirmados o sospechosos de COVID-19 o procedimientos con aerosoles.
- Usar protección, como respiradores con filtros o cartuchos correctos y PAPR, en lugar de máscaras N95.
- Usar EEP que se pueda desinfectar y reutilizar como gafas, máscaras reutilizables y batas de tela.

Para obtener más información actualizada, ingrese a [tpchd.org/coronavirus](https://tpchd.org/coronavirus).

Para obtener instrucciones sobre el uso regular de los EPP, visite [cdc.gov/infectioncontrol](https://cdc.gov/infectioncontrol).