

第一章 线性规划

第四节 单纯形法

典式

- 迭代原理
- 单纯形法举例
- 两阶段法

$$(LP) \min S = CX$$

$$AX = b \quad R(A) = m$$

$$X \geq 0$$

基变量个数与
方程个数一致

$$A = (\underbrace{p_1, p_2, \dots, p_m}_B, \underbrace{p_{m+1}, p_{m+2}, \dots, p_n}_N) = (B, N)$$

$$B^{-1}b \geq 0 \quad B(\text{可行基}) \quad N$$

$$X = (\underbrace{x_1, x_2, \dots, x_m}_{X_B}, \underbrace{x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n}_{X_N})^T = \begin{pmatrix} X_B \\ X_N \end{pmatrix}$$

$$C = (\underbrace{c_1, c_2, \dots, c_m}_{C_B}, \underbrace{c_{m+1}, c_{m+2}, \dots, c_n}_{C_N}) = (C_B, C_N)$$

$$\begin{aligned}
 (LP) \min S &= CX \quad C = (C_B, C_N) \\
 AX &= b \quad A = (B, N) \quad X = \begin{pmatrix} X_B \\ X_N \end{pmatrix} \\
 X &\geq \mathbf{0}
 \end{aligned}$$

$$AX = b \rightarrow (B, N) \begin{pmatrix} X_B \\ X_N \end{pmatrix} = b \rightarrow BX_B + NX_N = b$$

$$\rightarrow X_B + B^{-1}NX_N = B^{-1}b \rightarrow X_B = B^{-1}b - B^{-1}NX_N$$

$$S = CX = (C_B, C_N) \begin{pmatrix} X_B \\ X_N \end{pmatrix} = C_B X_B + C_N X_N$$

$$= C_B (B^{-1}b - B^{-1}NX_N) + C_N X_N$$

$$= C_B B^{-1}b + (C_N - C_B B^{-1}N) X_N$$

$$\min S = CX$$

$$AX = b$$

$$X \geq 0$$

复习 $C - C_B B^{-1} A \geq 0 \Leftrightarrow C_N - C_B B^{-1} N \geq 0$

$$C - C_B B^{-1} A = (C_B, C_N) - C_B B^{-1} (B, N)$$

$$= (C_B, C_N) - (C_B, C_B B^{-1} N)$$

$$= (0, C_N - C_B B^{-1} N) \blacksquare$$

$$X = \begin{pmatrix} X_B \\ X_N \end{pmatrix}$$

定理1-1（最优性判别定理）


对于 (LP) 的基 B ，若有 $X_B^* = \underline{B^{-1}b} \geq 0$ 且

$C - C_B B^{-1} A \geq 0$ ($C_N - C_B B^{-1} N \geq 0$)，则基本可行解

$X^* = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix}$ 是 (LP) 的最优解，称为**最优基本可行解**，


B 称为**最优基**。**检验数向量** **非基变量检验数向量**

单纯形法的基本思想：



第一章 线性规划

一. 典式



1. 典式的向量形式 $S = CX = C_B B^{-1}$

$$(LP) \min S = CX$$

一个典式唯一地对应一个基本可行解

$$AX = b$$

$$X_B = B^{-1}b - B^{-1}NX_N$$

$$X \geq 0$$



可行基 B

$$\min S = C_B B^{-1}b + (C_N - C_B B^{-1}N)X_N$$

基本可行解

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = X_B$$

$$X_B + B^{-1}NX_N = B^{-1}b \longrightarrow$$

$$X = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix} \geq 0$$

$$X_B \geq 0 \quad X_N \geq 0$$

$$S = C_B B^{-1}b$$



称为(LP)的以 x_1, x_2, \dots, x_m 为基变量的典式

典式的向量形式

例: $\min S = x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 0x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 2 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, 3, 4$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{B} & & \text{N} \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \end{matrix} b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} R(A) = 2$$

$$B^{-1}(A, b) = B^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{B} & & \text{N} & & \text{b} \\ & & & & \end{matrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} & & \text{B}^{-1}\text{N} & & \text{B}^{-1}\text{b} \end{matrix}$$

初等行变换
亦可

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 0x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 - 2x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 0x_4 = 1 \end{cases}$$

$$C_B B^{-1} b = (1, 1) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \quad C_N - C_B B^{-1} N = (2, 2) - (1, 1) \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = (2, 1)$$

$$\min S = C_B B^{-1} b + (C_N - C_B B^{-1} N) X_N = 1 + (2, 1) \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = 1 + 2x_3 + x_4$$

$$\begin{aligned} \min S &= C_B B^{-1} b + (C_N - C_B B^{-1} N) X_N \\ X_B + B^{-1} N X_N &= B^{-1} b \\ X_B &\geq 0, \quad X_N \geq 0 \end{aligned}$$

例: $\min S = x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 0x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 2 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, 3, 4$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad R(A) = 2$$

$\begin{matrix} \text{B} & & \text{N} \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \end{matrix}$

$$B^{-1}(A, b) = B^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad C_B B^{-1} b = 1$$

$\begin{matrix} \text{B} & & \text{N} & & \text{b} \\ \text{E} & & \text{B}^{-1}\text{N} & & \text{B}^{-1}\text{b} \end{matrix}$

典式(基变量为 x_1, x_2):

$$\min S = 1 + 2x_3 + x_4$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 0x_4 = 1 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4 \end{cases}$$

基本可行解:

$$X = (0, 1, 0, 0)^T$$

目标值: $S = 1$

基变量: 只出现在其中一个方程中, 且系数为1。

$$X = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix} \geq 0$$

$$S = C_B B^{-1}b$$

注: 可行基 \longleftrightarrow 典式 \longleftrightarrow 基本可行解

2. 典式的分量形式

$$X_B + B^{-1}NX_N = B^{-1}b$$

$$\begin{aligned}\min S &= C_B B^{-1}b + (C_N - C_B B^{-1}N)X_N \\ X_B + B^{-1}NX_N &= B^{-1}b \\ X_B \geq 0, \quad X_N &\geq 0\end{aligned}$$

$$A = (\underbrace{p_1, p_2, \dots, p_m}_B, \underbrace{p_{m+1}, p_{m+2}, \dots, p_n}_N) = (B, N)$$

$B^{-1}b \geq 0$ B (可行基)

$$B^{-1}N = (B^{-1}p_{m+1}, B^{-1}p_{m+2}, \dots, B^{-1}p_n)$$

$$B^{-1}b = \begin{pmatrix} y_{10} \\ y_{20} \\ \vdots \\ y_{m0} \end{pmatrix} \geq 0 \quad = \begin{pmatrix} y_{1m+1} & y_{1m+2} & \cdots & y_{1n} \\ y_{2m+1} & y_{2m+2} & \cdots & y_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ y_{mm+1} & y_{mm+2} & \cdots & y_{mn} \end{pmatrix}$$

$$X_B + B^{-1}NX_N = B^{-1}b$$

$$B^{-1}b = \begin{pmatrix} y_{10} \\ y_{20} \\ \vdots \\ y_{m0} \end{pmatrix} \geq 0 \quad B^{-1}N = \begin{pmatrix} y_{1m+1} & y_{1m+2} & \cdots & y_{1n} \\ y_{2m+1} & y_{2m+2} & \cdots & y_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ y_{mm+1} & y_{mm+2} & \cdots & y_{mn} \end{pmatrix}$$

$$X = (\underbrace{x_1, x_2, \cdots, x_m}_{X_B}, \underbrace{x_{m+1}, x_{m+2}, \cdots, x_n}_{X_N})^T = \begin{pmatrix} X_B \\ X_N \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_{1m+1} & y_{1m+2} & \cdots & y_{1n} \\ y_{2m+1} & y_{2m+2} & \cdots & y_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ y_{mm+1} & y_{mm+2} & \cdots & y_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{m+1} \\ x_{m+2} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_{10} \\ y_{20} \\ \vdots \\ y_{m0} \end{pmatrix}$$

$$X_B + B^{-1}NX_N = B^{-1}b$$

$$\begin{pmatrix} \mathbf{x}_1 \\ \mathbf{x}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{x}_m \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \mathbf{y}_{1m+1} & \mathbf{y}_{1m+2} & \cdots & \mathbf{y}_{1n} \\ \mathbf{y}_{2m+1} & \mathbf{y}_{2m+2} & \cdots & \mathbf{y}_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \mathbf{y}_{mm+1} & \mathbf{y}_{mm+2} & \cdots & \mathbf{y}_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{x}_{m+1} \\ \mathbf{x}_{m+2} \\ \vdots \\ \mathbf{x}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{y}_{10} \\ \mathbf{y}_{20} \\ \vdots \\ \mathbf{y}_{m0} \end{pmatrix}$$

[illegible]

$$\min S = C_B B^{-1} b + (C_N - C_B B^{-1} N) X_N$$

$$X_B + B^{-1} N X_N = B^{-1} b$$

$$X_B \geq 0 \quad X_N \geq 0$$

$$C = (\underbrace{c_1, c_2, \dots, c_m}_{C_B}, \underbrace{c_{m+1}, c_{m+2}, \dots, c_n}_{C_N}) = (C_B, C_N)$$

$$B^{-1} b = \begin{pmatrix} y_{10} \\ y_{20} \\ \vdots \\ y_{m0} \end{pmatrix}$$

$$B^{-1} N = \begin{pmatrix} y_{1m+1} & y_{1m+2} & \cdots & y_{1n} \\ y_{2m+1} & y_{2m+2} & \cdots & y_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ y_{mm+1} & y_{mm+2} & \cdots & y_{mn} \end{pmatrix}$$

$$C_B B^{-1} b = y_{00}$$

$$(C_N - C_B B^{-1} N) = (y_{0m+1}, y_{0m+2}, \dots, y_{0n})$$

$$\min S = CX$$

$$AX = b$$

$$X \geq 0$$

1. 每个方程都有且仅有一个基变量，基变量仅出现在一个方程中且系数为1。

2. 非基变量的系数是其检验数。

$$\mathbf{X}_B \geq \mathbf{0} \quad \mathbf{X}_N \geq \mathbf{0}$$



$$\min S = y_{00} + y_{0m+1}x_{m+1} + y_{0m+2}x_{m+2} + \cdots + y_{0n}x_n \quad \text{典式的分}$$

[illegible]

$$x_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, n$$

$$C_B B^{-1} b = y_{00} \quad C_N - C_B B^{-1} N = (y_{0m+1}, y_{0m+2}, \dots, y_{0n})$$

线性规划1-4

$$\min S = CX$$

$$AX = b$$

$$X \geq 0$$

$$C_N - C_B B^{-1} N = (y_{0m+1}, y_{0m+2}, \dots, y_{0n})$$

$$C_N - C_B B^{-1} N$$

$$= (c_{m+1}, c_{m+2}, \dots, c_n) - C_B B^{-1} (p_{m+1}, p_{m+2}, \dots, p_n)$$

$$= (c_{m+1}, c_{m+2}, \dots, c_n) - (C_B B^{-1} p_{m+1}, C_B B^{-1} p_{m+2}, \dots, C_B B^{-1} p_n)$$

$$= (\underline{c_{m+1} - C_B B^{-1} p_{m+1}}, \underline{c_{m+2} - C_B B^{-1} p_{m+2}}, \dots, \underline{c_n - C_B B^{-1} p_n})$$

$$y_{0m+1} = c_{m+1} - C_B B^{-1} p_{m+1}$$

$$y_{0m+2} = c_{m+2} - C_B B^{-1} p_{m+2}$$

$$\vdots$$

$$y_{0n} = c_n - C_B B^{-1} p_n$$

非基变量 x_j 的检验数



$$y_{0j} = c_j - C_B B^{-1} p_j$$

$$j = m+1, m+2, \dots, n$$

典式的分量形式:

$$y_{00} = C_B B^{-1} b \quad y_{0j} = c_j - C_B B^{-1} p_j$$

$$\min S = y_{00} + y_{0m+1}x_{m+1} + y_{0m+2}x_{m+2} + \cdots + y_{0n}x_n$$

$$x_1 + y_{1m+1}x_{m+1} + y_{1m+2}x_{m+2} + \cdots + y_{1n}x_n = y_{10}$$

$$x_2 + y_{2m+1}x_{m+1} + y_{2m+2}x_{m+2} + \cdots + y_{2n}x_n = y_{20}$$

.....

$$x_m + y_{mm+1}x_{m+1} + y_{mm+2}x_{m+2} + \cdots + y_{mn}x_n = y_{m0}$$

$$x_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, n$$

基本可行解: $X^0 = (\overset{x_1}{\downarrow} y_{10}, \overset{x_2}{\downarrow} y_{20}, \dots, \overset{x_m}{\downarrow} y_{m0}, \overset{x_{m+1}}{\downarrow} 0, \overset{x_{m+2}}{\downarrow} 0, \dots, \overset{x_n}{\downarrow} 0)^T = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix} \geq 0$

目标值: $S^0 = y_{00} = C_B B^{-1} b$

$$\mathbf{3.} -y_{00} = -S + y_{0m+1}x_{m+1} + y_{0m+2}x_{m+2} + \cdots + y_{0n}x_n$$

$$\min S = y_{00} + y_{0m+1}x_{m+1} + y_{0m+2}x_{m+2} + \cdots + y_{0n}x_n$$

$$x_1 + y_{1m+1}x_{m+1} + y_{1m+2}x_{m+2} + \cdots + y_{1n}x_n = y_{10}$$

$$\left. \begin{aligned} x_2 + y_{2m+1}x_{m+1} + y_{2m+2}x_{m+2} + \cdots + y_{2n}x_n &= y_{20} \\ x_3 + y_{3m+1}x_{m+1} + y_{3m+2}x_{m+2} + \cdots + y_{3n}x_n &= y_{30} \\ \vdots & \\ x_m + y_{mm+1}x_{m+1} + y_{mm+2}x_{m+2} + \cdots + y_{mn}x_n &= y_{m0} \end{aligned} \right\} \text{ (2.1)}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_m + y_{mm+1}x_{m+1} + y_{mm+2}x_{m+2} + \cdots + y_{mn}x_n = y_{m0} \\ \vdots \\ x_m + y_{mm+1}x_{m+1} + y_{mm+2}x_{m+2} + \cdots + y_{mn}x_n = y_{m0} \end{array} \right.$$

		$\overbrace{x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_m}$	$\overbrace{x_{m+1} \ x_{m+2} \ \cdots \ x_n}$
y_{0j}	$-y_{00}$	$0 \quad 0 \quad \cdots \quad 0$	$y_{0m+1} \quad y_{0m+2} \quad \cdots \quad y_{0n}$
x_1	y_{10}	$1 \quad 0 \quad \cdots \quad 0$	$y_{1m+1} \quad y_{1m+2} \quad \cdots \quad y_{1n}$
x_2	y_{20}	$0 \quad 1 \quad \cdots \quad 0$	$y_{2m+1} \quad y_{2m+2} \quad \cdots \quad y_{2n}$
\vdots	\vdots		
x_m	y_{m0}	$0 \quad 0 \quad \cdots \quad 1$	$y_{mm+1} \quad y_{mm+2} \quad \cdots \quad y_{mn}$

单纯形表

线性规划1-4

$$\min S = CX$$

$$AX = b$$

$$X \geq 0$$

$$\min S = C_B B^{-1}b + (C_N - C_B B^{-1}N)X_N$$

$$X_B + B^{-1}NX_N = B^{-1}b$$

$$X_B \geq 0 \quad X_N \geq 0$$

$$C = (\underbrace{c_1, c_2, \dots, c_m}_{C_B}, \underbrace{c_{m+1}, c_{m+2}, \dots, c_n}_{C_N}) = (C_B, C_N)$$

$$B^{-1}b = \begin{pmatrix} y_{10} \\ y_{20} \\ \vdots \\ y_{m0} \end{pmatrix}$$

$$B^{-1}N = \begin{pmatrix} y_{1m+1} & y_{1m+2} & \cdots & y_{1n} \\ y_{2m+1} & y_{2m+2} & \cdots & y_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ y_{mm+1} & y_{mm+2} & \cdots & y_{mn} \end{pmatrix}$$

$$C_B B^{-1}b = y_{00}$$

$$C_N - C_B B^{-1}N = (y_{0m+1}, y_{0m+2}, \dots, y_{0n})$$

单纯形表:

$$y_{0j} = c_j - C_B B^{-1} p_j \quad C - C_B B^{-1} A$$

$-C_B B^{-1} b$		x_1	x_2	\dots	x_m	x_{m+1}	x_{m+2}	\dots	x_n
y_{0j}	$-y_{00}$	0	0	\dots	0	y_{0m+1}	y_{0m+2}	\dots	y_{0n}
x_1	y_{10}	1	0	\dots	0	y_{1m+1}	y_{1m+2}	\dots	y_{1n}
x_2	y_{20}	0	1	\dots	0	y_{2m+1}	y_{2m+2}	\dots	y_{2n}
\vdots	\vdots								
x_m	y_{m0}	0	0	\dots	1	y_{mm+1}	y_{mm+2}	\dots	y_{mn}

$$\begin{aligned}
 B^{-1}b \quad C - C_B B^{-1}A &= (C_B, C_N) - C_B B^{-1}(B, N) \\
 &= (C_B, C_N) - (C_B, C_B B^{-1}N) \\
 &= (0, C_N - C_B B^{-1}N) \\
 &= (0, 0, \dots, 0, y_{0m+1}, y_{0m+2}, \dots, y_{0n})
 \end{aligned}$$

单纯形表: $S = y_{00} + y_{0m+1}x_{m+1} + y_{0m+2}x_{m+2} + \cdots + y_{0n}x_n$

$-C_B B^{-1}b$		x_1	x_2	\cdots	x_m	x_{m+1}	x_{m+2}	\cdots	x_n
y_{0j}	$-y_{00}$	0	0	\cdots	0	y_{1m+1}	y_{1m+2}	\cdots	y_{1n}
x_1	y_{10}	1	0	\cdots	0	y_{0m+1}	y_{0m+2}	\cdots	y_{0n}
x_2	y_{20}	0	1	\cdots	0	y_{2m+1}	y_{2m+2}	\cdots	y_{2n}
\vdots	\vdots								
x_m	y_{m0}	0	0	\cdots	1	y_{mm+1}	y_{mm+2}	\cdots	y_{mn}

$$B^{-1}b \geq 0$$

$$\text{基本可行解: } X^0 = (\overset{x_1}{\downarrow} y_{10}, \overset{x_2}{\downarrow} y_{20}, \cdots, \overset{x_m}{\downarrow} y_{m0}, \underset{x_{m+1}}{\downarrow} \mathbf{0}, \underset{x_{m+2}}{\downarrow} \mathbf{0}, \cdots, \underset{x_n}{\downarrow} \mathbf{0})^T = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix} \geq \mathbf{0}$$

$$\text{目标值: } S^0 = y_{00} = C_B B^{-1}b$$

例: $\min S = x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 0x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 2 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, 3, 4$$

典式

$$\min S = 1 + 2x_3 + x_4$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 0x_4 = 1 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4 \end{cases}$$

单纯形表:

		x_1	x_2	x_3	x_4
y_{0j}	-1	0	0	2	1
x_1	0	1	0	-2	1
x_2	1	0	1	2	0

基本可行解:

$$X = (\mathbf{0}, \mathbf{1}, 0, 0)^T$$

目标值: $S = \mathbf{1}$

例: $\min S = x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 0x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 2 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, 3, 4$$

典式

$$\min S = 1 + 2x_3 + x_4$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 0x_4 = 1 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4 \end{cases}$$

基本可行解:

$$X = (0, 1, 0, 0)^T$$

目标值: $S = 1$

c_j			1	1	2	2
			x_1	x_2	x_3	x_4
C_B	y_{0j}	-1	0	0	2	1
1	x_1	0	1	0	-2	1
1	x_2	1	0	1	2	0

$$B^{-1}b \quad B^{-1}p_1 \quad B^{-1}p_2 \quad B^{-1}p_3 \quad B^{-1}p_4$$

$$y_{0j} = c_j - C_B B^{-1} p_j$$

$$y_{00} = C_B B^{-1} b = (1, 1) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1$$

$$y_{03} = c_3 - C_B B^{-1} p_3 = 2 - (1, 1) \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2$$

$$y_{04} = c_4 - C_B B^{-1} p_4 = 2 - (1, 1) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1$$

$$(1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1) \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

		x_1	x_2	x_3	x_4
y_{0j}	-1	0	0	2	1
x_1	0	1	0	-2	1
x_2	1	0	1	2	0

线性规划1-2

例: $\min S = x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 0x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 2 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, 3, 4$$

典式

$$\min S = 1 + 2x_3 + x_4$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 0x_4 = 1 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4 \end{cases}$$

基本可行解:

$$X = (\mathbf{0}, \mathbf{1}, 0, 0)^T$$

目标值: $S = \mathbf{1}$

		x_1	x_2	x_3	x_4
y_{0j}	0	1	1	2	2
x_1	1	1	1	0	1
x_2	2	1	2	2	1
y_{0j}	-1	0	0	2	1
x_1	1	1	1	0	1
x_2	1	0	1	2	0
y_{0j}	-1	0	0	2	1
x_1	0	1	0	-2	1
x_2	1	0	1	2	0

		x_1	x_2	x_3	x_4
y_{0j}	-1	0	0	2	1
x_1	0	1	0	-2	1
x_2	1	0	1	2	0

线性规划1-2

例: $\min S = x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 0x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 2 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, 3, 4$$

典式

$$\min S = 2 - x_2 + x_4$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_4 = 1 \\ 1/2 x_2 + x_3 + 0x_4 = 1/2 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4 \end{cases}$$

基本可行解:

$$X = (1, 0, 1/2, 0)^T$$

目标值: $S = 2$

		x_1	x_2	x_3	x_4
y_{0j}	0	1	1	2	2
x_1	1	1	1	0	1
x_3	2	1	2	2	1
y_{0j}	-1	0	0	2	1
x_1	1	1	1	0	1
x_3	1	0	1	2	0
y_{0j}	-2	0	-1	0	1
x_1	1	1	1	0	1
x_3	1/2	0	1/2	1	0

第一章 线性规划

第四节 单纯形法

- ✓ 典式
- 迭代原理
- 单纯形法举例
- 两阶段法

3. 典式的表格形式(单纯形表)

$$\min S = y_{00} + y_{0m+1}x_{m+1} + y_{0m+2}x_{m+2} + \cdots + y_{0n}x_n$$

$$x_1 + y_{1m+1}x_{m+1} + y_{1m+2}x_{m+2} + \cdots + y_{1n}x_n = y_{10}$$

$$\left. \begin{aligned} & x_2 + y_{2m+1}x_{m+1} + y_{2m+2}x_{m+2} + \cdots + y_{2n}x_n = y_{20} \\ & x_3 + y_{3m+1}x_{m+1} + y_{3m+2}x_{m+2} + \cdots + y_{3n}x_n = y_{30} \\ & \vdots \\ & x_m + y_{mm+1}x_{m+1} + y_{mm+2}x_{m+2} + \cdots + y_{mn}x_n = y_{m0} \end{aligned} \right\} \text{ (2.1)}$$

$$\left[\begin{array}{c} \vdots \\ x_m + y_{mm+1}x_{m+1} + y_{mm+2}x_{m+2} + \cdots + y_{mn}x_n = y_{m0} \end{array} \right]$$

		$\overbrace{x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_m}$	$\overbrace{x_{m+1} \ x_{m+2} \ \cdots \ x_n}$
y_{0j}	$-y_{00}$	$0 \quad 0 \quad \cdots \quad 0$	$y_{0m+1} \quad y_{0m+2} \quad \cdots \quad y_{0n}$
x_1	y_{10}	$1 \quad 0 \quad \cdots \quad 0$	$y_{1m+1} \quad y_{1m+2} \quad \cdots \quad y_{1n}$
x_2	y_{20}	$0 \quad 1 \quad \cdots \quad 0$	$y_{2m+1} \quad y_{2m+2} \quad \cdots \quad y_{2n}$
\vdots	\vdots		
x_m	y_{m0}	$0 \quad 0 \quad \cdots \quad 1$	$y_{mm+1} \quad y_{mm+2} \quad \cdots \quad y_{mn}$

单纯形表

单纯形表:

$$y_{0j} = c_j - C_B B^{-1} p_j \quad C - C_B B^{-1} A \geq 0$$

$-C_B B^{-1}b$		x_1	x_2	\dots	x_m	x_{m+1}	x_{m+2}	\dots	x_n
	$-y_{00}$	0	0	\dots	0	y_{0m+1}	y_{0m+2}	\dots	y_{0n}
x_1	y_{10}	1	0	\dots	0	y_{1m+1}	y_{1m+2}	\dots	y_{1n}
x_2	y_{20}	0	1	\dots	0	y_{2m+1}	y_{2m+2}	$B^{-1}N$	y_{2n}
\vdots	\vdots								
x_m	y_{m0}	0	0	\dots	1	y_{mm+1}	y_{mm+2}	\dots	y_{mn}

最优单纯形表

$$B^{-1}b \geq 0$$

基本可行解: $X^0 = (y_{10}, y_{20}, \dots, y_{m0}, 0, 0, \dots, 0)^T$

目标值:

$$S^0 = y_{00}$$

最优解

线性规划1-4

第一章 线性规划

第四节 单纯形法


✓ 典式

➡ 迭代原理

■ 单纯形法举例

■ 两阶段法

二. 迭代原理:



1. 初始单纯形表

		x_1	x_2	\dots	x_p	\dots	x_m	x_{m+1}	x_{m+2}	\dots	x_q	\dots	x_n
y_{0j}	$-y_{00}$	0	0	\dots	0	\dots	0	y_{0m+1}	y_{0m+2}	\dots	y_{0q}	\dots	y_{0n}
x_1	y_{10}	1	0	\dots	0	\dots	0	y_{1m+1}	y_{1m+2}	\dots	y_{1q}	\dots	y_{1n}
x_2	y_{20}	0	1	\dots	0	\dots	0	y_{2m+1}	y_{2m+2}	\dots	y_{2q}	\dots	y_{2n}
x_p	y_{p0}	0	0	\dots	1	\dots	0	y_{pm+1}	y_{pm+2}	\dots	y_{pq}	\dots	y_{pn}
x_m	y_{m0}	0	0	\dots	0	\dots	1	y_{mm+1}	y_{mm+2}	\dots	y_{mq}	\dots	y_{mn}


$$B^{-1}b \geq 0$$

$$X^0 = (\underbrace{y_{10}, y_{20}, \dots, y_{p0}, \dots, y_{m0}}_{\text{initial basic feasible solution}}, 0, 0, \dots, 0, \dots, 0)^T$$



初始基本可行解

二. 迭代原理:



2. 判断当前基本可行解是否是最优解:

1) 若 $C - C_B B^{-1} A \geq 0$ 或 $C_N - C_B B^{-1} N \geq 0$,

即非基变量 x_j 的检验数 $y_{0j} = c_j - C_B B^{-1} p_j$ 都 ≥ 0 ,
则 X^0 是最优解。

2) 若有某些检验数 $y_{0j} < 0$, 例如: $y_{0q} < 0 (m+1 \leq q \leq n)$,
则 X^0 不是最优解(在非退化情况下)。

1) 单纯形表

$$y_{0j} = c_j - C_B B^{-1} p_j \geq 0 \quad C_N - C_B B^{-1} N \geq 0$$

		x_1	x_2	\dots	x_p	\dots	x_m	x_{m+1}	x_{m+2}	\dots	x_q	\dots	x_n
y_{0j}	$-y_{00}$	0	0	\dots	0	\dots	0	y_{0m+1}	y_{0m+2}	\dots	y_{0q}	\dots	y_{0n}
x_1	y_{10}	1	0	\dots	0	\dots	0	y_{1m+1}	y_{1m+2}	\dots	y_{1q}	\dots	y_{1n}
x_2	y_{20}	0	1	\dots	0	\dots	0	y_{2m+1}	y_{2m+2}	\dots	y_{2q}	\dots	y_{2n}
x_p	y_{p0}	0	0	\dots	1	\dots	0	y_{pm+1}	y_{pm+2}	\dots	y_{pq}	\dots	y_{pn}
x_m	y_{m0}	0	0	\dots	0	\dots	1	y_{mm+1}	y_{mm+2}	\dots	y_{mq}	\dots	y_{mn}

$$B^{-1}b \geq 0$$

$$X^0 = (y_{10}, y_{20}, \dots, y_{p0}, \dots, y_{m0}, 0, 0, \dots, 0, \dots, 0)^T$$



是最优解

2) 单纯形表

		x_1	x_2	\cdots	x_p	\cdots	x_m	x_{m+1}	x_{m+2}	\cdots	x_q	\cdots	x_n
y_{0j}	$-y_{00}$	0	0	\cdots	0	\cdots	0	y_{0m+1}	y_{0m+2}	\cdots	$y_{0q} < 0$	\cdots	y_{0n}
x_1	y_{10}	1	0	\cdots	0	\cdots	0	y_{1m+1}	y_{1m+2}	\cdots	y_{1q}	\cdots	y_{1n}
x_2	y_{20}	0	1	\cdots	0	\cdots	0	y_{2m+1}	y_{2m+2}	\cdots	y_{2q}	\cdots	y_{2n}
x_p	y_{p0}	0	0	\cdots	1	\cdots	0	y_{pm+1}	y_{pm+2}	\cdots	y_{pq}	\cdots	y_{pn}
x_m	y_{m0}	0	0	\cdots	0	\cdots	1	y_{mm+1}	y_{mm+2}	\cdots	y_{mq}	\cdots	y_{mn}


$$B^{-1}b \geq 0$$

$$X^0 = (y_{10}, y_{20}, \cdots, y_{p0}, \cdots, y_{m0}, 0, 0, \cdots, 0, \cdots, 0)^T$$



不是最优解

二. 迭代原理:



3. 转移到新的基本可行解:

- ➔ 确定进基变量
 - 确定离基变量
 - 进行换基运算

1) 确定进基变量:

$$\min S = y_{00} + y_{0m+1}x_{m+1} + y_{0m+2}x_{m+2} + \cdots + y_{0q}x_q + \cdots + y_{0n}x_n$$

$$x_1 \quad x_2 \quad \cdots \quad x_p \quad \cdots \quad x_m \quad x_{m+1} \quad x_{m+2} \quad x_q \quad \cdots \quad x_n$$

$$X^0 = (y_{10}, y_{20}, \cdots, y_{p0}, \cdots, y_{m0}, 0, 0, \cdots, 0, \cdots, 0)^T \quad S^0 = y_{00}$$

$$X^1 = (y'_{10}, y'_{20}, \cdots, y'_{p0}, \cdots, y'_{m0}, 0, 0, \cdots, \theta, \cdots, 0)^T$$

$$S^1 = y_{00} + y_{0q}\theta < S^0 = y_{00} \quad x_q \text{ 称为进基变量}$$

确定进基变量的准则:

将检验数 < 0 的非基变量进基做基变量，可使新的基本可行解相应目标函数值下降。

确定进基变量的准则:

如果有不止一个负检验数, 则有两种方法确定进基变量 x_q :

1. *Bland* 规则: $q = \min\{j \mid y_{0j} < 0, j = 1, 2, \dots, n\}$

2. 最负检验数法: $y_{0q} = \min\{y_{0j} \mid y_{0j} < 0, j = 1, 2, \dots, n\}$

单纯形表

		x_1	x_2	\dots	x_p	\dots	x_m	x_{m+1}	x_{m+2}	\dots	x_q	\dots	x_n
y_{0j}	$-y_{00}$	0	0	\dots	0	\dots	0	y_{0m+1}	y_{0m+2}	\dots	$y_{0q} < 0$	\dots	y_{0n}
x_1	y_{10}	1	0	\dots	0	\dots	0	y_{1m+1}	y_{1m+2}	\dots	y_{1q}	\dots	y_{1n}
x_2	y_{20}	0	1	\dots	0	\dots	0	y_{2m+1}	y_{2m+2}	\dots	y_{2q}	\dots	y_{2n}
x_p	y_{p0}	0	0	\dots	1	\dots	0	y_{pm+1}	y_{pm+2}	\dots	y_{pq}	\dots	y_{pn}
x_m	y_{m0}	0	0	\dots	0	\dots	1	y_{mm+1}	y_{mm+2}	\dots	y_{mq}	\dots	y_{mn}

采用 **Bland** 规则方法确定进基变量 x_q 。

3. 转移到新的基本可行解:

- ✓ 确定进基变量
- ➡ 确定离基变量
- 进行换基运算

2) 确定离基变量:

2) 确定离基变量:

$$X^0 = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_p \ \dots x_m \ x_{m+1} \ x_{m+2} \ \dots x_q \ \dots x_n)^T \quad S^0 = y_{00}$$

$$X^1 = (y'_{10} \ y'_{20} \ \dots \ y'_{p0} \ \dots y'_{m0} \ 0 \ 0 \ \dots \ \theta > 0 \ 0)^T$$

$$S^1 = y_{00} + y_{0q}\theta < S^0 = y_{00} \downarrow$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 + y_{1m+1}x_{m+1} + \cdots + y_{1q}x_q + \cdots + y_{1n}x_n = y_{10} \\ x_2 + y_{2m+1}x_{m+1} + \cdots + y_{2q}x_q + \cdots + y_{2n}x_n = y_{20} \\ \\ x_m + y_{mm+1}x_{m+1} + \cdots + y_{mq}x_q + \cdots + y_{mn}x_n = y_{m0} \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, \dots n \end{array} \right| \begin{array}{l} y'_{10} = y_{10} - y_{1q}\theta \geq 0 \\ y'_{20} = y_{20} - y_{2q}\theta \geq 0 \\ \\ y'_{m0} = y_{m0} - y_{mq}\theta \geq 0 \end{array}$$

2) 确定离基变量:

$$\frac{y_{p0}}{y_{pq}} < \frac{y_{10}}{y_{1q}} \rightarrow y_{1q} \cdot \frac{y_{p0}}{y_{pq}} < y_{10}$$

$$\begin{array}{l}
 \mathbf{x}_1 \quad \mathbf{x}_2 \quad \dots \quad \mathbf{x}_p \quad \dots \quad \mathbf{x}_m \quad \mathbf{x}_{m+1} \quad \mathbf{x}_{m+2} \quad \mathbf{x}_q \quad \dots \quad \mathbf{x}_n \\
 \mathbf{X}^0 = (y_{10}, y_{20}, \dots, y_{p0}, \dots, y_{m0}, 0, 0, \dots, 0, \dots, 0)^T \quad S^0 = y_{00} \\
 \downarrow \quad \quad \quad \downarrow \quad \quad \quad \downarrow \\
 \mathbf{X}^1 = (y'_{10}, y'_{20}, \dots, y'_{p0}, \dots, y'_{m0}, 0, 0, \dots, \theta, \dots, 0)^T \quad S^1 = y_{00} + y_{0q}\theta \\
 \mathbf{X}^1 = (y'_{10}, y'_{20}, \dots, 0, \dots, y'_{m0}, 0, 0, \dots, \frac{y_{p0}}{y_{pq}}, 0)^T \quad y_{0q} < 0
 \end{array}$$

$$\begin{cases}
 y'_{20} = y_{20} - y_{2q}\theta \geq 0 \quad \rightarrow \quad \theta \leq \frac{y_{20}}{y_{2q}} \quad (y_{2q} > 0) \\
 y'_{p0} = y_{p0} - y_{pq}\theta \geq 0 \quad \rightarrow \quad \theta \leq \frac{y_{p0}}{y_{pq}} \quad (y_{pq} > 0) \\
 y'_{m0} = y_{m0} - y_{mq}\theta \geq 0 \quad \rightarrow \quad \theta \leq \frac{y_{m0}}{y_{mq}} \quad (y_{mq} > 0)
 \end{cases}$$

$$\theta = \min \left\{ \frac{y_{i0}}{y_{iq}} \mid y_{iq} > 0, 1 \leq i \leq m \right\} = \frac{y_{p0}}{y_{pq}} \quad \rightarrow \quad \mathbf{x}_p \text{ 称为离基变量}$$

最小非负比值准则

单纯形表

		x_1	x_2	\dots	x_p	\dots	x_m	x_{m+1}	x_{m+2}	\dots	x_q	\dots	x_n
y_{0j}	$-y_{00}$	0	0	\dots	0	\dots	0	y_{0m+1}	y_{0m+2}	\dots	$y_{0q} < 0$	\dots	y_{0n}
x_1	y_{10}	1	0	\dots	0	\dots	0	y_{1m+1}	y_{1m+2}	\dots	y_{1q}	\dots	y_{1n}
x_2	y_{20}	0	1	\dots	0	\dots	0	y_{2m+1}	y_{2m+2}	\dots	y_{2q}	\dots	y_{2n}
x_p	y_{p0}	0	0	\dots	1	\dots	0	y_{pm+1}	y_{pm+2}	\dots	y_{pq}	\dots	y_{pn}
x_m	y_{m0}	0	0	\dots	0	\dots	1	y_{mm+1}	y_{mm+2}	\dots	y_{mq}	\dots	y_{mn}

第一种情况：假设 $y_{1q}, y_{2q}, \dots, y_{pq}, \dots, y_{mq} > 0$

$$\theta = \min\left\{\frac{y_{10}}{y_{1q}}, \frac{y_{20}}{y_{2q}}, \dots, \frac{y_{p0}}{y_{pq}}, \dots, \frac{y_{m0}}{y_{mq}}\right\} = \frac{y_{p0}}{y_{pq}} \rightarrow x_p \text{ 称为离基变量}$$

单纯形表

		x_1	x_2	\dots	x_p	\dots	x_m	x_{m+1}	x_{m+2}	\dots	x_q	\dots	x_n
y_{0j}	$-y_{00}$	0	0	\dots	0	\dots	0	y_{0m+1}	y_{0m+2}	\dots	$y_{0q} < 0$	\dots	y_{0n}
x_1	y_{10}	1	0	\dots	0	\dots	0	y_{1m+1}	y_{1m+2}	\dots	y_{1q}	\dots	y_{1n}
x_2	y_{20}	0	1	\dots	0	\dots	0	y_{2m+1}	y_{2m+2}	\dots	y_{2q}	\dots	y_{2n}
x_p	y_{p0}	0	0	\dots	1	\dots	0	y_{pm+1}	y_{pm+2}	\dots	y_{pq}	\dots	y_{pn}
x_m	y_{m0}	0	0	\dots	0	\dots	1	y_{mm+1}	y_{mm+2}	\dots	y_{mq}	\dots	y_{mn}

第二种情况： 若 $y_{iq} \leq 0, i = 1, 2, \dots, m$, 则对 θ 没限制,

$$y'_{10} = y_{10} - y_{1q}\theta \geq 0$$

$$y'_{20} = y_{20} - y_{2q}\theta \geq 0$$

$$y'_{m0} = y_{m0} - y_{mq}\theta \geq 0$$

而 $S^1 = y_{00} + y_{0q}\theta \xrightarrow{\theta \rightarrow +\infty} -\infty,$

即 **(LP)没有有限的最优解。**

第三种情况：无穷多最优解判别条件：

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{ccccccccccc}
 x_1 & x_2 & \dots & x_p & \dots & x_m & x_{m+1} & x_{m+2} & x_q & \dots & x_n \\
 \downarrow & & & \downarrow & & & & & \downarrow & & \\
 X^0 = (y_{10}, y_{20}, \dots, y_{p0}, \dots, y_{m0}, 0, 0, \dots, 0, \dots, 0)^T & S^0 = y_{00} \\
 X^1 = (y'_{10}, y'_{20}, \dots, y'_{p0}, \dots, y'_{m0}, 0, 0, \dots, \theta > 0, 0)^T & S^1 = y_{00} + y_{0q}\theta \\
 \left\{ \begin{array}{l} y'_{10} = y_{10} - y_{1q}\theta \geq 0 \\ y'_{20} = y_{20} - y_{2q}\theta \geq 0 \\ y'_{p0} = y_{p0} - y_{pq}\theta \geq 0 \\ y'_{m0} = y_{m0} - y_{mq}\theta \geq 0 \end{array} \right.
 \end{array}
 \end{array}$$

非基变量 x_q 的检验数 $y_{0q} = 0$,
 则 $S^1 = y_{00} + y_{0q}\theta = y_{00} \Rightarrow$ 最优值

↑ 例：

若对于某个基本可行解，所有检验数都非负，且存在一个非基变量的检验数=0，则(LP) 有无穷多个最优解。

3. 转移到新的基本可行解:

- ✓ 确定进基变量
- ✓ 确定离基变量
- ➡ 进行换基运算

3) 换基运算:

$$y'_{i0} = y_{i0} - y_{iq} \frac{y_{p0}}{y_{pq}}$$

		x_1	x_2	\dots	x_p	\dots	x_m	x_{m+1}	x_{m+2}	\dots	x_n
y_{0j}	$-y_{00}$	0	0	\dots	0	\dots	0	y_{0m+1}	y_{0m+2}	\dots	y_{0n}
x_1	y_{10}	$-y_{1q} \cdot \frac{y_{p0}}{y_{pq}}$	\dots	0	\dots	0	y_{1m+1}	y_{1m+2}	\dots	y_{1q}	0 $\dots y_{1n}$
x_2	y_{20}	$-y_{2q} \cdot \frac{y_{p0}}{y_{pq}}$	\dots	0	\dots	0	y_{2m+1}	y_{2m+2}	\dots	y_{2q}	0 $\dots y_{2n}$
$\leftarrow x_q$	$\frac{y_{p0}}{y_{pq}}$	0	0	\dots	1	\dots	0	y_{pm+1}	y_{pm+2}	\dots	y_{pq} 1 $\dots y_{pn}$
x_m	y_{m0}	$-y_{mq} \cdot \frac{y_{p0}}{y_{pq}}$	\dots	0	\dots	1	y_{mm+1}	y_{mm+2}	\dots	y_{mq}	0 $\dots y_{mn}$


因为 x_q 代替 x_p 成为第 p 个方程的基变量, 所以它只能出现在第 p 个方程中, 且系数为 1, 不能出现在其他方程中, 检验数也为 0。

$$X^1 = (y'_{10}, y'_{20}, \dots, \mathbf{0}, \dots, y'_{m0}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \dots, \frac{y_{p0}}{y_{pq}}, \dots, \mathbf{0})^T$$

3. 转移到新的基本可行解:

- ✓ 确定进基变量
- ✓ 确定离基变量
- ✓ 进行换基运算

二. 迭代原理:



迭代原理:

$$S^1 = y_{00} + y_{0q}\theta < S^0 = y_{00} \downarrow$$

$$X^0 = (\overset{x_1}{y_{10}}, \overset{x_2}{y_{20}}, \dots, \overset{x_p}{y_{p0}}, \dots, \overset{x_m}{y_{m0}}, 0, 0, \dots, \overset{x_q}{0}, \dots, \overset{x_n}{0})^T$$

$$X^1 = (\overset{x_1}{y'_{10}}, \overset{x_2}{y'_{20}}, \dots, \overset{x_p}{0}, \dots, \overset{x_m}{y'_{m0}}, 0, 0, \dots, \underset{y_{pq}}{\frac{y_{p0}}{y_{pq}}}, 0)^T$$

初始基本可行解 X^0

$$B_0 = (p_1, p_2, \dots, \overset{x_p}{p_p}, \dots, p_m)$$

X^0 是最
优解

Y $y_{0j} \geq 0?$
 $j = 1, 2, \dots, n$

$$y_{0j} = c_j - C_B B^{-1} p_j \geq 0$$

$$y_{0q} < 0$$

$$q = \min\{j \mid y_{0j} < 0, j = 1, 2, \dots, n\}$$

确定进基变量 x_q

确定离基变量 x_p

$$\theta = \min\left\{\frac{y_{i0}}{y_{iq}} \mid y_{iq} > 0, 1 \leq i \leq m\right\} = \frac{y_{p0}}{y_{pq}}$$

换基运算

若 $y_{iq} \leq 0$, (LP) 没有有限的最优解。

新的基本可行解 X^1

$$B_1 = (p_1, p_2, \dots, \underset{p_q}{p_q}, \dots, p_m)$$

线性规划1-4

第一章 线性规划

第四节 单纯形法

✓ 典式

✓ 迭代原理

➡ 单纯形法举例

■ 两阶段法

例1-10 求解线性规划问题: ~~典式~~ c_j x C_B $B^{-1}b$ $(6, 0, 0, 3, 4)$ $B^{-1}b$

$$\min S = x_1 - 2x_2 + x_3 - 3x_4 \quad \min S = x_1 - 2x_2 + x_3 - 3x_4$$

$$x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 = 6$$

$$B_0 = (p_1, p_5, p_6) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, 4$$

标准形

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 = 6 \\ -2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 3 \\ -x_2 + 6x_3 - x_4 + x_6 = 4 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6 \end{cases}$$

$$C_j \quad \mathbf{1} \quad \mathbf{-2} \quad \mathbf{1} \quad \mathbf{-3} \quad \mathbf{0} \quad \mathbf{0}$$

单纯形表

			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
C_B	X_B	-6	0	-3	-2	-4	0	0
1	x_1	6	1	1	3	1	0	0
0	x_5	3	0	-2	1	1	1	0
0	x_6	4	0	-1	6	-1	0	1

$$b \quad p_1 \quad p_2 \quad p_3 \quad p_4 \quad p_5 \quad p_6$$

线性规划1-4

例1-10

$$y_{0j} = c_j - C_B B^{-1} p_j \geq 0 \quad C - C_B B^{-1} A \geq 0 \quad ?$$

表一		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
X_B	-6	0	-3	-2	-4	0	0
x_2	6	1	1	3	1	0	0
x_5	15	2	0	7	3	1	0
x_6	4	0	-1	6	-1	0	1

$$X^0 = (x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4 \ x_5 \ x_6)^T = (6, 0, 0, 0, 3, 4)^T \quad S^0 = 6$$

例1-10

表一		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
X_B	-6	0	-3	-2	-4	0	0
x_2	6	1	1	3	1	0	0
x_5	15	2	0	7	3	1	0
x_6	10	1	0	9	0	0	1

$$X^0 = \begin{matrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 \\ (6, & 0, & 0, & 0, & 3, & 4) \end{matrix}^T \quad S^0 = 6$$

例1-10

表一		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
X_B	-6	0	-3	-2	-4	0	0
x_2	6	1	1	3	1	0	0
x_5	15	2	0	7	3	1	0
x_6	10	1	0	9	0	0	1

$$X^0 = \begin{matrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 \\ (6, & 0, & 0, & 0, & 3, & 4) \end{matrix}^T \quad S^0 = 6$$

例1-10

表一		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
X_B	12	3	0	7	-1	0	0
x_2	6	1	1	3	1	0	0
x_5	15	2	0	7	3	1	0
x_6	10	1	0	9	0	0	1

←
×3

$$X^0 = (x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4 \ x_5 \ x_6)^T = (6, 0, 0, 0, 3, 4)^T \quad S^0 = 6$$

例1-10

$$y_{\alpha_i} = c_i - C_B B^{-1} p_i \geq 0 \quad C - C_B B^{-1} A \geq 0$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 6 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{matrix} B_0 = (p_1, p_5, p_6) \\ B_1 = (p_2, p_5, p_6) \end{matrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

x_2	6	1	1	3	1	0	0
x_4	5	2/3	0	7/3	1	1/3	0
x_6	10	1	0	9	0	0	1

$$\begin{matrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 \\ X^0 = (6, 0, 0, 0, 3, 4)^T & S^0 = 6 \\ X^1 = (0, 6, 0, 0, 15, 10)^T & S^1 = -12 \end{matrix} \quad \downarrow$$

例1-10

表二		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
X_B	12	3	0	7	-1	0	0
x_2	1	1/3	1	2/3	0	-1/3	0
x_4	5	2/3	0	7/3	1	1/3	0
x_6	10	1	0	9	0	0	1

$$X^0 = (x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4 \ x_5 \ x_6)^T = (6, 0, 0, 0, 3, 4)^T \quad S^0 = 6$$

$$X^1 = (0, 6, 0, 0, 15, 10)^T \quad S^1 = -12 \quad \downarrow$$

例1-10

表二		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
X_B	17	11/3	0	28/3	0	1/3	0
x_2	1	1/3	1	2/3	0	-1/3	0
x_4	5	2/3	0	7/3	1	1/3	0
x_6	10	1	0	9	0	0	1

$$X^0 = (x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4 \ x_5 \ x_6)^T = (6, 0, 0, 0, 3, 4)^T \quad S^0 = 6$$

$$X^1 = (0, 6, 0, 0, 15, 10)^T \quad S^1 = -12 \quad \downarrow$$

$$\min S = x_1 - 2x_2 + x_3 - 3x_4 \quad \min S = x_1 - 2x_2 + x_3 - 3x_4$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 = 6 \\ -2x_2 + x_3 + x_4 \leq 3 \\ -x_2 + 6x_3 - x_4 \leq 4 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4 \end{array} \right. \xrightarrow{\text{标准形}} \left\{ \begin{array}{l} x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 = 6 \\ -2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 3 \\ -x_2 + 6x_3 - x_4 + x_6 = 4 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6 \end{array} \right.$$

x_2	1	1/3	1	2/3	0	-1/3	0
x_4	5	2/3	0	7/3	1	1/3	0
x_6	10	1	0	9	0	0	1

$$x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4 \quad x_5 \quad x_6$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 6 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \underline{B_1 = (p_2, p_5, p_6)} \quad B^* = (p_2, p_4, p_6) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

例1-11 求解线性规划问题: $y_{0j} = c_j - C_B B^{-1} p_j$ $y_{00} = C_B B^{-1} b$

$$\max S = x_1 + 3x_2 + 4x_3$$

$$\min(-S) = -x_1 - 3x_2 - 4x_3$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 - 4x_3 \leq 10 \\ -2x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 5 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, 3 \end{cases} \xrightarrow{\text{标准形}} \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 - 4x_3 + x_4 = 10 \\ -2x_1 + 3x_2 + x_3 + x_5 = 5 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4, 5 \end{cases}$$

单纯形表

			C_j	-1	-3	-4	0	0
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
C_B	X_B	0	-1	-3	-4	0	0	
0	x_4	10	3	5	-4	1	0	
0	x_5	5	-2	3	1	0	1	

例1-11


$$y_{0j} = c_j - C_B B^{-1} p_j \geq 0 \quad C - C_B B^{-1} A \geq 0 \quad ?$$


		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
X_B	0	-1	-3	-4	0	0
x_1	10/3	<u>1</u>	5/3	-4/3	1/3	0
x_5	5	-2	3	1	0	1

× (1/3)

$$X^0 = (0, 0, 0, 10, 5)^T \quad S^0 = 0$$


例1-11


		 x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
X_B	10/3	0	-4/3	-16/3	1/3	0
x_1	10/3	1	5/3	-4/3	1/3	0
x_5	5	-2	3	1	0	1



$$X^0 = (0, 0, 0, 10, 5)^T \quad S^0 = 0$$

例1-11

		 x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
X_B	10/3	0	-4/3	-16/3	1/3	0
x_1	10/3	1	5/3	-4/3	1/3	0
x_5	35/3	0	19/3	-5/3	2/3	1



$$X^0 = (0, 0, 0, 10, 5)^T \quad S^0 = 0$$

例1-11

$$y_{0j} = c_j - C_B B^{-1} p_j \geq 0 \quad C - C_B B^{-1} A \geq 0$$



		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
X_B	10/3	0	-4/3	-16/3	1/3	0
x_1	10/3	1	5/3	-4/3	1/3	0
x_5	35/3	0	19/3	-5/3	2/3	1

$$x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4 \quad x_5$$

$$X^0 = (0, 0, 0, 10, 5)^T \quad S^0 = 0$$

$$X^1 = (10/3, 0, 0, 0, 35/3)^T \quad S^1 = -10/3 \downarrow$$

例1-11

$$y_{0j} = c_j - C_B B^{-1} p_j \geq 0 \quad C - C_B B^{-1} A \geq 0 \quad ?$$

		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
X_B	10/3	0	-4/3	-16/3	1/3	0
x_1	10/3	1	5/3	-4/3	1/3	0
x_5	35/3	0	19/3	-5/3	2/3	1

$$X^2 \quad S^2 = y_{00} + y_{0q} \theta = -\frac{10}{3} - \frac{16}{3} \theta \xrightarrow{\theta \rightarrow +\infty} -\infty$$

该问题没有有限的最优解

$$X^0 = (0, 0, 0, 10, 5)^T \quad S^0 = 0$$

$$X^1 = (10/3, 0, 0, 0, 35/3)^T \quad S^1 = -10/3 \downarrow$$

第一章 线性规划

第四节 单纯形法

- ✓ 典式
- ✓ 迭代原理
- ✓ 单纯形法举例
- 两阶段法

作业：P95 6 (1) (2) (3)

作业：P41 6 (1) (2) (3)